Acetamiprid 20% SP
(Insecticide)

Acetamiprid 20% SP is a soluble powder formulation containing 20% of the active ingredient Acetamiprid. Acetamiprid 20% SP is a highly effective systemic insecticide for the control of aphids, jasssids and whiteflies in cotton crop.

Recommendation :

When used as per recommendations given below, acetamiprid 20% SP provides control of aphids, jassids and whiteflies in cotton crop, thrips in chilli. BPH in paddy. It can be sprayed as a high volume spray using Knapsack sprayers, foot or rocked sprayers in the requied quantity of water as given inthe table. If can also used as low volume using motorized mist blowers

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last Water Water spray to harvest days
		AI (gm)	Formulation (gm)		
Cotton	Whiteflies	20	100	500-600	15
	Jassids	10	50	500-600	15
	Aphid	10	50	500-600	15
Rice	Brown plant hopper	10-20	50-100	500-600	7
Cabbage	Aphids	15	75	500-600	7
	Aphids	15.00	75.00	500-600	7
	Aphid	15	75	500-600	7
Okra	Aphids	15.00	75.00	500-600	3
Chilli	Thrips	10-20	50-100	500-600	3

Direction of Use: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Nausea, vomiting, headache, dizziness and stomach-ache may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3 If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic, when used as for field recommendation.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used Container: 1. Empty containers shall be broken and burried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and the nature of insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition:

Acetamiprid a.i.	20.00 % w/w
Blend of Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate Sodium Sulphate & Sodium alkylate Mixture	4.50% w/w
Sodium Citrate, Dihydrate	30.00% w/w
Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate	0.10% w/w
Colouring agent (Brilliant Blue)	0.05% w/w
Lactose Monohydrate	Q.S.%
Total	100.000 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి
(కీటకనాశిని)

ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి సక్రియపదార్థం మరియు తత్సంబంధ మూలకాలు గల నీటిలో కరిగే పొడిరూపంలోని సూత్రీకరణగల కీటకనాశిని. ప్రత్తి పంటను ఆశించు పేనుబంక, పచ్చదోమలు మరియు తెల్లదోమలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టు అంతర్వాహక కీటకనాశిని.

సిఫారసు

క్రింద ఇవ్వబడిన సిఫార్సుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి ప్రత్తి పంటలో అఫిడ్స్, జాసిడ్లు మరియు తెల్లదోమలు, మిరపలో థ్రిప్స్ నియంత్రణను అందిస్తుంది. వరిలో బి.పి.హెచ్. టేబుల్‌లో అందించిన విధంగా అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో నాప్‌కిన్ స్ప్రేయర్‌లు, ఫుట్ లేదా రాక్డ్ స్ప్రేయర్‌లను ఉపయోగించి అధిక పరిమాణంలో స్ప్రేగా పిచికారీ చేయవచ్చు. మోటరైజ్డ్ మిస్ట్ బ్లోయర్‌లను ఉపయోగించి తక్కువ వాల్యూమ్‌గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు

పైరు(లు)	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె.		నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీ నుండి పంటకోత మధ్య వ్యవధి (రోజులు)
		స.వ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (గ్రా)		
ప్రత్తి	పేనుబంక	10	50	500-600	15
	పచ్చదోమలు	10	50	500-600	15
	తెల్లదోమ	20	100	500-600	15
వరి	సుడిదోమ	10-20	50-100	500-600	7
క్యాబేజి	పేనుబంక	15	75	500-600	7
బెండ	పేనుబంక	15.00	75.00	500-600	3
మిర్చి	తామరపురుగులు	10-20	50-100	500-600	3

ఉపయోగించుటకు సూచన : అధిక నీటిపరిమాణంగల నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఆస్పి-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయరు వంటివి ఉపయోగకరం.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4.ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. మందును ఉపయోగించునప్పుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

విష లక్షణములు: వికారం, వాంతులు, తలనొప్పి, మగత మరియు ఉదరంలో నొప్పి వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలించండి.

విషతుల్యత : సిఫార్సుల ప్రకారం పొలంలో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగ లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ విసర్జన : 1. ఖాళీ కంటైనర్లను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను లేదా ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవంను పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను వేరు-వేరు గదులలో లేక ప్రాంతంలో ఖాద్యాన్న వస్తువులకు దూరంగా అలమారుల్లో, వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచండి. 2. కీటకనాశినులను నిల్వ చేయు గదులు లేక ప్రాంగణం బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో కీటకనాశిని ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడినవిగా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

అసిటామిప్రిడ్ స.ప.	20.00% భా/భా
బ్లెండ్ ఆఫ్ సోడియం డొడిసిల్ బెంజిన్ సల్ఫోనేట్,	4.50% భా/భా
సోడియం సల్ఫేట్ & సోడియం అల్కిలెట్ మిక్చర్	% భా/భా
సోడియం సిట్రేట్, డైహైడ్రేట్	30.00% భా/భా
కాల్షియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రేట్	0.10% భా/భా
కలరింగ్ ఏజెంట్ (మెరిసే నీలం)	0.05% భా/భా
లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేడ్	క్యు.యస్.%
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ऐसिटामिप्रिड २० प्रतिशत एस पी
(कीटनाशक)

ऐसिटामिप्रिड २० प्रति. घुलनाशील पाउडर कपास के माहू/तेला और सफेद मक्खी, बेदगोभी में माहू, भिन्डी में माहू को रोकथाम के लिये प्रयोग किया जाता है।

उपयोग

इस कीटनाशक का प्रयोग कपास पर आने वाले तेला, माहू, और सफेद मक्खी, मिर्च पर चुरदा, धान पर भूरा फूदका, बन्दगोभी तथा भिन्डी पर माहू की रोकथाम लिये किया है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)		
कपास	सफेद मक्खी	२०	१००	५००-६००	१५
	हरा तेला	१०	५०	५००-६००	१५
	चेपा या माहू	१०	५०	५००-६००	१५
धान	भुरा फुदका	१०-२०	५०-१००	५००-६००	७
बन्द गोभी	चेपा या माहू	१५	७५	५००-६००	७
भिन्डी	चेपा या माहू	१५	७५	५००-६००	३
मिर्च	चुरदा	१०-२०	५०-१००	५००-६००	३

उपयोग के लिए निर्देश

उपयोग मे आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानीया : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मूँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : मितली, उल्टी सिर-दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडें उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि खरपतवारनाशक सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १.कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहियें। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा उपयोग के लिए बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक, या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों का अलग-अलग कमरों या आलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थों या पशु आहार सग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग-अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चाबी में बंद रखे। २. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठडा प्रकाश युक्त, हवदार, व पर्याप्त लम्बा चोडा होना चाहये ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो ।

रासायनिक संरचना :

ऐसिटामिप्रिड सक्रि. तत्व	२०.००% भार/भार
ब्लेंड आफ सोडीयम डोडिसाइल बेंजिन सल्फोनेट	४.५०% भार/भार
सोडीयम सल्फनेट एण्ड सोडीयम एल्केलाइट	%
सोडीयम साइट्रेट, डाईहाइड्रेट	३०.००% भार/भार
कैलशियम हाइड्रोजन, फॉस्फेट डाईहायड्रेट	०.१०%भार/भार
रंग लाने वाले घटक (ब्रिलीयन्ट ब्लू)	०.०५% भार/भार
लैक्टेज मोनोहाइड्रेट	पर्याप्त मात्रा%
योग	१००% भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

Amish CROPSCIENCES

AMPRIDE
Acetamiprid 20% S.P.
(Insecticide)

అమిప్రిడ్
ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి
(కీటకనాశిని)

अमिप्रिड
ऐसिटामिप्रिड २० प्रतिशत एस.पी.
(कीटनाशक)

ಅಮಿಪ್ರಿಡ್
ಎಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

सघिव विषम
ज़हर POISON विष
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-130803/2015-Acetamiprid (SP) (354)-220

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

एसीटामिप्रिड २०% एस पी

(कीटकनाशक)

एसीटामिप्रिड २०% एसपी हे एक विरघळणारे पावडर फॉर्म्युलेशन आहे ज्यामध्ये २०% सक्रिय घटक अलर्शीराळ्लिव असतो. एसीटामिप्रिड २०% एसपी हे कापूस पिकातील ऍफिड, जॅसिड्स आणि पांढरी माशी यांच्या नियंत्रणासाठी अत्यंत प्रभावी प्रणालीगत कीटकनाशक आहे.

शिफारस : खाली दिलेल्या शिफारशींनुसार वापरल्यास, एसीटामिप्रिड २०% एसपी कापूस पिकामध्ये ऍफिड्स, जॅसिड्स आणि व्हाईटफ्लाइज, मिरचीमध्ये थ्रिप्स, भातामध्ये बीपीएच, कोबी आणि भेंडीमध्ये ऍफिड्सचे नियंत्रण प्रदान करते. हे उच्च प्रमाणात फवारणी म्हणून फवारले जाऊ शकते. टेबलमध्ये दिलेल्या पाण्याच्या आवश्यक प्रमाणात नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट किंवा रॉकेट स्प्रेअर वापरणे. हे मोटाराइज्ड मिस्ट ब्लोअर्स वापरून कमी आवाज म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.

पीक(चे)	सामान्य नाव कीटक	अल (सा)	डोस/वक्ष फॉर्म्युलेशन (सा)	शेवटच्या पाण्याच्या (लिटर)	प्रतीक्षा कालावधी क्षस्थान विरघळण्याची (दिवस)
कॉटन	हाईटफ्लाइज	20	100	500–600	15
	श्रैपके	10	50	500–600	15
	ऍफिड	10	50	500–600	15
तांदूळ	तपकिरी	10–20	50–100	500–600	7
कोबी	ऍफिड्स	15	75	500–600	7
भेंडी	ऍफिडस्	15.00	75.00	500–600	3
मिरची	थ्रिप्स	10–20	50–100	500–600	3

वापराची दिशा:

नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर आणि ASPEE-HTP पॉवर स्प्रेअर.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थाचे डबे आणि जनावरांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे: मळमळ, उलट्या, डोकेदुखी, चक्र येणे आणि पोटदुखी होऊ शकते.

प्रथमोपचार: १. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३ डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छपाण्याने धुवा. ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

फायटोटॉक्सिसिटी: फील्ड शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. रिकामे कंटेनर वस्तीपासून दूर तोडून जाळून टाकावेत. २. पॅकेजचे वापरलेले कंटेनर त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर ठेवू नयेत. ३. वापरलेले कंटेनर किंवा पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर ठेवू नये. ४. पॅकेज किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि धुण्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये आणि आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवावे. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा आवार चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना:

एसीटामिप्रिड र.ळ.	२०.००% व/व
सोडियम डोडेसिल बेंझिन सल्फोनेटचे मिश्रण	४.५०% व/व
सोडियम सल्फेट आणि सोडियम अल्किलेट मिश्रण	%व/व
सोडियम सायट्रेट, डायहाइड्रेट	३०.००% व/व
कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट डायहाइड्रेट	०.१०% व/व
ब्ल्यूरिंगट	०.०५% व/व
लॅक्टोज मोनोहायड्रेट	८.६ %
एकूण	१००% व/व

सावधानता: या लेबल / पत्रकावर निर्दिष्ट केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नका

ఎసేటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి

(కీటనాశక)

ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి ఒందు కరగబల్ల పుడి సూత్రీకరణవాగిద్దు, ఎసేటామిప్రిడ్‌న 20% సక్రియ ఘటకాంశవాగిదే. ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి హత్తి బేళియల్లి గిడహేనుగళు, జ్యాసిడ్‌గళు మత్తు బిళినొణగళ నియంత్రణక్కే హేచ్చు పరిణామకారి వ్యవస్థిత కీటనాశకవాగిదే.

శిఫారసు: కేళగే నీడలాద శిఫారసుగళ ప్రకార బళసిదాగ, ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి హత్తి బేళియల్లి గిడహేనుగళు, జాసిడ్గళు మత్తు బళినొణగళ నియంత్రణవన్ను ఒదగిసుత్తదే. మేణసినకాయియల్లి థ్రిప్స్, భత్తదల్లి BPH, ఎలకోసు మత్తు బెండకాయియల్లి గిడహేనుగళు.ఇదన్ను హేళ్దిన ప్రమాణద సింపరణేయాగి సింపడిసబహుదు. టేబుల్‌నల్లి నీడిరువంతే అగత్యవిరువ నీరిన ప్రమాణదల్లి న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌గళు, ఫూట్ అథవా రాకెట్ స్ప్రేయర్‌గళన్ను బళసువుదు. మోటారీకృత మంజుగడ్డే బ్లోవర్‌గళన్ను బళసికొండు ఇదన్ను కడిమే ప్రమాణదల్లి బళసబహుదు

బేళగళు) సామాన్య పేరు		అల్ (గ్రా)	డోసేజ్/ఎఫ్‌ఎ ఫార్మూలేషన్ (మిలి)	కొనేయనంతర నాటర్ (లిటర్)	కాయువఆవధియ నడువే స్థే కొయ్య (దినగళల్లి)	మరు ప్రవేశ ప్రతి అప్లికేషన్ నంతర (గంటెగళల్లి)
లేకోసు గిడహేనుగళు		15	75	500–600	7	
గిడహేనుగళు		15.00	75.00	500–600	07	
గిడహేను		15	75	500–600	7	
బిళి థ్రిప్స్		10–20	50–100	500–600	3	
కాటన్ వైట్‌ఫ్లైస్		20	100	500–600	15	
జాసిడ్స్		10	50	500–600	15	
గిడహేను		10	50	500–600	15	
బెండకాయి గిడహేనుగళు (భండి)		15.00	75.00	500–600	03	
రైస్ బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్		10–20	50–100	500–600	7	

బళకెయ నిర్దేశన: న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫూట్ స్ప్రేయర్, కంప్రేషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రేషన్ న్యాప్‌సాక్ బ్యాటరి స్ప్రేయర్ మత్తు ASPEE-HTP పవర్ స్ప్రేయర్.

మున్నెచ్చరికెగళు: 1. ఆహార పదార్థగళు, ఖాలి ఆహార పదార్థగళు మత్తు ప్రాణిగళ ఆహారదింద దూరవిరి.2. బాయి, కణ్ణు మత్తు చిర్మదల్లి సంపర్కవన్ను తప్పిసి. 3. స్ప్రే మంజన్ను ఉసిరాడువుదన్ను తప్పిసి.గాళియ దిక్కినల్లి సింపడిసి.4. సింపడిసిద నంతర కలుషిత బట్టె మత్తు దేహద భాగగళన్ను చేన్నాగి తొళియిరి.5. సింపరణే మాడువాగ ధూమపాన మాడబేడి, కుడియబేడి, తిన్నబేడి మత్తు అగియబేడి. 6. మిశ్రణ మత్తు సింపడిసువాగ సంపూర్ణ రక్షణాత్మక బట్టెగళన్ను ధరిసి.

విషద లక్షణగళు: వాకరికే, వాంతి, తలేనోవు, తలేతిరుగువికే మత్తు హొట్టె–నోవు సంభవిసబహుదు.

ప్రథమ చికిత్సే: 1. నుంగిదరే, గంటలిన హింభాగదల్లి కచిగుళియిడువ మూలక వాంతిగే ప్రేరేపిసుత్తదే. వాంతియాగువవరెగే అదన్ను పునరావర్తిసి స్పష్ట. రోగియు ప్రజ్ఞాహీనవాగిద్దరే వాంతి మాడబేడి.2. బట్టె మత్తు చిర్మవు కలుషితవాగిద్దరే బట్టెగళన్ను తెగేదుహాకి మత్తు కలుషిత చిర్మవన్ను సాకష్టు ప్రమాణద సాబూను మత్తు నీరినింద తొళియిరి. 3 కణ్ణుగళు కలుషితవాగిద్దరే, సుమారు 10 రింద 15 నిమిషగళ కాల సాకష్టు ఉప్పు/శుద్ధ నీరినింద తొళియిరి. ఇన్నేల్ మాడిదరే, రోగియన్ను తాజా గాళిగే తెగేదుహాకి.

ఫ్యోటోటాక్సిసిటి: క్షేత్ర శిఫారసిన ప్రకార ఉత్పన్నవన్ను బళసిదాగ ఫ్యోటోటాక్సిక్ అల్ల.

ప్రతివిషమ: యావుదే నిర్దిష్ట ప్రతివిషమ శిళిదిల్ల. రోగలక్షణవాగి చికిత్సే నీడి.

బళసిద కంటైనర్ విలేవారు: 1. ఖాలి ప్రాత్రెగళన్ను ఒడేదు సుట్టు హాకబేకు. వాసస్థానదింద.2. ప్యాకేజ్‌న బళసిద కంటైనర్‌గళన్ను అవుగళ మరు–బళకెయన్ను తడెయలు హొరగే బిడబారదు.3. బళసిద కంటైనర్‌గళు అథవా ప్యాకేజ్‌గళన్ను అవుగళ మరు–బళకెయన్ను తడెయలు హొరగే బిడబారదు.4. పరిసర మత్తు నీరిన మాలిన్యవన్ను తడెగట్టలు ప్యాకేజ్ అథవా హెచ్చువరి వస్తు మత్తు తొళియువికెయన్ను సురక్షిత రీతియల్లి విలేవారి మాడబేకు.

శేఖరణా పరిస్థితిగళు: 1. కీటనాశకవన్ను హొందిరువ ప్యాకేజుగళన్ను ఇతర వస్తుగళన్ను సంగ్రహిసలు బళసువ కొఠడిగళు అథవా ఆవరణగళింద దూరవిరువ ప్రత్యేక కొఠడిగళు మత్తు ఆవరణదల్లి సంగ్రహిసబేకు అథవా కీటనాశకద ప్రమాణ మత్తు స్వరూపవన్ను అవలంబిసి లాక్ మత్తు కీ అడియల్లి ప్రత్యేక అల్మారాదల్లి ఇడబేకు. 2. కీటనాశకవన్ను సంగ్రహిసలు ఉద్దేశిసలాద కొఠడిగళు అథవా ఆవరణగళన్ను చేన్నాగి నిర్మిసలాగిదే. శుష్క, చేన్నాగి బేళగిద. గాళి మత్తు ఆవియిందద మాలిన్యవన్ను తప్పిసలు సాకష్టు ఆయామగళన్ను హొందిరబేకు.

రాసాయనిక సంయోజనే:

ఎసిటామిప్రిడ్ స.ప.	20.00% తూక/ తూక
సోడియం డోడేసిల్ బేంజీన్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రణ	4.50% తూక/ తూక
సోడియం సల్ఫేట్ మత్తు సోడియం ఆల్కిలేట్ మిశ్రణ	% తూక/ తూక
క్యాల్షియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రేట్	30.00% తూక/ తూక
(బ్లూర్ 10 డైహైడ్రేట్)	0.05% తూక/ తూక
ల్యాక్టోజ్ మోనొహైడ్రేట్	క్యూ ఎస్ %
ఒట్టు	100% తూక/ తూక

ఎచ్చరికే: ఈ లేబుల్ / కరపత్రదల్లి నిర్దిష్టపడిసిద హొరతుపడిసి బేరే బేళెగళల్లి బళసబారదు.

असिटामिप्रिड 20% एसपी

(पूच्चिक्कोल्ली)

असिटामिप्रिड 20% एसपी एंन्पदु 20% सेयलील उळ्ळ मूलप्रोपुरुलान असिटामिप्रिड् कोण्डंद करबायक्कूडिय दूळ् उरुवाक्कम् आकुम्.

परिन्दुरै: परिन्दुरै:कीऴे कोडुक्कप्पट्टुळ्ळ परिन्दुरैकळिन्पडि पयन्पडुत्तुम् पोतु, असिटामिप्रिट् 20% SP पऱुत्तुत्ति पयिरिल् अकवीनी, ज्यारिट्स् मऱ्ऱुम् वेळ्ळैप्पूच्चिकळ्, मिलकायिल् त्रिप्स्, नेल्लिल् पिपिऱ्ऱैच्, मुट्टैक्कोसुम् मऱ्ऱुम् ऒक्राविल् अकवीनी आकियवऱ्ऱैक् कट्टुप्पडुत्तुकिऱदु.इदै अदिक अळवु तेळिद्दु तेळिक्कलाम् अट्टवणैयिल् कोडुक्कप्पट्टुळ्ळपडि तेवैयान अळवु तण्णीरिल् नाप्सार्क्स् स्प्रेयर्स्, कार् अल्लतु राक्केट् तेळिप्पान्क्स्. इदु मोटोट्टार् पोरुत्तप्पट्ट मूडुपनी ऊदुकुऴल्कळैप् पयन्पडुत्ति कुऱैन्द अळविलुम् पयन्पडुत्तलाम्.

पयिर्(कळ्) पोतुवान पेयर् कडैयाक	अळवु/ऱ्ऱेऱ्ऱ अल् (கிராம்)	ஃபோர்முலேஷன் (மிலி)	இடையில் தண்ணீர் (லிட்டர்)	காத்திருப்பு காலம் பூச்சி நீர்த்துப் தெளிப்பு றுவடை (நாட்களில்)
பயிர்(கள்) பொதுவான பெயர்	அளவு/ऱ्ऱेऱ्ऱ அறுவடை (கிராம்)	காத்திருப்பு காலம் இடையே. (கிராம்)	கடைசிஅல் ஃபோர்முலேஷன் (லிட்டர்)	வாட்டர்ஸ்ப்ரேடோ வாட்டர்ஸ்ப்ரேடோ (நாட்கள்)
பராத்தி வளெ்ளை ரக்கள்	20	100	500-600	15
ஜஸெல்லிட்ஸ்	10	50	500-600	15
அஃபிட்ஸ்	10	50	500-600	15
ரஸை பிரவுன் ஒப்பரே	10-20	50-100	500-600	7
மாட்டக்க்க	ோஸ் ஃபிட்ஸ்	15 75	500-600	7
பராத்தி வளெ்ளை ரக்கள்	10-20	50-100	500-600	3
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ்	15 75	500-600	7

पयन्पडुत्तुम् तिक्कै: नाप्कीन् स्प्रेयर्, कार् स्प्रेयर्, कम्प्रषन् नाप्सार्क् स्प्रेयर्, कम्प्रषन् नाप्सार्क् पेट्टरि स्प्रेयर् मऱ्ऱुम् ASPEE-HTP पवर् स्प्रेयर्.

मुन्नेच्चरिक्कैकळ्: 1. उणवुप् पोरुट्कळ्, वेऱ्ऱु उणवुप् पोरुट्कळ् कोळ्ळंकलन्कळ् मऱ्ऱुम् विमऱुक्कुकळिन् उणवु आकियवऱ्ऱिलिरुन्तु विलकि इरुङ्कळ्. 2. वाय्, कण्कळ् मऱ्ऱुम् तोऱ्ऱुडन् तॊटर्पु कॊळ्वतैत् तविर्क्कवुम्. 3. स्प्रेयै मिस्ट्डै उळ्ळिऴुप्पतैत् तविर्क्कवुम். काऱ्ऱु वीसुम् तिसैयिल् तेळिक्कवुम्. 4. तेळिन्द पिऱकु असुत्तमान आडैकळ् मऱ्ऱुम् उडलिन् पागङ्कळै नन्कु तुवैक्कवुम். 5. तेळिक्कुम् पोतु पुकैपिडिक्काताऱ्कळ्, कुडिक्काताऱ्कळ्, चाप्पिडुङ्कळ् मऱ्ऱुम् मॆल्लाताऱ्कळ्. 6. कलवै मऱ्ऱुम् तेळिक्कुम् पोतु मुऴु पाऱुकाप्पु आडैकळै अणियुङ्कळ्.

विषत्तिन् अऱिकुऱिकळ्: कुमट्टल्, वाऱ्ऱि, तलैवलि, तलैसुऱ्ऱल् मऱ्ऱुम् वयिऱ्ऱु वलि एऱ्पडलाम्.

मुतलुतवि: 1. विऴुङ्किनाल्, तॊण्डैयिलिन् पिन्पुकुतियिल् कूच्चम् वैत्तु वाऱ्ऱियॆडुक्कवुम். वाऱ्ऱि तॆळिवाकुम् वरै अतै मीण्डुम् चॆय्यवुम். नोयाळि सुयनिनैविन्ऱि इरुन्ताल् वाऱ्ऱि ऎडुक्क वेण्डाम्. 2. आडै मऱ्ऱुम् तोल् माकुपट्टिरुन्ताल्, तुणिकळै अकऱ्ऱि, असुत्तमान तोलै एराळमान सॊट्पु मऱ्ऱुम् तण्णीरिल् कुऴवुम். 3 कण्कळ् माकुपट्टिरुन्ताल், 10 मुतल् 15 நிமிடங்களுக்கு एराळमान உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவும். 4.உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

पैट्टेटाराक्कैचिट्टि: कॆऴप् परिन्दुरैयिन्पडि पयन्पडुत्तप्पडुम् पोतु तयारिप्पु पैट्टेटाराक्कैयिक् अल्ल.

मारुप् मरुन्तु: कुऱिप्पिट्ट मारुप् मरुन्तु ऎतुवुम् तॆरियविल्लै. अऱिकुऱि चिकिच्चै.

पयन्पडुत्तिय कॊळ्ळंकलनै अप्पुऱप्पडुत्तुतल्: 1. वेऱ्ऱु कॊळ्ळंकलन्कळै उडैत्तु ऎऱिक्क वेण्डुम். 2. पाक्कॆट्टिन् पयन्पडुत्तप्पट्ट कॊळ्ळंकलन्कळै मीण्डुम् पयन्पडुत्तुवतैत् तडुक्क वॆळियेयि विट्क्कूडातु. 3. पयन्पडुत्तिय कॊळ्ळंकलन्कळ् अल्लतु पॊट्टलङ्कळै मीण्डुम् पयन्पडुत्तुवतैत् तडुक्क वॆळियिल् विट्क्कूडातु. 4. कऱ्ऱुच्चूऴलुल् मऱ्ऱुम् नीर् माசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகைமில் பொட்டலம் அல்லது உரிபட் பொருள் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

सेमिप्पक नियन्तनैकळ्: 1. पूच्चिक्कॊल्लि कॊण्डंद पॊट्टलङ्कळ् मऱ्ऱ पॊरुट्कळै सेमिप्पतऱ्कान अऱैकळ् अल्लतु वऴङ्कङ्कळिल् सेमिक्कप्पडुम् अल्लतु पूच्चिक्कॊल्लियिन् अळवु मऱ्ऱुम् तन्मैयैप् पॊऱुत्तु पूट्टु मऱ्ऱुम् चावियिन् कीऴ् तनि अल्மிராவில் வைக்கப்படும். 2. पूच्चिक्कॊल्लि मरुन्तै सेमिप्पतऱ्कान अऱैकळ् अल्लतु वऴङ्कङ्कळ् नन्कु कट्टप्पट्टदाकवुम्, उलर्न्ददाकवुम्, नन्कु वॆळिच्चमाकवुम्, काऱ्ऱोट्टमाकवुम्, நீராவிகளால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவுகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

ऎवतियियल् कलवै:

असिटामिप्रिट् a.i.	20.00 % எ/எ
सोट्टियम् टोटॆसिल् पॆन्सीन् सल्पोनेट्टिन् कलवै	4.50% எ/எ
सोट्टियम् सल्पेट् & सोट्टियम् अल्कॆकलैट् कलवै	% எ/எ
सोट्टियम् सिट्ரேட், டைஹைட்ரேட	30.00% எ/எ
कालसियम् ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் கோலோர்	0.10%
டைஹைட்ரேட்	00.05% எ/எ
लाक्टोस् मोनोनाहैट्ரேட்	க்யூஎஸ் %
மொத்தம்	100 % எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது

Amish CROP SCIENCES

AMPRIDE

Acetamiprid 20% S.P.

(Insecticide)

అమిప్రిడ్

ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్‌పి

(కీటకనాశిని)

अमिप्रिड

ऐसिटामिप्रिड २० प्रतिशत एस.पी.

(कीटकनाशक)

ಅಮಿಪ್ರಿಡ್

ಎಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ప్రమాదకరం विष ವಿಷ POISON YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಯ ಮುಂದೆ ಲೇಬಲ್‌ನ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರಿ

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-130803/2015-Acetamiprid (SP) (354)-220

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE