बेनाक्स

कार्बेडाजिम 50 प्रतिशत संमिश्रणीय चूर्ण
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

कार्बेडाजिम टेक्निकल 51.00 % भार/भार. (भारानुसार 98 प्रतिशत स.त. पर आधारित). **3.** सर्फेस एक्टव ऐजेन्ट-2.00% भार / भार.**4.** एल्काइल एराइल सल्फोनेट डिस्पर्सिग एजेन्ट- 2.00 % भार / भार. एल्काइल नेफथाइल सल्फोनेट स्टिकिंग एजेन्ट-ग्लू/सी.एम.सी 2.00 % भार / भार. इर्नट केरियर चाईना - 43.00% भार / भार. क्ले **योग :** १००.००% भार/भार

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा: स. तत्व ग्राम	प्रति हैक्टेयर मात्रा: संरचना ग्राम	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिन
अंगुर	रूक्ष रोग	150	300	600	--
अखरोट	गीली पत्तियों का विगलन	1.5	3	10लीटर/पेड़	
ककड़ी	चूर्णी आसिता	150	300	600	
	रूक्ष रोग	150	300	600	
कपास	पर्ण चित्ती	125	250	750	--
गुलाब	चूर्णी आसिता	0.5	1	2	--
गेहूं	अनावृत कण्ड	1ग्राम / किग्रा बीज	2ग्राम / किग्रा बीज	1 ली/10 किलो बीज	गीला उपचार
ग्वार	चूर्णी आसिता	175	350	750	
चुकन्दर	पर्ण चित्ती	100	200	400	--
	चूर्णी आसिता	100	200	400	
जूट	पौध अंगमारी	1ग्राम / किग्रा बीज	2ग्राम / किग्रा बीज	1 ली/10 किलो बीज	गीला उपचार
जौ	अनावृत कण्ड	1ग्राम / किग्रा बीज	2ग्राम / किग्रा बीज	1 ली/10 किलो बीज	गीला उपचार
तपियोका	सेट विगलन	0.5	1	1	--
तम्बाकू	मंडुकाक्ष चित्ती	112.5	225	750	--
	रूक्ष रोग	112.5	225	750	--
धान	सहसामारी रोग	125.250	250-500	750	गीला उपचार
	पर्णछेद अंगमारी	1ग्राम / किग्रा बीज	2ग्राम / किग्रा बीज	1 ली/10 किलो बीज	गीला उपचार
	(वायु क्षेत्र)	125-250	250-500	750	गीला उपचार
बेर	चूर्णी आसिता	5	10	10लीटर/पेड़	
बैंगन	पर्ण चित्ती	150	300	600	--
	फल गलन	150	300	600	--
मटर	चूर्णी आसिता	125	250	600	
मिर्च	आर्द्र गलन	1ग्राम / किग्रा बीज	1ग्राम / किग्रा बीज	1 ली/10 किलो बीज	गीला उपचार
मूँग	चूर्णी आसिता	250	500	750	
	पर्णचित्ती तथा जाला अंगमारी	125-250	250-500	750	--
मूंगफली	टिक्का पर्णचित्ती	112.5	225	750	--
लोबिया	पर्ण चित्ती	150	300	600	--
	मूलस्तम्भ विगलन	150	300	600	--
	रूक्ष रोग	150	300	600	--
	चूर्णी आसिता	150	300	600	--
सेब	पामा	1.25	2.5	10लीटर/पेड़	

उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग के लिए निर्देश पानी को कम मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। 5-10 मिनट गीला होने के लिए छोड़ दे। शेष पानी की मात्रा हिलाते हुए जरूरत के अनुसार मिलायें। पीठ पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति चालक एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी. छिडकाव यंत्र आदि । पीठ पर बांधकर छिडकाव करने वाला यंत्र, पैर से चलने वाला छिडकाव कारक यंत्र पीठ पर बांधकर करने वाला यंत्र तथा शक्ति चालक ए.एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी. छिडकाव यंत्र आदि । चेतावनीः गर्भवती महिलाओं को कार्बेडाजिम फार्मुलेशन के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : 1. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। 4. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। 5. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा : 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : मितली, उल्टी, कंपकपी, सिरदर्द पेट में दर्द, दस्त हो सकते हैं।

रासायनिक संरचना :

कार्बेडाजिम टेक्निकल	51.00 % भार/भार.
(भारानुसार 98 प्रतिशत स.त. पर आधारित).	
सर्फेस एक्टव ऐजेन्ट- एल्काइल एराइल सल्फोनेट	2.00 % भार / भार.
डिस्पर्सिग एजेन्ट-एल्काइलनेफथाइल सल्फोनेट	2.00 % भार / भार.
स्टिकिंग एजेन्ट- ग्लू/सी.एम.सी	2.00 % भार / भार.
इर्नट केरियर-चाईना क्ले	43.00% भार / भार.
योग :	१००.००% भार/भार.

सावधानी: "इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग न करें"।

బెనాక్స్

కార్బెండజిమ్ 50% WP
(ద్రైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి)

కార్బెండజిమ్ టెక్. (98% w/w నిమిషాల ఆధారంగా.) 51.00% w/w. ఉపరితలం క్రియాశీల ఏజెంట్-ఆల్కైల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్ 2.00% w/w. వ్యాపింపచేసే ఏజెంట్ ఆల్కిల్నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్ 2.00% w/w. స్టిక్కింగ్ ఏజెంట్-గ్లూ / CMC 2.00% w/w. జడ క్యారియర్ - చైనా క్లే 43.00% w/w. మొత్తం: 100.00% W/W.

సిఫారుసు:

పంట(లు)	తెగులు యొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/HA: ఎ.ఐ.గ్రా	మోతాదు/HA: సూత్రీకరణ gm	నీటిలో పలుచన (లీటర్)	చివరి పిచికారీ నుండి పంట రోజుల వరకు వేచి ఉండే కాలం
ద్రాక్ష	ఆంత్రాక్నోస్	150	300	600	--
వాల్నట్	క్రిందికి ఆకు మచ్చ	1.5	3	10 లీటర్లు/చెట్టు	
దోసకాయ	బూజు తెగులు	150	300	600	
	ఆంత్రాక్నోస్	150	300	600	
పత్తి	ఆకు మచ్చ	125	250	750	--
గులాబీ	బూజు తెగులు	0.5	1	2	--
గోధుమ	వదులైన స్మట్	1గ్రా -కిలో విత్తనం	2 గ్రా -కిలో విత్తనం	1 లీటర్ -10 కిలో విత్తనం	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
క్లస్టర్ బీన్స్	బూజు తెగులు	175	350	750	
బీట్‌రూట్	ఆకు మచ్చ	100	200	400	--
	బూజు తెగులు	100	200	400	
జనపనార	సీడింగ్ ముడత	1గ్రా -కిలో విత్తనం	2 గ్రా -కిలో విత్తనం	1 లీటర్ -10 కిలో విత్తనం	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
బార్లీ	వదులైన స్మట్	1గ్రా -కిలో విత్తనం	2 గ్రా -కిలో విత్తనం	1 లీటర్ -10 కిలో విత్తనం	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
టాపియోకా	సెట్ తెగులు	0.5	1	1	--
పొగాకు	కప్ప కంటి మచ్చ	112.5	225	750	--
	ఆంత్రాక్నోస్	112.5	225	750	--
వరి	ఏరియల్ దశ	125.250	250-500	750	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
	పేలుడు	1గ్రా -కిలో విత్తనం	2 గ్రా -కిలో విత్తనం	1 లీటర్ -10 కిలో విత్తనం	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
	పీత్ బ్లైట్	125-250	250-500	750	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
బెర్	బూజు తెగులు	5	10	10 లీటర్లు/చెట్టు	
వంకాయ	ఆకు మచ్చ	150	300	600	--
	పండు తెగులు	150	300	600	--
బఠానీ	బూజు తెగులు	125	250	600	
మిరపకాయలు	నారు కుళ్ళు	1గ్రా -కిలో విత్తనం	1గ్రా -కిలో విత్తనం	1 లీటర్ -10 కిలో విత్తనం	వెట్ స్లరీ రీట్మెంట్
పెసర్లు	బూజు తెగులు	250	500	750	
	లీఫ్ స్పాట్ & వెబ్ బ్లైట్	125-250	250-500	750	--
వేరుశనగ	టిక్కా ఆకు మచ్చ	112.5	225	750	--
బొబ్బర్లు	ఆకు మచ్చ	150	300	600	--
	కాలర్ తెగులు	150	300	600	--
	ఆంత్రాక్నోస్	150	300	600	--
	బూజు తెగులు	150	300	600	--
ఆపిల్	స్కాబ్	1.25	2.5	10 లీటర్లు/చెట్టు	

ఉపయోగించే విధానం: అవసరమైన పరిమాణం వరకు మందును తీసుకొని, మందపాటి ఏకరీతి పేస్ట్ తయారు చేయడానికి తక్కువ నీటి పరిమాణంలో కలపండి. కావాలంటే 10 నిమిషాలు నానబెట్టవచ్చు. తర్వాత మిగిలిన నీటిని కూడా నెమ్మదిగా కలుపుతూ బాగా కలియబెట్టాలి. ద్రావణం ఏకరీతిగా వచ్చేలా జాగ్రత్తపడాలి.
జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లకు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి. 3. స్ప్రే పొగమంచు పీల్చడం నివారించండి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి. 4. వాష్ పూర్తిగా కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాల తర్వాత చల్లడం. 5. స్ప్రే చేసేటపుడు పొగ త్రాగకూడదు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు. 6. మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి.
విరుగుడు: నిర్దిష్ట వ్యతిరేక మందు తెలియదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.
ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగివేసినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతిని ప్రేరేపించండి. వాంతి స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దీన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగికి వాంతులు ఉంటే ప్రేరేపించవద్దు అపస్మారక స్థితిలో ఉంది. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, వాటిని తొలగించండి బట్టలు మరియు కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బుతో కడగాలి మరియు నీరు. 3. కళ్లు కలుషితమైతే, పుష్కలంగా సెలైన్‌తో ఫ్లష్ చేయండి/సుమారు 10 నుండి 15 నిమిషాలు శుభ్రమైన నీరు. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి. తొలగించండి
విషం యొక్క లక్షణాలు: తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, అతిసారం, వణుకు సంభవించవచ్చు.
సిఫార్సులు : పేలుడు & కోశం నియంత్రించడానికి ఇది సిఫార్సు చేయబడింది వరికి ఆకుమచ్చ తెగులు, గోధుమల వదులుగా ఉండే స్మట్ & కేవలం, మొక్కజొన్న గోధుమ తెగులు, చక్కెర దుంపలు, బఠానీలు, క్లస్టర్ బీన్, దోసకాయలు, గులాబీ & బెర్, ద్రాక్ష మరియు టబాకో యొక్క ఆంత్రాంక్నోస్, జనపనార యొక్క సీడింగ్ ముడత మరియు వాల్‌నట్‌లోని ఆకు మచ్చ, మిరపకాయలు మరియు యాపిల్‌ల స్కాబ్‌ను తగ్గించడం మొదలైనవి.

రసాయన కూర్పు:

కార్బెండజిమ్ టెక్. (98% w/w నిమి ఆధారంగా.)	51.00% w/w.
ఉపరితలం క్రియాశీల ఏజెంట్-ఆల్కైల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్	2.00% w/w.
వ్యాపింపచేసే ఏజెంట్ ఆల్కిల్నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్	2.00% w/w.
స్టిక్కింగ్ ఏజెంట్-గ్లూ / CMC	2.00% w/w.
జడ క్యారియర్ - చైనా క్లే	43.00% w/w.
	మొత్తం: 100.00% W/W.

హెచ్చరిక: "దీని లేబుల్/లీఫ్ లెట్ "పై పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు

ବେନାକ୍ସ

କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବଲ୍ୟୁପି
(ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହୀ କବକନାଶକ)

କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଟେକ୍. (ସର୍ବନିମ୍ନ ୯୮% ଓଜନ/ଓଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ) ୫୧% ଓ/ଓ ପୃଷ୍ଠସକ୍ରିୟ କାରକ-ଆଲକାଇଲ୍ ଆରାଇଲ୍ ସଲଫୋନେଟ୍ ୨.୦% ଓ/ଓ. ବିସ୍ତାରକାରୀ କାରକ ଆଲକାଇଲନାପଥାଇଲ୍ ସଲଫୋନେଟ୍ ୨.୦୦% ଓ/ଓ। ଅଠାଳିଆ ଉପାଦାନ-ଅଠା / ସିଏମ୍‌ସି ୨.୦୦% ଓ/ଓ. ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାହକ – ଚୀନା ମାଟି ୪୩.୦୦% ଓ/ଓ । ମୋଟ: ୧୦୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ ।

ବ୍ୟବହାର ପରାମର୍ଶ:

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା: ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ (ଗ୍ରାମ)	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା: ମିଶ୍ରଣ (ଗ୍ରାମ)	ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଣିର ପରିମାଣ (ଲିଟର)	ସିଞ୍ଚନ ପରେ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନରେ)
ଅଙ୍ଗୁର	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
ଅଖରୋଟ	ନିମ୍ନମୁଖୀ ପତ୍ରଦାଗ	୧.୫	୩	ଗଛପିଛା ୧୦ ଲିଟର	
କଖାରୁ	ପାଂଶୁରକ	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	
	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	
କପା	ପତ୍ରଦାଗ	୧୨୫	୨୫୦	୭୫୦	--
ଗୋଲାପ	ପାଂଶୁରକ	୦.୫	୧	୨	--
ଗହମ	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧ ଗ୍ରାମ/କିଗ୍ରା ବିହନ	୨ ଗ୍ରାମ/କିଗ୍ରା ବିହନ	୧ ଲିଟର/ ୧୦ କିଗ୍ରା ବିହନ	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
ଶିମ୍ବ	ପାଂଶୁରକ	୧୭୫	୩୫୦	୭୫୦	
ସୁଗାର ବିଟ	ପତ୍ରଦାଗ	୧୦୦	୨୦୦	୪୦୦	--
	ପାଂଶୁରକ	୧୦୦	୨୦୦	୪୦୦	
ନଳିତା	ଚାରାପୋଡ଼ା	୧ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୨ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୧ ଲିଟର/ ୧୦ କିଗ୍ରା ବିହନ	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ବିହନ ଉପଚାର
ଯଅ	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୨ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୧ ଲିଟର/ ୧୦ କିଗ୍ରା ବିହନ	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
ଗୟାଆଳୁ	କାଣ୍ଡପଚା	୦.୫	୧	୧	--
ଧୂଆଁପତ୍ର	ଧୂଆଁଳିଆ ଆଖିକୃତି ଦାଗ	୧୧୨.୫	୨୨୫	୭୫୦	--
	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧୧୨.୫	୨୨୫	୭୫୦	--
ଧାନ	ଝୁଲଉଡ଼ା ସମୟ	୧୨୫-୨୫୦	୨୫୦-୫୦୦	୭୫୦	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
	ମହିଷା	୧୨୫-୨୫୦	୨୫୦-୫୦୦	୭୫୦	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
	ଅଙ୍ଗମାରୀ	୧ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୨ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୧ ଲିଟର/ ୧୦ କିଗ୍ରା ବିହନ	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
ବରକୋଳି	ପାଂଶୁରକ	୫	୧୦	ଗଛପିଛା ୧୦ ଲିଟର	
ବାଇଗଣ	ପତ୍ରଦାଗ	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
	ଫଳସଢ଼ା	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
ମଟର	ପାଂଶୁରକ	୧୨୫	୨୫୦	୬୦୦	
ଲଙ୍କା	ମୂଳସଢ଼ା	୧ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୨ ଗ୍ରାମ/ କିଗ୍ରା ବିହନ	୧ ଲିଟର/ ୧୦ କିଗ୍ରା ବିହନ	ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଉପଚାର
ମୁଗ	ପାଂଶୁରକ	୨୫୦	୫୦୦	୭୫୦	
	ଢେଉଢେଉକା ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧୨୫-୨୫୦	୨୫୦-୫୦୦	୭୫୦	
ଚିନାବାଦାମ	ପତ୍ରଦାଗ	୧୧୨.୫	୨୨୫	୭୫୦	--
ବରଗୁଡ଼ି	ପତ୍ରଦାଗ	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
	ମୂଳସଢ଼ା	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
	ପତ୍ରପୋଡ଼ା	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
	ପାଂଶୁରକ	୧୫୦	୩୦୦	୬୦୦	--
ସେଓ	ଯାଦୁରା	୧.୨୫	୨.୫	୧୦ ଲିଟର/ଗଛ	

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କବକନାଶକକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବହଳିଆ ଓ ଭଲଭାବେ ମିଶିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ବନାନ୍ତୁ । ୫ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଭିଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାପ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣିକୁ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ଲଗାତାର ଏହାକୁ ଘାଂଟୁଥାଆନ୍ତୁ । ନାପସାକ ସ୍ପ୍ରେୟର, ପାଦ ଚାଳିତ ସ୍ପ୍ରେୟର, କଂପ୍ରେସନ ନାପସାକ ସ୍ପ୍ରେୟର, କଂପ୍ରେସନ ନାପସାକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର, ASPEEHTP ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିହେବ । ସତର୍କତା: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ମିଶ୍ରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସତର୍କତା: ୧. ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ୨. ମୁହଁ, ଆଖି ଓ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ସ୍ପ୍ରେ ବାଷ୍ପକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପବନ ଦିଗରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ୪. ସ୍ପ୍ରେ ବା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଓ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ । ୫. ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବେଳେ ଧୂମପାନ କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା କିମ୍ବା କିଛି ଚୋବାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ୬. ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାପ୍ରଦାୟୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତିକାର (ବିଷନାଶକ): ଏ କବକନାଶକର କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ବିଷନାଶକ ନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ୧. ଏହି କୀଟନାଶକ ଖାଇଥିଲେ ରୋଗୀର ଗଳାପଛ ପଟେ କୁତୁକୁତୁ କରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ । ବାନ୍ତି ସଫା ନହେବା ଯାଏ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଅଚେତ ଥିଲେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। **୨.** ପୋଷାକ ଏବଂ ଚର୍ମ ଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ପୋଷାକକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଦୂଷିତ ଚର୍ମକୁ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ। **୩.** ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ୧୦ରୁ ୧୫ମିନିଟ ଯାଏ ଆଖିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବା ସାଲାଇନ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। **୪.** ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୀଟନାଶକ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାକୁ ରୋଗୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।
ଲକ୍ଷଣ: ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ତଳିପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, କମ୍ପ ଆସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ବ୍ୟବହାର ପରାମର୍ଶ: ଧାନର ମହିଷା, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଅଙ୍ଗମାରୀ, ଗହମ ଓ ବାର୍ଲିର ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ମକାର ସଢ଼ାରୋଗ, କନ୍ଦମୂଳ, ମଟର, ଶିମ୍ବ, କଖାରୁ, ଗୋଲାପ ଓ କୋଳିର ପାଣ୍ଡୁରକ ରୋଗ, ଅଙ୍ଗୁର ଓ ଧୂଆଁପତ୍ରର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ନଳିତାର ଚାରାପୋଡ଼ା, ଅଖରୋଟର ନିମ୍ନମୁଖୀ ପତ୍ରଦାଗ, ଲଙ୍କାର ମୂଳସଢ଼ା ଏବଂ ଆପଲର ଯାଦୁରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି କବକନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଟେକ୍.	
(ସର୍ବନିମ୍ନ ୯୮% ଓଜନ/ଓଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ)	୫୧% ଓ/ଓ
ପୃଷ୍ଠସକ୍ରିୟ କାରକ-ଆଲକାଇଲ୍ ଆରାଇଲ୍ ସଲଫୋନେଟ୍	୨.୦% ଓ/ଓ.
ବିସ୍ତାରକାରୀ କାରକ ଆଲକାଇଲନାପଥାଇଲ୍ ସଲଫୋନେଟ୍	୨.୦୦% ଓ/ଓ
ଅଠାଳିଆ ଉପାଦାନ-ଅଠା / ସିଏମ୍‌ସି	୨.୦୦% ଓ/ଓ.
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାହକ – ଚୀନା ମାଟି	୪୩.୦୦% ଓ/ଓ
	ମୋଟ: ୧୦୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ସାବଧାନ: ଏହି ଲେବଲ ବା ଲିଫଲେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Amish
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

BENAX

Carbendazim 50% WP
(Systemic Fungicide)

బెనాక్స్
కార్బెండజిమ్ 50% WP
(ద్రైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి)

बेनाक्स
कार्बेडाजिम 50 प्रतिशत संमिश्रणीय चूर्ण
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಬೆನಾಕ್ಸ್
ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Read enclosed leaflet before use.
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उड्डमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। **+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइलः** customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No. : CIR-130795/2015-Carbendazim (WP) (354)-640

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

BENAX

Carbendazim 50% WP
(Systemic Fungicide)

Carbendazim Tech. (based on 98% w/w min.) 51.00% w/w. Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate 2.00% w/w. Dispersing agent-Alkylnaphthyl sulfonate 2.00% w/w. Sticking agent-Glue / CMC 2.00% w/w. Inert carrier - China clay 43.00% w/w. **Total:** 100.00% W/W.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest days
		Al gm	Formulation gm		
Grapes	Anthracnose	150	300	600	- -
Walnut	Downy leaf spot	1.5	3	10 ltr/tree	
Cucurbits	Powdery mildew	150	300	600	
	Anthracnose	150	300	600	
Cotton	Leaf spot	125	250	750	- -
Rose	Powdery mildew	0.5	1	2	- -
Wheat	Loose smut	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	Wet slury reatment
Cluster Beans	Powdery mildew	175	350	750	
Sugar beet	Leaf spot	100	200	400	- -
	Powdery mildew	100	200	400	
Jute	Seeding blight	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	Wet slury seed reatment
Barley	Loose smut	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	Wet slury reatment
Tapioca	Set rot	0.5	1	1	- -
Tobacco	Frog eye spot	112.5	225	750	- -
	Anthracnose	112.5	225	750	- -
Paddy	Arial Phase	125-250	250-500	750	Wet slury reatment
	Blast	125-250	250-500	750	Wet slury reatment
	Sheath Blight	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	Wet slury reatment
Ber	Powdery mildew	5	10	10 ltr/tree	
Brinjal	Leaf spot	150	300	600	- -
	Fruit rot	150	300	600	- -
Peas	Powdery mildew	125	250	600	
Chillies	Damping off	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	Wet slury reatment
Moong	Powdery mildew	250	500	750	
	Leaf Spot & Web blight	125-250	250-500	750	
Groundnut	Tikka leaf spot	112.5	225	750	- -
Cow Pea	Leaf Spot	150	300	600	- -
	Coller rot	150	300	600	- -
	Anthracnose	150	300	600	- -
	Powdery mildew	150	300	600	- -
Apple	Scab	1.25	2.5	10 ltr/tree	

Direction Of Use : Mix required quantity in a small quantity of water to move thick uniform paste. Allowed to soak for 5 to 10 minutes. Add remaining quantity of water slowly while stiring continously and make up the volume. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, ASPEEHTP power sprayer. WARNING: Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty food stuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and Spraying.

Antidote : No specific anti-dote is known. Treat Symptomatically.

First Aid:1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Symptoms Of Poisoning: Headache, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, tremors may occur.

Recommendations : It is recommended to control blast & sheath blight of paddy, loose smut of wheat & barely, brown rot of maize, powdery mildew of sugar beet, peas, clustur bean, cucurbits, rose & ber, anthrancnose of grapes and tabacco, seeding blight of Jute and downy leaf spot of Walnut, damping off of Chillies and scab of Apples etc.

Chemical Composition:

Carbendazim Tech.	
(based on 98% w/w min.)	51.00% w/w.
Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w.
Dispersing agent- Alkylnaphthyl sulfonate	2.00% w/w.
Sticking agent-Glue / CMC	2.00% w/w.
Inert carrier - China clay	43.00% w/w.
Total:	100.00% W/W.

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

பெனாக்ஸ்

கார்பென்டாசிம் 50% WP
(முறையான பூஞ்சைக் கொல்லி)

கார்பேன்டாஜிம் டேக். (குறைந்தபட்சம் 98% w/w. அடிப்படையில்) சர்ஃபேஸ் ஆக்ட்டிவ் ஏஜென்ட்- ஆல்கைல் அரைல் சால்ஃபேனேட் 2.00% w/w. டிஸ்பர்ஸிங் ஏஜென்ட் ஆல்கைல் நாப்தாயல் சால்ஃபேனேட் 2.00% w/w. ஸ்டிக்கிங் ஏஜென்ட் - க்ளூ / சிஎம்சி 2.00% w/w. இனர்ட் காரியர் - சீனா க்ளே 43.00% w/w. மொத்தம்: 100.00% W/W.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுவான பெயர்	மறுத்து அளவு/HA		தண்ணீரில் நீர்த்துதல் (லீ)	கடைசி ஸ்பிரேய மற்றும் அறுவடை நாட்கள் இடையில் காத்திருக்கும் காலம்
		ஏ.எல். gm	ஃபார்முலேஷன் gm		
திராட்சை	ஆன்த்ராக்னோஸ்	150	300	600	- -
வால்நட்	டௌநீ லீஃப் ஸ்பாட்	1.5	3	10 ltr/tree	
க்யூகற் பிட்ஸ்	பவுடரீ மில்டியூ	150	300	600	
	ஆன்த்ராக்னோஸ்	150	300	600	
பகுதி	லீஃப் ஸ்பாட்	125	250	750	- -
ரோஜா	பவுடரீ மில்டியூ	0.5	1	2	- -
கோதுமை	லூஸ் ஸ்மட்	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
கிளஸ்டர் பீன்ஸ்	பவுடரீ மில்டியூ	175	350	750	
சுகர் பீட்	லீஃப் ஸ்பாட்	100	200	400	- -
	பவுடரீ மில்டியூ	100	200	400	
ஜூட்	சீடிங் ப்லைட்	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	வெட் சலூரி ஸீட் ற்றேஅத்மேன்ட்
பார்லி	லூஸ் ஸ்மட்	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
டாபியோகா	செட் ரோட்	0.5	1	1	- -
புகையிலை	ஃப்ரோக் ஐ ஸ்பாட்	112.5	225	750	- -
	ஆன்த்ராக்னோஸ்	112.5	225	750	- -
நெல்	ஏரியல் ஃபேஸ்	125-250	250-500	750	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
	ப்ளாஸ்ட	125-250	250-500	750	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
	ஷீத் ப்லைட்	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
பேர்	பவுடரீ மில்டியூ	5	10	10 ltr/tree	
கத்தரிக்காய்	லீஃப் ஸ்பாட்	150	300	600	- -
	Fruit rot	150	300	600	- -
பட்டாணி	பவுடரீ மில்டியூ	125	250	600	
மிளகாய்	டம்பிங் ஆஃப்	1gm-kg seed	2gm-kg seed	1 lit/10kg seed	வெட் சலூரி ஸீட் ரீட்மெண்ட்
மூங்	பவுடரீ மில்டியூ	250	500	750	
	லீஃப் ஸ்பாட் & வெப் ப்லைட்	125-250	250-500	750	
நிலக்கடலை	டிக்கா லீஃப் ஸ்பாட்	112.5	225	750	- -
கவு பீ	லீஃப் ஸ்பாட்	150	300	600	- -
	காலர் ரோட்	150	300	600	- -
	ஆன்த்ராக்னோஸ்	150	300	600	- -
	பவுடரீ மில்டியூ	150	300	600	- -
ஆப்பிள்	ஸ்காப்	1.25	2.5	10 ltr/tree	

பயன்படுத்தும் வழி: தடிமனான, சீரான பேஸ்ட்டை உருவாக்க தேவையான அளவு தண்ணீரை ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் கலக்கவும். 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் நிற்க அனுமதிக்கவும். தொடர்ந்து கிளறிக் கொண்டிருக்கும் போது மீதமுள்ள தண்ணீரை மெதுவாகச் சேர்க்கவும். நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ஃபூட் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர், ஏஎஸ்பிஈஈஎச்டிபி பவர் ஸ்ப்ரேயர். எச்சரிக்கை: கர்ப்பிணி பெண்கள் கார்பன்டாசிம் கலவையுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

தற்காப்பு நடவடிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரேமிஸ்டை உள்ள இழுக்காதீங்க.காற்றின் திசையில் ஸ்பிரே பண்ணுங்க. 4 . ஸ்பிரே பண்ண ஆபிராம் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. ஸ்பிரே பண்ணும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடாதீர்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. ஸ்பிரே மற்றும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். **ஆன்டிடொட்** : குறிப்பாக எந்த ஆன்டிடொட் இல்ல. சிம்ப்டோமாட்டிக்கா ட்ரீட் பண்ணுங்க.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூச்சலிடுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டவும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி சுயநினைவின்றி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோலில் அசுத்தம் இருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமானதை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. என்றால் கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான நீர் உடன் கழுவவும். 4. சுவாசித்தால், நோயாளியை நல்ல காற்றாடும் இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு, நடுக்கம் ஏற்படலாம்.

பரிந்துரைகள்: நெல் பயிரில் ப்ளாஸ்ட் & ஷீத் பிலைட்; கோதுமை & அரிதாகயில் லூஸ் ஸ்மட்; மக்காச்சோளத்தில் பிரவுன் ரோட்; சுகர் பீட், பட்டாணி, க்ளஸ்டர் பீன், குக்குர்பிட்ஸ், ரோஸ் & பெறில் பவுடரீ மில்டியூ; திராட்சை மற்றும் புகையிலையில் ஆன்த்ராக்னோஸ்; ஜூட்டில் சீடிங் பிலைட்; வால்நுட்டில் டௌநீ லீஃப் ஸ்பாட், மேலேகாவில் டம்பிங் ஆஃப்; ஆப்பிளில் ஸ்கைப்; இவற்றை தடுக்கும்.

இரசாயன களவு:

கார்பேன்டாஜிம் டேக். (குறைந்தபட்சம் 98% w/w அடிப்படையில்)	51.00% w/w
சர்ஃபேஸ் ஆக்ட்டிவ் ஏஜென்ட்- ஆல்கைல் அரைல் சால்ஃபேனேட்	2.00% w/w
டிஸ்பர்ஸிங் ஏஜென்ட் - ஆல்கைல் நாப்தாயல் சால்ஃபேனேட்	2.00% w/w
ஸ்டிக்கிங் ஏஜென்ட் - க்ளூ / சிஎம்சி	2.00% w/w.
இனர்ட் காரியர் - சீனா க்ளே	43.00% w/w.
மொத்தம்:	100.00% W/W.

எச்சரிக்கை: "இதில் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது லேபிள்/துண்டறிக்கை".

ಬೆನಾಕ್ಸ್

ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಸಿಸ್ಟಿಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ ಟೆಕ್. (ಕನಿಷ್ಠ 98% w/w ಆಧಾರಿತ) 51.00% w/w . ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 2.00% w/w. ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಅಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 2.00% w/w. ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಗ್ಲೂ / ಸಿಎಂಸಿ 2.00% w/w. ಇನರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ - ಚೇನಾ ಕ್ಲೇ 43.00% w/w. ಒಟ್ಟು: 100.00% W/W.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ/ HA		ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈಲುಷನ್ (ಲೀ	ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ದಿನದ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂತರ
		AL ಗ್ರಾಂ	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಗ್ರಾಂ		
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	300	600	- -
ಆಕ್ರೋಟ್	ಡೌನಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	1.5	3	1ಯೂನಿಟ್ ಲೀ/ಮರ	
ಸೋರೆ ಕಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	150	300	600	
	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	300	600	
ಹತ್ತಿ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	125	250	750	- -
ಗುಲಾಬಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.5	1	2	- -
ಗೋಧಿ	ಲೂಸ್ ಸ್ಮಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	2 ಗ್ರಾಂ.- ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಗೋರಿ ಕಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	175	350	750	
ಶುಗರ್ ಬೀಟ್t	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	100	200	400	- -
	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	100	200	400	
ಸೆಣಬು	ಸೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	2 ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	1 ಲೀ/ 10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಜವೆ ಗೋಧಿ	ಲೂಸ್ ಸ್ಮಟ್	1 ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	2ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1 ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ	ಸೆಟ್ ರಾಟ್	0.5	1	1	- -
ತಂಬಾಕು	ಫ್ರಾಗ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್	112.5	225	750	- -
	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	112.5	225	750	- -
ಭತ್ತ	ಏರಿಯಲ್ ಫೇಸ್	125-250	250-500	750	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	125-250	250-500	750	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
	ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	2ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	300	600	- -
ಆಕ್ರೋಟ್	ಡೌನಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	1.5	3	1ಯೂನಿಟ್ ಲೀ/ಮರ	
ಸೋರೆ ಕಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	150	300	600	
	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	150	300	600	
ಹತ್ತಿ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	125	250	750	- -
ಗುಲಾಬಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.5	1	2	- -
ಗೋಧಿ	ಲೂಸ್ ಸ್ಮಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	2 ಗ್ರಾಂ.- ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಗೋರಿ ಕಾಯಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	175	350	750	
ಶುಗರ್ ಬೀಟ್t	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	100	200	400	- -
	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	100	200	400	
ಸೆಣಬು	ಸೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	2 ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು	1 ಲೀ/ 10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಜವೆ ಗೋಧಿ	ಲೂಸ್ ಸ್ಮಟ್	1 ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	2ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1 ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ	ಸೆಟ್ ರಾಟ್	0.5	1	1	- -
ತಂಬಾಕು	ಫ್ರಾಗ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್	112.5	225	750	- -
	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	112.5	225	750	- -
ಭತ್ತ	ಏರಿಯಲ್ ಫೇಸ್	125-250	250-500	750	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	125-250	250-500	750	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
	ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್	1ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	2ಗ್ರಾಂ - ಕೆಜಿ ಬೀಜ	1ಲೀ/10ಕೆಜಿ ಬೀಜ	ವೆಟ್ ಸ್ಲರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಹಾಕಿ. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಯೇರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್,ASPEEHTP ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರ ಇರಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇಡುವ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ/ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಕಿಸಬೇಡಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಸ್ಟ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. 4. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಧರಿಸನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ಆಂಟಿಡೋಟ್: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಿಮ್ಟೊಮಾಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಬಾಯಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ವೊಮಿಟಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ರೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಮೂಗಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತನ್ನಿ.

ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೇಧಿ, ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು : ಇದು, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ & ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್; ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜವೆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಮಟ್, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರಾಟ್; ಶುಗರ್ ಬೀಟ್, ಅವರೆಕಾಳು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬೆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ; ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಥ್ರಕ್ನೋಸ್; ಸೆಣಬಿನಲ್ಲಿ ಸೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಟ್; ಆಕ್ರೋಟ್ನಲಿ ಡೌನಿ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್; ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್; ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಬ್; ಇವ್ವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ ಟೆಕ್. (ಕನಿಷ್ಠ 98% w/w ಆಧಾರಿತ)	51.00% w/w .
ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	2.00% w/w.
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಅಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	2.00% w/w.
ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ - ಗ್ಲೂ / ಸಿಎಂಸಿ	2.00% w/w.
ಇನರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ - ಚೇನಾ ಕ್ಲೇ	43.00% w/w.
ಒಟ್ಟು:	100.00% W/W.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ".

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

BENAX

Carbendazim 50% WP
(Systemic Fungicide)

బెనాక్స్
కార్బెండజిమ్ 50% WP
(ద్రైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి)

बेनाक्स
कार्बेडाजिम 50 प्रतिशत संमिश्रणीय चूर्ण
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ಬೆನಾಕ್ಸ್
ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ
(ಸಿಸ್ಟಿಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Read enclosed leaflet before use.
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उड्डुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No. : CIR-130795/2015-Carbendazim (WP) (354)-640

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE