# Carbofuran 3% C.G.

## (Insecticide)

It is a broad spectrum carbamate insecticide, nematocide and miticide having systematic action. It contains 3% active ingredient carbofuran and balance other relevant ingredients.

**Recommendation :**

| Crop(s) | Common name of Pest | Dosage/HA A.I. (gm) | Formulation (kg) | Dilution in water (Ltr) | Waiting Period between last spray to harvest (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peach | Leaf curi aphid | 1000 | 33.3 | - | - |
| Potato | Aphid | 500 | 16,55 | - | - |
| | Jassids | 1000 | 33.33 | - | - |
| Banana | Rhizome weevil | 1gm per suckers | 33.3gm per suckers | - | - |
| | Aphid | 5 per suckers | 166 gm per suckers | - | - |
| | Nematode | 1.5 per suckers | 50 gm per suckers | - | - |
| Sugarcane | Top borer | 1000 | 33,3 | - | - |
| Wheat | Ear cockle,Nematode | 3000 | 100 | - | - |
| | Cereal cyst, Nematode | 2000 | 66,6 | - | - |
| | Aphid | 1000 | 33,3 | - | |
| | Jassid | 1250 | 41,6 | - | - |
| | Cyst Nematode | 1000 | 33,3 | - | - |
| Jute | Nematodes | 1000 | 33,3 | - | - |
| Barlery | Aphid | 1000 | 33,3 | - | - |
| | Jassid | 1250 | 41,6 | - | - |
| | Cyst nematode | 1000 | 33,3 | - | - |
| Sorghum | Shoot Fly | 1000 | 33,3 | - | - |
| | Stem Borer | 250 | 8.3 | - | - |
| Tomato | White fly | 1200 | 40 | - | - |
| Paddy | Brown Plant Hopper, Hispa, Green Leaf hopper Gall Midge | 750 | 25 | - | - |
| Citrus | Nematode | 360 | 12 | - | - |
| | Leaf miner | 1500 | 50 | - | - |
| Cabbage | Nematode | 1500 | 50 | - | - |
| | Shootfly | 1500 | 50 | – | - |
| Bajra | Shoot fly | 1500 | 50 | | |
| Brinjal | Root knot Nematode Reniform Nematode | 2000 | 66,6 | - | - |
| Bhindi | Jassids | 1000 | 33,3 | - | - |
| Maize | Stem Borer, Shoot Fly | 1000 | 33,3 | - | - |
| | Thrips | 1000 | 33,3 | - | - |
| Chillies | Aphid, Thrips | 1000 | 33,3 | - | - |
| Groundnut | Pod borer | 1500 | 50 | | |
| | White grub | 1000 | 33,3 | | |
| Mandrains | Soft greens scale | 0,4 per plant | 13,3 gm per plant\ | | |
| Mustard | Mustard Leaf miner | 1000 | 33,3 | | |
| Apple | Whooly aphid | 5/TREE | 0,166/TREE | | |
| Frenchbean | White Grub | 700 | 23,3 | - | - |
| Soyabean | White Fly | 1500 | 50 | - | - |
| | Root knot Nematode | 2000 | 66,6 | - | - |
| Frenchbean | White Grub | 700 | 23,3 | - | - |

**Direction of Use :**

PP Equipment: Hand operated granule aplicator of leaf whorl applicator by mechanaical disperser, or by hand bearing rubber gloves.

**Precaution:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after use. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 6.The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots either face shield or dust mask an overall or rubber apron hood or hat.

**Symptoms Of Poisoning:** Headace, nausea, dizziness, vomiting, abodominal pain, profuse, sweating and salivation, constriction of pupils, muscular incoordination, tightness in chest, coma & death may occur.

**First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Phytotoxicity :** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

**Antidote :** 1. Atropine the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2-4 mg of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval . As much as 25 to 50 mg of atropine maybe required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. 2 PAM is of not much value and should be avoided. 3. Artificial respiration maybe given, if needed.

**Disposal Of Used Container:**

CONDITIONS TO BE SPECIFIED FOR STORAGE OF INSECTICIDE.

1.The packages containing the Insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the Insecticide. 2. The rooms or premiese means for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

**Storage Conditions :**

DISPOSAL OF USED PACKAGES, SURPLUS MATERIALS & WASHING OF INSECTICIDE

1. It shall be the duty of manufacturers formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

**Chemical Composition:**

| | |
|---|---|
| Carbofuran tech (based on 75% w/w/ a.i.) | 4.00% w/w |
| Calclum Silicate | 5.00% w/w |
| Blank Gracules (Bentonite) | 91.00% w/w |
| Total | 100% w/w |

**Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

# కార్బోఫ్యురాన్ 3% సి.జి.

## (కీటకనాశిని)

కార్బోఫ్యురాన్ 3% సిజి సక్రియ పదార్థంగా మరియు తత్సంబంధ సహాయకములు గల కార్బమేట్ సమూహమునకు చెందిన నులి పురుగులు, నల్లినాశిని మరియు విస్తృత అంతర్వాహక చర్యగల కీటకనాశిని.

**సిఫారసు :**

| పంటలు | కీటకాల సాధారణ నామము | మోతాదు/హె. సి.వి. (గ్రా) | సూత్రీకరణ (గ్రా) | నీటి పరిమాణం (లీ) | చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|
| పీచుపండు | పేనుబంక | 1000 | 33.3 | - | - |
| బంగాళదుంప | పేనుబంక | 500 | 16.6 | - | - |
| | పచ్చదోమలు | 1000 | 33.3 | - | - |
| అరటి | దుంపతొలుచు పురుగు | 1గ్రా/సక్కర్ | 33.3/సక్కర్ | - | - |
| | పేనుబంక | 5/సక్కర్ | 166గ్రా/సక్కర్ | - | - |
| | నులిపురుగులు | 1.5/సక్కర్ | 50గ్రా/సక్కర్ | - | - |
| చెరకు | పీక పురుగు | 1000 | 33.3 | - | - |
| గోధుమ | నులిపురుగు | 3000 | 100 | - | - |
| | సిస్టునులిపురుగు | 2000 | 66.6 | | |
| జనుము | నులిపురుగులు | 1000 | 33.3 | - | - |
| బార్లీ | పేనుబంక | 1000 | 33.3 | - | - |
| | పచ్చదోమ | 1250 | 41.6 | - | - |
| | సిస్టునులిపురుగు | 1000 | 33.3 | - | - |
| జొన్న | కాండం ఈగ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | కాండంతొలుచు పురుగు | 250 | 8.3 | - | - |
| టమోట | తెల్లదోమ | 1200 | 40 | - | - |
| వరి | సుడిదోమ, ఆకుతొలుచు పచ్చదోమలు, తాటాకు పురుగు | 750 | 25 | - | - |
| నిమ్మజాతి | నులిపురుగు | 360 | 12 | - | - |
| | ఆకుతొలుచు పురుగు | 1500 | 50 | - | - |
| క్యాబేజి | నులిపురుగు | 1500 | 50 | - | - |
| సజ్జలు | కాండం ఈగ | 1500 | 50 | - | - |
| వంగ | చేరదు మట్టునుండే నులిపురుగు రెనిఫారమ్ నులిపురుగు | 2000 | 66.6 | - | - |
| బెండ | పచ్చదోమలు | 1000 | 33.3 | - | ఆ |
| మొక్కజొన్న | కాండంతొలుచుపురుగు, కాండంతొగ్గు తామరపురుగులు | 1000 | 33.3 | - | - |
| మిరప | తామరపురుగులు, పేనుబంక | 1000 | 33.3 | - | - |
| వేరుశనగ | కాయతొలుచు పురుగు | 1500 | 50 | - | - |
| | వేరు పురుగు | 1000 | 33.3 | - | - |
| మాండ్రేన్లు | పచ్చపొలుసుపురుగు | 0.4/చెట్టుకు | 0.4/చెట్టుకు | 13.3.గ్రా/చెట్టుకి | |
| ఆవాలు | ఆకుతొలుచుపురుగు | 1000 | 33.3 | - | - |
| ఆపిల్ | ఉన్ని పేనుబంక | 5/చెట్టుకి | 0.166/చెట్టుకి | - | - |
| ఫ్రెంచిబీన్సు | వేరుపురుగు | 700 | 23.3 | - | - |
| సోయాబీన్ | తెల్లదోమ | 500 | 50 | - | - |
| | చేరదు మట్టునుండే నులిపురుగు | 2000 | 66.6 | - | - |

**ఉపయోగించుటకు సూచన :**

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరం : చేతితో పనిచేయు గ్రాన్యూల్ అప్లికేటరు లేదా యంత్రంతో వెదజల్లు లీఫ్‌రోల్ అప్లికేటరు లేదా చేతికి రబ్బరు తొడుగులు వేసుకొని వెదజల్లుట.

**ముందుజాగ్రత్త :** 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. ఉపయోగించునపుడు మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనండి. 5. మందును ఉపయోగించునప్పుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట లేదా ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. ఉపయోగించువ్యక్తి పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు, రబ్బరు చేతితొడుగులు, బూట్లు, ముఖకవచం లేదా డస్ట్‌మాస్క్ లేదా రబ్బరు ఏప్రాను, హుడ్ లేదా టోపి వంటివి ధరించండి.

**విషలక్షణాలు:** తలనొప్పి, వికారం, మగత, వాంతులు, విరోచనాలు, కడుపులో నొప్పి, అధికంగా చెమటలు మరియు చొల్లు, కనుపాపలు కుంచించుకొనుట, కండరాల అస్థిరత, ఛాతి బిగుసుకొనుట, కోమా మరియు మరణం వంటివి సంభవించవచ్చు.

**ప్రథమచికిత్స :** 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలించండి.

**విషతుల్యత :** సిఫారసు మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

**విరుగుడు:** 1. రోగికి వెంటనే అట్రాపిన్ చికిత్సను 2 నుండి 4 మి.గ్రా అట్రాపిన్ సల్ఫెట్‌తో ఇవ్వాలి నరాల ద్వారా 5 నుండి 10 నిముషాల విరామంతో మరల మరల ఇవ్వండి. ఒక రోజులో 25 నుండి 50 మి.గ్రా. అట్రాఫిన్ మోతాదు అవసరం అవుతుంది. అట్రోఫిన్ మోతాదు రోగి లక్షణములపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మోతాదును సవరించడానికి కార్చే లాలాజల పరిమాణం ఉపయోగకరమైన ప్రామాణికత. 2.2 పి.ఎ.ఎమ్‌ని సరైనది కాదు కాబట్టి ఇవ్వరాదు. 3. అవసరమైనచో కృత్రిమ శ్వాసను అందించాలి.

**ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన :** 1. కీటకనాశిని తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

**నిల్వ:** కీటకనాశిని నిల్వ పరిస్థితులను ప్రత్యేకంగా సూచించవలెను. 1. కీటకనాశినిని నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. కీటకనాశినిని నిల్వచేయు గదులు సరిగా నిర్మించబడి పెడిగా గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో ఉండాలి.

**రసాయన మిశ్రమం:**

| | |
|---|---|
| కార్బోఫ్యురాన్ టెక్నికల్ (75% భా/భా స.వ.స్వచ్ఛతపై ఆధారిత) | 4.00% భా/భా |
| క్యాల్షియం సిలికేట్ | 5.00% భా/భా |
| బ్లాంక్ గుళికలు (బెంటొనైట్) | 91.00% భా/భా |
| మొత్తం | 100% భా/భా |

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైతప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

# कार्बोफयुरान ३ प्रतिशत सी जी

## (कीटनाशक)

यह एक बहुत असरदार कार्बमेट यौगिक है जो कीट नाशक, सूत्रकर्मीनाशक तथा कुटकी नाशक है। यह निगले जाने पर उसर करता है। इसमे भार के हिसाब से ३ प्रतिशत सक्रिय तत्व कार्बोफयुरान तथा अन्य सहयोगी पदार्थ है ।

**उपयोग :**

| फसल | कीट के नाम | प्रति हेक्टेयर मात्रा र, तत्व (ग्राम) | संरचना (कि.ग्राम.) | पानी की मात्रा (लीटर) | अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| आडू | पत्ती मोडक माहु | १००० | ३३.३ | | |
| आलू | माहु | ५०० | १६.६ | | |
| | तेला | १००० | ३३.३ | | |
| केला | राइजोम घुन | १ ग्राम प्रति पौधा | ३३.३ ग्राम प्रति पौधा | | |
| | माहु | ५० ग्राम प्रति पौधा | १६.६ग्राम प्रति पौधा | | |
| | सूत्र कृमि | ९.५ग्राम प्रति पौधा | ५० ग्राम प्रति पौधा | | |
| गन्ना | शीर्ष छेदक | १००० | ३३.३ | | |
| गेहूं | ईयर सूत्र कृमि | ३००० | १०० | | |
| | सीरियल सूत्र कृमि | २००० | ६६.६० | | |
| जूट | तना का घुन | १००० | ३३.३ | | |
| जौ | माहु | १००० | ३३.३ | | |
| | तेला | १२५० | ४१.६५ | | |
| | सिस्ट सूत्रकर्मी | १००० | ३३.३ | | |
| ज्वार | तना मक्खी | १००० | ३३.३ | | |
| | तना छेदक | २५० | ८.३ | | |
| टमाटर | सफेद मक्खी | १२०० | ४०० | | |
| धान | भूरा फुदका, कर्कश रोमिल हरी पत्ती का फूदका, पीगा गाई | ७५० | २५ | | |
| नीबू | सूत्र कृमि | ३६० | १२ | | |
| | पत्ती का सुंरगी कीट | १५०० | ५० | | |
| पत्त गोभी | सूत्र कृमि | १५०० | ५० | | |
| बाजरा | तना मक्खी | १५०० | ५० | | |
| बैंगन | जड का सूत्र कृमि | २००० | ६६.६ | | |
| | रेनिफार्म सूत्र कृमि | २००० | ६६.६ | | |
| भिंडी | तेला | १०० | ३३.३ | | |
| मक्का | तना धेदक तना मकखी, दुरदा | १००० | ३३.३ | | |
| मिर्च | माहु, चुरदा | १००० | ३३.३ | | |
| मूंगफली | फली छेदक | १५०० | ५० | | |
| | सफेद लट | १००० | ३३.३ | | |
| संतरा | मुयायम हरे स्केल | ०.४प्रतिपौधा | १३.३ ग्राम /प्रतिपौधा | | |
| सरसों | सरसों की पत्ती का सुंरगी कीट | १००० | ३३.३ | | |
| सेब | बालवाली माहु | ५/वृक्ष | ०.१६६/वृक्ष | | |
| सेम | सफेद लट | ७०० | २३.३ | | |
| सोयाबीन | सफेद मक्खी | १५०० | ५० | | |
| | जड की गांठ का सूत्र कर्मी | २००० | ६६.६ | | |

**उपयोग के लिये निर्देश :** हाथ से चलाने वाला ग्रेन्युल एप्लिकेटरए लीफहोर्ल एप्लिकेटर, मशीन से चलने वाला डिस्पर्सर या रबड के दस्ताने पहन कर हाथ से।

**प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुहँ, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने जैसे दस्ताने जूते मास्क रबर ऐप्रान टोप आदि पहनने चाहिये।

**विष के लक्षण :** सिरदर्द सि चर राना, भ्रमि, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, अधिक पसीना आना, लार टपकना आँखों की पुतलियों का सिकुडना, नसों में तनाव, कोमा और मृत्यु हो सकते हैं।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दें और त्वाचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्व हवा में ले जायें।

**पौधविशाक्तता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

**विषनाशक :** १. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. किसी ऑक्जीम जैसे २- एम का प्रयोग न करें। ३. यदि आवश्यक हो तो ऑक्सीटन दी जा सकती हैं।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. किटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि. डिब्बो को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये खाली डिब्बे को दूबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोडे। ३. डिब्बों या बची हुईकिटनाशक या धोवन का निपटारा करे जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो।

**संग्रहण की शर्तें:** १. किटनाशक रखे हुए पैकजो आदि ऐसे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरें या आलमारी में कीटनाशक का भणडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाशयुक्त, हवादार ता पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहये जिससेंकीकीटनाशक की भाप से प्रदूषण होना का भय न हों ।

**रासायनिक संरचना:**

| | |
|---|---|
| कार्बो टेकनिकल (भारानुसार ७५ प्रतिशत स.क. पर आधारित) | ४.००० % भा/भा |
| कैलशियम सिलीकेट | ५.००० % भा/भा |
| ब्लेक ग्रन्युल्स (बेंटोनाइट) | ९१.००० % भा/भा |
| योग | १००.००० %भा/भा |

**चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।**

Amish CROPSCIENCES

# CARBOZEN

## Carbofuran 3% CG

## (Insecticide)

## కార్బోజిన్

## కార్బోఫ్యురాన్ 3% సిజి

## (కీటకనాశిని)

## कारबोजीन

## कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

## (कीटनाशक)

## ಕಾರ್ಬೋಜಿನ್

## ಕಾರ್ಬಾಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 75% ಎಸ್‌ಜಿ

## (ಕೀಟನಾಶಕ)

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".**

# INSTRUCTIONS FOR USE

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN**

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

విషము विष ज़हर POISON ವಿಷ

RED

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।


Manufactured by :

**PRISTINE AGRO LIMITED**

Sy No 494,Koyalagudem Village, Devalamma Nagaram(V), Choutuppal(M), Yadadri Bhuvanagiri(D)-508 252, Telangana State

**Mfg. Lic. No. :033/TS-IML/2017 Dt.04/11/2003**

**Reg.No.: CIR-22,132/95/Carbofuran (C.G)-255 (4.11.2003)**

Marketed by:

**AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD**

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222. Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
**"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,**
**Email : customercare@amishcropsciences.com**


**FOR AGRICULTURAL USE**

**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**

## ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3% ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ) ಪರಿಚಯಗಳು: ಇದು ಪೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪೊಂದಿದ ಅಂತರಾವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಾಗೂ ಸುರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಳಿಗೆಹರುಲುವ ಕಾಂದತೊರೆಯುವವುಳು, ದಸಿರ ಜಿಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಿಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆತ

ಶಿಫಾರಸು:

| ಬೆಳೆ | ಕೀಟಗಳು | ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮ ಗ್ರಾಂ | ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಸೆದು ವಾಯುಲೇ ನೀರಿನ ತನ (ಕೆ.ಜಿ) | ಸಿಂಪರಿಣೆ ಮತ್ತುಕೊಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ | (ಲ)ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸಜ್ಜ | ಕಾಂಡಕೊರಕ, | 1500 | 50 | - | - |
| ಬಾರ್ಲಿ | ಜಿಗಿ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಗಿಡಹೇನು | 1250 | 41.6 | - | - |
| | ಜಾಸಿಡ್ಸ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಮಕ್ಕೆಜೋಳ | ಕಾಯಕೊರಕ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ತ್ರಿಪ್ಸ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಬತ್ತ | ಕುದುಜಿಗಿಪುಳು | 750 | 25 | - | - |
| | ಗಾಲ್‌ಮಿಡ್ಡು | 750 | 25 | - | - |
| | ಹೇಸರು ಜಿಗಿ | 750 | 25 | - | - |
| | ಹಿಸ್ | 1500 | 50 | - | - |
| | ನೆಮಟೊಡ್ | 2000 | 66.6 | - | - |
| ಸೋರ್ಗಮ್ | ಶೂಟ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಸ್ಪೈಮ್‌ಬೋರರ್ | 250 | 8.33 | - | - |
| ಜೊಳ | ಕಾಂಡಕೊರೆ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಜೋಳ | ಫ್ಲಿಬೀಟಲ್ | 1500 | 50 | - | - |
| | ಯುವನೊಣ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಫೀ | ಆಫಿಡ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಶೀಂಗಾ | ಕಾಯೀಕೊರಕ | 1500 | 50 | - | - |
| ರೂಟ್‌ಗಂಟು | ನೆಮಟೋಡ್ | 2000 | 66.6 | - | - |
| ಕಬ್ಬು | ಟಾಪ್‌ಬೋರರ್ | 1000 | 33.3 | - | |
| ಭೌಂಡಿ | ಜಿಗಿ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಮಿರ್ಚಿ | ಆಫಿಡ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಥ್ರಿಪ್ಸ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಎಲೆಕೊಣ್ಣ ನೆಮಟೆಡ್ | 1500 | 50 | - | - |
| ಫ್ರೆಂಚ್‌ಬೀನ್ | ಮೈಟ್‌ಫ್ಲೈ | 700 | 23.3 | - | - |
| ಆಲೇಗಡ್ಡೆ | ಗಿಡಹೇನು | 500 | 16.6 | - | - |
| | ಜಿಗಿ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಟೊಮೆಟೂ | ಮೈಟ್‌ಫ್ಲ | 1200 | 40 | - | - |
| ಆಪಲ್ | ವೂಲ್ಲಿಆಫಿಡ್ | 5/ಮರ | 0.166/ಮರ | - | - |
| ಸಿಟ್ರಸ್ | ನೆಮಟೋಡ್ | 360 | 12 | - | - |
| | ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ | 1500 | 50 | - | - |
| ತಂಬಾಕು | ಕಾಂಡ ಕೋರೆಗಾರ | 1500 | 50.0 | - | - |
| | ನೆಮಟೋಡ್ | 4000 | 133.3 | - | - |

ಸ್ವಸರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣಗಳು:

ಈ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೈಬಾತಿಲ ರುಳು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ವರ್ಲ ಲಿಪ್ಪಿತೇಟರ್ ಮೂಲಕ ವಾಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗಿ ಚಲ್ಲಬೇಕು ಶೆಲಾರಣೆ:

1. ಕೀಟನಾಶವನ್ನು ಪೊಂದಿದ ಕಂಟೇನರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿರಣಬೇಕು ಅಥವ ತಿಂದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೊಂದಿದ ಕೊಣೆಯಿಂದ ದೂರ ವಿಡಬೇಕು.
2. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊರಡಿಯ ಬನ್ನಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತುತಂಟು ವಾಗೂ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಿಸಬೇಕು.

ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿನರ್ಜನೆ:

1. ಖಾಳಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಪೊಂದಿದ ಮೆಶನ್ನು ತೊಳಿಯುವಾಗು ಅಥವಾ ವಿನರ್ಜಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಜಲ ಕಲ್ಷಷನಾಗದಂತೆ ವಿನರ್ಜಸಬೇಕು.
2. ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ದಾಗಿಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶನ್? ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೂಳಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ವಿನರ್ಜಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾದಬಾರದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೊಡಕ್ಕೂಳಬೇಕು ಮರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
2. ಉಪಯೋಗಿ ಸುವವರು ರಕ್ಷಕಚಚವನ್ನು ಕರಿಸಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೈಗ್ಲೊಸ್ ಪಾನಕೊಡಿರಮೆಂಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಮಿತಗಳು:

1. ಬೀಸು ಮೀನು ಹಾದೂ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗು ಸಂದರ್ಬವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಸಬಾರದು.
2. ಕೊನೆಯಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತುಕೊಯ್ಲಿನ ನಡಿವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ವಾಯುಸಿಬೇಕು.

ವಿಷಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇಂದರೆ, ಕತೆನೊಯ, ತಲೆಸುತ್ತಿಬೆ, ಸುನ್ನುಳಿ, ರೊಚ್ಚಿನೋದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲುಸುರಿಸುವಿತಕೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಮಬ್ಬುಕವಿಯುವುದು, ವಾಂತಿ, ಬೇಡ ಮತ್ತು ಮಾಗು ನೊರುವಿಕೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು:

ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳಿಯ ಗಾಳಿ ವಾತವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು. ಬಿಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ್ನು ಬೆರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೀರು ನೊಪಸಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷದ:

ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೊಪಿನ್‌ನ್ನು ಕೊಂಡಬೇಕು ಇದನ್ನು 4 ಮಿ.ಗ್ರಾಳ. ಪ್ರತಿ 15 ಮಿಮಿಷಕ್ಕೂಮ್ಮಿಳ. ಗಂಟಿಗಟ್ಟಿಲೆ ಕೊರುತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 25-50 ಮಿ.ಗ್ರಾಳ. ಬೇಕಾಬದ್ರದು. ಜೊಲ್ಲಸುರಿಕಾವಿಕೆಯ ಗತಿಗನುಗಾರವಾಗಿ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ಸಂಯಾಗಿ ಕೊಟಬೆಲಗು.

**ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:**

| | |
|---|---|
| ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (75% ಭಾ/ಭಾ ಆಧಾರಿತ).... | 4.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾಟ್ | 5.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಕಾಲಿ ಗುಳಗೆಗಳು (ಬೆಂಟೋನೇಟ್) | 91.00% ಭಾಭಾ |
| ಒಟ್ಟು | 100.00% ಭಾ/ಭಾ |

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

## ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3% ಸಿಜಿ (ಪ್ರಾಣಿನಾಶಿನಿ)

ಇದ್ ಆಂತರಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವರ್ತನವು ಬಹುರೂಪ ಉಪಯೋಗವುರುವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಬಾ ಮಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿನಾಶಿನಿಯೂ ಪರಾಗಾಶಿಜಿನಾಶಿನಿಯೂ ಚಾಶಿನಾಶಿನಿಯುಮಾಗಿ. ಇದಿಲ್ 3% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಂ ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನುಂ ಬಾಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಕ್ತಮಾಯ ಚೇರು ವಕಳ್ಳುಮಾಗ್ ಅಡಣ್ಣುನತ್.

**ಶುಪಾರ್ಶಕಳ್**: (ಸಾಯಾರಣಯಾಯಿ ವಿತಯ್‌ಕ್ಕುನ್ನ ಸಮಯತ್ ಉಳವುಚಾಲುಕಳಿಲೆ ಮಣ್ಣಿಲಾಣ್ ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ಕುನ್ನತ್)

| ವಿಳ್ಳಕಳ್) | ಕೀಟತ್ತಿನ್ರೆ ಸಾಯಾರಣ ಪೇರ್ | ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ) | ರೂಪಿಕರಣಂ (ಕಿ(ಗ್ರಾಂ) | ವೆಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ನೇರ್‌ಪಿಕ್ಕಲ್ (ಲಿಗ್ರರ್) | ಅವಸಾನ ತಳಿಕ್ಕಲಿನ್ರು ವಿಳ್ವಿನ್ರು ಇಡಯಿಲ್ ಕಾತ್ತಿರುಣ್ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿವಸಂ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ತಿನ | ನಾಮಿಚ್ಚ | 1500 | 50 | - | - |
| ಬಾರ್‌ಲಿ | ಮುತ್ತಣ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಜಾಸಿಡ್ | 1250 | 41.6 | - | - |
| | ಸಿಸ್ಟ್ ನೊಟ್ರೋಡ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಚೋಳಂ | ತಣ್ಣು ತುಶಪನ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ನಾಮಿಚ್ಚ, ಇಲಸೇನ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ನೆಲ್ಲ್ | ತವಿತ್ತ್ ಚಿಚಿಚ್ಚಾಡಿ | 750 | 25 | - | - |
| | ಗಾಳ್ಳಿಚ್ಚ | 750 | 25 | - | - |
| | ಪಚ್ಚ ಇಲಚ್ಚಾಡಿ | 750 | 25 | - | - |
| | ತಣ್ಣು ತುಶಪನ್ | 750 | 25 | - | - |
| | ಕಾರವಣ್ | 1500 | 50 | - | - |
| | ನೊಟ್ರೋಡ್ | 2000 | 66.6 | - | - |
| ಅರಿಚ್ಚೋಳಂ | ನಾಮಿಚ್ಚ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ತಣ್ಣು ತುಶಪನ್ | 250 | 8.33 | - | - |
| ಚಣ | ನೊಟ್ರೋಡ್‌ಸ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ನಿಲಕ್ಕಡಲ | ತೊಟ್ಟು ತುಶಪನ್ | 1500 | 50 | - | - |
| | ವಳ್ಳತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಕಡುಕ್ | ಕಡುಕಿನ್ರೆ ಇಲಶಿನಿ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಪಂಚಾಣಿ | ಪಂಚಾಣಿ ನಾಮಿಚ್ಚ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಪಂಚಾಣಿ ಮುತ್ತಣ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ ವಿಳ್ಳಿಚ್ಚ | | 1500 | 50 | - | - |
| | ವೇಣ್ ನೊಟ್ರೆ ನೊಟ್ರೋಡ್ | 2000 | 66.6 | - | - |
| ಕಲಿಪ್ | ಮಣ ತುಶಪನ್ | 1000 | 33.3 | - | |
| ವಣ | ಜಾಸಿಡ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಮುಳಕ್ | ಮುತ್ತಣ | 1000 | 33.3 | - | - |
| | ಇಲಸೇನ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ಕಾಬೇಜ್ | ನೊಟ್ರೋಡ್ | 1500 | 50 | - | - |
| ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ ವಿಳ್ಳತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ | | 700 | 23.3 | - | - |
| ಉರುಳಕ್ಕಿಳಂಗ್ | ಇಲಸೇನ್ | 500 | 16.6 | - | - |
| | ಕಾಬೇಜ್ | 1000 | 33.3 | - | - |
| ತಕ್ಕಾಳಿ | ವಿಳ್ಳಿಚ್ಚ | 1200 | 40 | - | - |
| ಆಪಿಳ್ | ವೂಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಣ | 5/ಮರಂ | 0.166/ಮರಂ | - | - |
| ನಾರಕಂ | ನೊಟ್ರೋಡ್ | 360 | 12 | - | - |
| | ಇಲ ಮೀನಿ | 1500 | 50 | - | - |
| ಪುಕಯಿಲ | ತಣ್ಣು ತುಶಪನ್ | 1500 | 50.0 | - | - |
| | ನೊಟ್ರೋಡ್ | 4000 | 133.3 | - | - |

**ಪ್ರಯೋಗತ್ತಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕಪೆಟ್ಟುನ್ನ ಉಪಕರಣಂಗಳ್**: ಕೈ ಕೊಣ್ ಪ್ರವರ್ತ್ತಿಪಿಕ್ಕುನ್ನ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಆಪ್ಲಿಕ್ಕಿಂರ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಲೀಫ್ ವೋರರ್ ಆಪ್ಲಿಕ್ಕೇರ್ ಮೆಕ್ಕಾನಿಕ್ಕಲ್ ಡಿಸ್‌ಪೇರ್‌ಸರ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಹಾನ್‌ಡ್ ಬೆಯರಿಂಗ್ ರಬರ್ ಕಯ್ಯುಗಳ್.

**ವಿಷಬಾಧಯುಂಡಾಕುನ್ನ ಸ್ವಚಾಸಕಳುಂ ಲಕ್ಷಣಂಗಳುಂ**: ತಲವೇದನ, ಓಕಕಾನಂ, ತಲಚುಟ್ಟಲ್, ಚೆರ್‌ದ್ರಿ, ವಯರಿಳಕ್ಕಂ, ಉರವ ವೇದನ, ವಲ್ಲಾತ್ತೆ ವಿಯರ್‌ಕ್ಕುವ, ಸಙ್ಕುಚಿತಮಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಪಣಿಕಳ್, ಪೇಶಿಕಳುಡೆ ಏಕೋಪಣಿಲ್ಲಾಯ್ಮ, ಕೊಮಾ, ಮರಣಂ.

**ಪ್ರಥಮ ಶುಶ್ರೂಷಾ ನಡಪಡಿಕಳ್**: 1. ವಿಳ್ಳಂಙಿಯಾಲ್, ಅಣ್ಣಾಕ್ಕಿಲ್ ಇಕ್ಕಿಳಿಯಿಕ್ಕೆ ಚೆರ್‌ದ್ರಿಕ್ಕಾನ್ ಪ್ರೇರಿಪಿಕ್ಕುಕ. 2. ಮಲಿವಸಮಾಯ ವಸ್ತ್ರಙಳಿಲ್ ನೀಕ್ಕಂ ಚಯ್ಯುಕ, ಜಲಿಗಾಯ ಚರ್ಮವುಂ ವಸ್ತ್ರಙಳ್ಳುಂ ಸೋಪುಂಡುಂ ವೆಳ್ಳವುಂ ಉಪಯೋಗಿಚ್ಚು ಕಳ್ಳುಕುಕ. 3. ಕಣ್ಣುಕಳಿಲ್ ಪುರಣಾಂಶ, ಶುದ್ಧಜಲ ಉಪಯೋಗಿಚ್ಚ್ 15 ಮಿನಿಟ್ ನೇರ ಕಳ್ಳುಕುಕ.

**ಮರುನ್ನ್ ವಿಕಿಚ್ಚಾ**: ಗುರುತರಮಾಯ ಲಕ್ಷಣಙಳಿಲ್ ಪ್ರಕಾರಮಾಯಾಲ್, ರೋಗಿಕ್ಕ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ ಇಡವಿಟ್ ಅಥರ ಮಿಲಾಲ್ 2-4 ಮಿಗ್ರಾಮಿನ್ರೆ ಸಾಯಾರಣ ಡೋಸೇಜಿಲ್ ಅಟ್ರೋಪೈನ್ ನಲ್‌ಕಣಂ. 2 PAM ಅತ್ರ ಗುಣಕರಪ್ಪಲ್ಲಾತತ್ತಿನಾಲ್ ಅತ್ ಒಳಿವಾಕ್ಕಣಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಜಾಸಂ ನಲ್‌ಕಾವನ್ನಾತಾಣ್.

**ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಹಚರ್ಯಙಳ್**: 1. ಪ್ರಾಣಿನಾಶಿನಿಯುಡೆ ಅಳವಿನಿಯುಂ ಸ್ವಭಾವತ್ತೆಯುಂ ಆಶ್ರಯಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಣಿನಾಶಿನಿಕಳ್ ಅಸಙ್ಗುನ್ನ ಪಾಕ್ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ 2ಗ್ರ ವಸ್ತ್ರುಕ್ಕಲ್ ವಿಶೇಷಿಚ್ಚುಂ ಭಕ್ಷ್ಯವಸ್ತ್ರುಕ್ಕಲ್ ಸೂಕ್ಷಿಕ್ಕುನ್ನತಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕುನ್ನ ಮೂರಿಕಳಿಲ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಕಿಟ್ಟಿಕಣ್ಣಿಲ್ ನಿಣ್ಣ್ ಅಕಲೆಯಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರಿಕಳಿಲ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಕಿಟ್ಟಿಕಣ್ಣಿಲ್ ಅತಲ್ಲಕಿಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಅಲಮಾಯಿಲ್ ತಾಳಿತ್ತು ಪೂಡ್ರಿಯಾಯಿರಿಕ್ಕಣಂ ಸ್ಟೋರ್ ಚಯ್ಯುನ್ನತ್. 2. ಪ್ರಾಣಿನಾಶಿನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಚಯ್ಯುನ್ನತಿನ್ ಉದ್ದೇಶಿಕ್ಕುನ್ನ ಮೂರಿಕಳ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಕಿಟ್ಟಿಕಣ್ಣಿಲ್ ನೀರಾವಿಯುಮಾಯಿ ಚೇರ್‌ನ್ನ್ ದುಷಿಕ್ಕುನ್ನತ್ ಒಳಿವಾಕ್ಕಾನ್ ವೇಣಿ ಉಪಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಚ್ಚತುಂ ಕಾಲ್ರೋಸ್ತುಮುಳ್ಳತುಂ ನಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮುಳ್ಳತುಂ ವಾಯು ಸಞ್ಚಾರಮುಳ್ಳತುಂ ಪಕ್ಷಾಪ್ರಾಯಮಾಯ ನಿಲವುಂ ವೀತಿಯುಂ ಉಳವರುವುಳ್ಳತುಂ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣಂ.

**ಉಪಯೋಗಿಚ್ಚ ಕಣ್ಣಿಯ್‌ನರ್ ನಶಿಪಿಕ್ಕಣ್**: 1. ಪಾಕ್ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ ತಕರ್‌ತ್ತ್ ಆಶ್ಲಪ್ಪುಂಡ ಸ್ಥಲತ್ತು ನಿಣ್ಣ್ ಅಕಲೆಯಾಯಿ ಆಶ್ಯತ್ತಿಲ್ ಕುಶ್ಚಿಚ್ಚುವ್ವಣಂ. 2. ಉಪಯೋಗಿಚ್ಚ ಪಾಕ್ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ ವೀಣ್ಣುಂ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕೆಪೆಟ್ಟುನ್ನತು ತಡಯಾಂ ಅವ ಪುಗಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ಷಿಕ್ಕರುತ್. 3. ಪಾಕ್ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಮಿಚ್ಚ ಮುಣ್ಣ ಪಾದರ್ಥವುಂ ಒಸಿನಿಂ ಕಳ್ಳಕಿಯ ವೆಳ್ಳವುಂ ನಶಿಪಿಕ್ಕುನ್ನತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಜಲಮೋ ಮಲಿನೀಕರಿಕ್ಕಪೆಟಾತ್ತ ವಿಧತ್ತಿಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತಮಾಯಿಟ್ಟಾಯಿರಿಕ್ಕಣಂ.

**ಮೂನ್‌ಕರುತಲುಕಳ್**: 1. ಉಪಯೋಗಿಚ್ಚಾಯಿರ್ ಶ್ವಸಿಕ್ಕುನ್ನಾರುಂ ಚರ್ಮಸಮ್ಪರ್ಕ್ಕವುಂ ಒಳಿವಾಕ್ಕಣಂ. ಆವರಣಂ ಧರಿಕ್ಕಾತ್ತ ಕೈಕಳಿಲ್ ಕೊಣ್ ಮಿಶ್ರಣಂ ಚಯ್ಯರುತ್. 2. ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕುನ್ನಾಯಾಲ್ ಪೂರ್ಣ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ನಲ್‌ಕುನ್ನ ವಸ್ತ್ರಙಳಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕಣಂ ಅತಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಯ್ಯುಗಳ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಒನ್ನು ಕಿಲ್ ಮೇಸ್ ಹೆಲಿಲ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಓವರೋಲ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ರಬರ್ ಹೂಡ್ ಅಲ್ಲಕಿಲ್ ಹಾಟ್ ಉಲ್‌ಪೆಟ್ಟುನ್ನು.

**ರಾಸ ಘಟನ**:

| | |
|---|---|
| ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ ಟೆಕ್ (75% ಭಾ/ಭಾ ಸ.ಘ. ಯೆ ಅಡಿಸ್ಥಾನಮಾಕ್ಕಿ) | 4.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಕಾತ್ಯುಂ ಸಿಲಿಕ್ಕೇಟ್ | 5.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಬ್ಲಾಕ್ ತರಿಕಳ್ (ಬೆನ್ಟೋನೈಟ್) | 91.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಆಕೆ. | 100.00% ಭಾ/ಭಾ |

**ಜಾಗ್ರತಾ: "ಈ ಲೆಬಲಿಲ್/ಲಘ್ವಲೆಬಲಿಲ್ ಎಕ್ಕುತ್ತುಪಗಣ್ಣಿರಿಕ್ಕುನ್ನವ ಒಳಿಕ ಮರ್ ವಿಳಕಳಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕರುತ್."**

## கார்போஃபியுரான் 3% சி.ஜி.

(பூச்சிக்கொல்லி)

முன்னுரை:- இது ஒரு எல்லா வகையான் பூச்சிகளையும் கொல்லும் பூச்சிக் கொல்லியாகும். இது குறிப்பாக தண்டு துறைப்பானையும். வெட்டுக் கிளிகளையும் முடியந்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

| பயிர் | பூச்சிகளின் பெயர்கள் | மருந்தின் அளவு லப்-பொருள் (கிராம்) | ஒரு ஹெக் மருந்திற் அலவு | டேருக்கு நீர் (மி.லி.) | கால (நிரள்) அவகாசம் (லிட்டர்) |
|---|---|---|---|---|---|
| பற்ரா | சூட்பூச்சி | 1500 | 50.00 | - | - |
| பார்லி | கூஃபிட் | 1000 | 33.33 | - | - |
| | ஜெல்பிட் | 1250 | 41.65 | - | - |
| சோளம் | தண்டு துறைப்பான | 1000 | 33.33 | - | - |
| | சூட் பூச்சி | 1000 | 33.33 | - | - |
| | திரிப்ஸ் | 1000 | 33.33 | - | - |
| நெல் | பழப்பு மாபூச்சி | 750 | 25.00 | - | - |
| | கால் மிட்ஜ் | 750 | 25.00 | - | - |
| | வெட்டுக்கிளி | 750 | 25.00 | - | - |
| | இலை அருட்கு | 750 | 25.00 | - | - |
| | தண்டு துளைப்பான் | 750 | 25.00 | - | - |
| கேழ்பாகு | சூட்பூச்சி | 1000 | 33.33 | - | - |
| | தண்டு துளைப்பான் | 250 | 8.33 | - | - |
| | பிளே வண்டு | 1500 | 50.00 | - | - |
| பருத்தி | ஜெலிட் | 750 | 25.00 | - | - |
| | நெசவுப்பூச்சி | 1000 | 33.33 | - | - |
| ரலசுடவை | பாடு | 1500 | 50.00 | - | - |
| | சூட் பூச்சி | 1000 | 33.33 | - | - |
| | சூஃபிட் | 1000 | 33.33 | - | - |
| சோயா ஆக்ரெமைகிட் பூச்சி | | 1000 | 33.33 | - | - |
| | வெள்ளை பூச்சி | 1500 | 50.00 | - | - |
| வெண்டை | ஜெலிட் | 1000 | 33.33 | - | - |
| மிகைரய் | சூஃபிட் | 1000 | 33.33 | - | - |
| | திரிப்ஸ் | 1000 | 33.33 | - | - |
| உருளை | சாஃபிட் | 500 | 16.55 | - | - |
| | நெஸ்ட் | 1000 | 33.33 | - | - |
| ஸ்விட்பெப்ர் திரிப்ஸ் | | 500 | 16.55 | - | - |
| பூபீலை | பச்சபூழு | 1500 | 50.00 | - | - |
| | தண்டுதுளைப்பிளை | 1500 | 50.00 | - | - |

தாவா பாதுக்காப்ர கருவிகள்:

இந்த தயார் கலவையை கை மூலம் இயக்கும் இயந்திரம் அல்லது லிஃப் வார்ல் இயந்திரம் மூலம் தெறிக்கலாம்.

சோபித்து வைக்கும் மூறை:

1. இப்புச்சிக்கொல்லி முட்டைகளை தனியநைதளிலும் அல்லது அதைதளின் முன்பகுதிகளுலும் அல்லது தனி அடுத்தளிலும் சேமித்து வைக்கலாம்.
2. பாதுகக்கும் அதை நன்கு கட்டப்பிட்டு, சரப்புதும் இன்று, குறிராக, காந்நோட்டமாக மற்றும் தேவையான் இடத்தையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

கலன்களை அழிக்கும் முறை:

1. வபயேகப்படுத்திய மூட்டைகள் அல்லது கூபபோயப்படுத்திய நீர் மற்றும் உபயோகப்படுத்தய பொருட்கள் ஆகியவற்றை பாதுப்பனை முறைகளில் அழிக்கப்பட வேண்டும்.
2. பயோகப்படுத்திய மூட்டைகள் தனியாக வைப்பதின் மூலம் மறுமுறை உபயோகிப்பதை தவிரிக்கலாம்.
3. பயோகப்படுத்திய மூட்டைகளை உடைத்து. வாழ் இடம் இல்ணலனூக இடங்களில் புதைக்க வேண்டும்.

கவனிக்க வேண்டியவை:

1. வெறும் கைகளை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவும். சுவாத்தில் கலப்பதையும், தோலில் படுவதையும் தவிர்க்கவும்.
2. பாதுகாப்பு உடைகளான் தோலினால், ஆன் தையுநைகள், மூகமூடுகள் அணிகவும்.

அதிக செளிவுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகளை குறைந்த தண்ணீரில் கலப்பதை தவிர்க்கவும்.

பயன்பாட்டு வறை முறைகள்:

1. கால்நடைகள், பறவைகள் மற்றும் வலங்குகள் மடயும் இடங்களில் உபயோகிக்கதை தவிர்க்கும்.
2. அறுவடைக்கும் பூச்சிக்கொல்லி உபயோகிப்புக்கும் சிலநாட்கள் இறத்துமாறு பார்த்துக்கொள்ளவும்.

அறிகுறிகள்:

தலைவலி, நடுக்கம், தள்ர்ச்சி, வயிற்று வலி, அதிகப்படியான எச்சில் சுரல்லி, மங்கலான பார்வை, வாந்தி, வயிற்றும் போக்கு.

முதலுவலி:

உப்புக் கதைலைக்கொண்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யம். காற்றோட்டமான இடத்தில் படுத்தச் செய்யவும். மருந்து பட்ட இடத்ததை சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் போட்டு கழுவவும்.

சிகிச்சை:

உடன்டியாக அட்ரோபின் மருந்தினை 2 முதல் 4 எம்.ஜி. வாரை 15 நிமிட இடை வெளியில் 2 மணிநோங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அறிகுறிகள் நீடிப்பான் 25 முதல் 50 எம்.ஜி. வரை ஒரு நாளுக்கு பருந்தினை அறிக்க வேண்டும். உமிழிநீர் சரப்பு அளவினை பொருத்து கொடுக்கும் மருந்தினை கணிக்கவும்.

*சேர்மானம்:*

| | |
|---|---|
| *கார்போஃப்பூரான் டெக் (எ/எ ஏ.ஐ. மீது 75%)* | *4.00% எ/எ* |
| *கால்சியம் சிலிகேட்* | *5.00% எ/எ* |
| *ப்ளான்க் கிரான்யூல்ஸ் (பென்டோனைட்)* | *91.00% எ/எ* |
| *மொத்தம்* | *100.00% எ/எ* |

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

**Amish** CROPSCIENCES

# CARBOZEN

## Carbofuran 3% CG

## (Insecticide)

## కార్బోజెన్

## కార్బోఫ్యురాన్ 3% సిజి

## (కీటకనాశిని)

## कारबोजीन

## कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

## (कीटनाशक)

## ಕಾರ್ಬೋಜಿನ್

## ಕಾರ್ಬಾಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊರೈಡ್ 75% ಎಸ್‌ಜಿ

## (ಕೀಟನಾಶಕ)

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".**

# INSTRUCTIONS FOR USE

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN**

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగి సిగదంతే దూరవిడి.

విషము POISON RED

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్గా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :

**PRISTINE AGRO LIMITED**

Sy No 494,Koyalagudem Village, Devalamma Nagaram(V), Choutuppal