COMPLIMENT

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC (Fungicide)

Azoxystrobin 11%+Tebuconazole 18.3% w/w SC is a suspensible concentrate fungicide for control of fruit rot, Die back and powdery mildew in Chili; Downy mildew, Powdery mildew in Grape; Scab (Venturia inequalis), Powdery mildew (Podosphra leucotncha), Premature leaf fall (Marssonia coronaria) in Appple; purple blotch (alternaria porri) on Onion; Sheath blight on Rice; Yellow rust (puccinia striformis) in Wheat; early blight (alternaria solani); late blight (phytophora infestans) in Potato crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12%+ Tebuconazole 20% SC on w/v basis.

Caution : The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gms)	Formulation (ml)			
Grape	Downy mildew, Powdery mildew	82.5+ 137.25	750	500	10	-
Potato	Early blight (Alternaria solani) Late blight (Phytophora infestans)	82.5+ 137.25	750	500	-	-
Wheat	Yellow rust (Puccinia striformis)	82.5+ 137.25	750	500	-	-
Tomato	Early blight (Alternaria solani)	82.5+5 137.2	750	500	7	-
Rice	Sheath blight (Rhizoctonia solani)	82.5+ 137.25	750	800	-	-
Onion	Purple blotch (Alternaria porri)	82.5+ 137.25	750	800	7	-
Chilli	Fruit rot, Powdery mildew, Dieback	72+120	600	500-750	5	-
Apple	Scab (Venturia inequalis), Powdery mildew (Podosphra leucotncha), Premature leaf fall (Marssonia coronaria)	0.11+ 0.183/L	1.0/L of water	8-12 L/tree	10	-

Direction of Use : Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form final spray solution.

Time of application : To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather conditions and disease pressure.

Precautions: 1. During spraying wear suitable respiratory equipment. 2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots. 3. Wear suitable gloves. 4. Wear chemical goggles or face shield.

Symptoms of Poisoning : Irritating to eyes. May cause sensitization by skin contact.

First Aid : 1. Inhalation: remove victim to fresh air. Keep victim warm and at rest. If breathing is difficult, give oxygen obtain medical attention. 2. Ingestion: do not induce vomiting, wash out mouth with plenty of water. Rinse mouth before giving glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If breathing is difficult, give oxygen get medical attention. 3. Skin contact: remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints. 4. Eye contact: Wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist.

Phytotoxicity : Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportively therapy.

Disposal of used container: 1. Empty containers should not be re-used. 2. Destroy the empty container after use and bury them ½ meter deep in soil away from habitation. 3. Surplus spray material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : 1. Do not store consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 2. Store the fungicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the rooms used for storing foodstuffs, animal feeds and other articles, under lock and key. 3. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 4. Transport the fungicide in such a manner so as not to come in contact with foodstuffs and animal feed.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i	11.00% w/w
Tebuconazole a.i	18.30% w/w
Magnesium Aluminium Silicate	0.92% w/w
Polyalkoxylated butyl ether	1.83% w/w
Methyl methacrylate graft copolymer	2.75% w/w
Sodium alkylnaphthalene sulfonate formaldehyde condensate	0.92% w/w
Dimethylpolysiloxane	0.37% w/w
1,2 Benzisothiazoline-3-one	0.09%w/w
Propylene glycol	7.3% w/w
Heteropolysaccharide 2% solution	0.028% w/w
Water	Q.S.%
Total	100% w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet

कामप्लिमेंट

एज़ॉक्सिस्ट्रॉबिन ११ % + टेबुकोनाजोल १८.३% व/व एस.सी.

(फफूंदीनाशक)

एज़ॉक्सिस्ट्रॉबिन ११ % + टेबुकोनाजोल १८.३% व/व एस.सी. मिर्च की फसल में फल गलन, डाई बैक और भस्मी फफूंद, अंगूर में चूर्णी फफूंदी , मृदूरोमिल फफूंदी, सेब में पामा (बेटूरिया इनए कालिस), चूर्णी फफूंदी (पोडोस्पोरा लुकोट्रिचा), समय पूर्व गिरावट (मारसोनीअ करोनारिज), प्याज में बैंगनी मुहासा व धान में पर्णछेद अंगमारी, रेंङू में पीला रतुआ, टमाटर में अदेती अंगमारी, आलू में अदेती अंगमारी और पछेती अंगमारी रोकथाम हेतु असरदार निलंबित होने वाला सांद्र फफूंदनाशक है । यह फार्मूलेशन वजन/आयतन आधार पर एज़ॉक्सिस्ट्रॉबिन १२ % + टेबुकोनाजोल २०% एस.सी.के समतुल्य है।

सावधान : मछली और जलीय जंतीओं के लिए विषाक्त है अत : मत्स्य पालन एवम जल जीवन के पास इस्तेमाल निषेध है ।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा			पानी की मात्रा (ली)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन:प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (ली.)				
अंगूर	चुर्णी फफूंदी, मृदुरोमिल फफूंदी	८२.५+१३७.२५	७५०		५००	१०	-
आलू	अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०		५००	-	-
गेहूं	पीला रतुआ	८२.५+१३७.२५	७५०		५००	-	-
टमाटर	अगेती अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०		५००	७	-
धान	पर्णछेद अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०		८००	-	-
प्याज	बैंगनी मुहासा	८२.५+१३७.२५	७५०		८००	७	-
मिर्च	फल गलन,भस्मी फफूदी डाई बैक	७२+१२०	६००		५००-७५०	५	-
सेब	पामा (बेटूरिया इनए कालिस), चुर्णी फफूंदी (पोडोस्पोरा लुकोट्रिचा), समय पूर्व गिरावट (मारसोनीअ करोनारिज)	०.११ +०.१८३ लीटर		१.०/लीटर पानी में	८-१२ लाटर लीटर/पेड़	१०	-

उपयोग के लिये निर्देश: फ़फ़ूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोलकर अंतिम छिड़काव घोल बना लें।

प्रयोग का समयः बचावकारी रूप में इस्तेमाल किया जाा चाहिए तथा दबाव के अनुसार मौजूदा मौसम दशाओ तथा रोग के १५ दिनों पर दोहराया जाना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँः १. छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहने। २. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें। ३. उपयुक्त दस्ताने पहनें। ४. रासायनिक चश्मे या चेहरा कवच पहनें।

विष के लक्षण : आँखों में जलन । त्वचा से सम्पर्क होने से संवेदीकरण का कारण हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्साः १. अगर साँस द्वारा शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर साँस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। ड़ॉक्टर को बुलाएं। २. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें। पानी से मुँह धो लें। पानी पिलाने से पहले मुँह को अच्छे से कुल्ला करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुँह से कुछ न दें। अगर साँस लेने में कुछ असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलायें। ३. अगर फफूंदनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रभावित कपड़े निकाले और त्वचा को भरपूर पानी से और साबुन से धोएं। शिकायत की घटना में चिकित्सक से परामर्श करें। ४. आँखों में सम्पर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बना रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविशाक्तताः सुझायी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौध विषाक्त नही।

विष नाशक : कोई विशिष्ट औषधोपचार नही हैं। लक्षण के अपचार करें तथा सम्पर्क उपचार दें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों को फिर से इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए । २. इस्तेमाल के बाद खाली डिब्बे को नष्ट करते रिहायशी स्थान से दूर जमीन १/२ मीटर की गहराई में गाड़ दें। ३. बची हुई छिड़काव सामग्री या मशीनों तथा डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तेः १. इस सामग्री से प्रदूषत हुए स्थान पर खाध, पेय पदार्थ या तम्बाकू का सेवन या उपभोग न करें । २. फफूंदनाशक का भंडारण उसके मूल डिब्बे में करें तथा इसे कस कर बंद करके बच्चों, गैर जिम्मेदार व्यक्तियों तथा पशुओं की पहुँच से दूर किसी अलग कमरे में ताला बंद करके करें जो कि खाध-पदार्थ, पशु आहारो तथा अन्य चीजो के भंडारण हेतु इस्तेमाल होने वाले कमरों से दूर हो । जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करण हो वह सूखा, अच्छी तरह निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि उनकी वाष्प से कोई प्रदूषण न हो । ३. फफूंदनाशक के डिब्बों को खाध पदार्थ तथा पशु आहार के सम्पर्क में न आएं।

रासायनिक संरचनाः

एज़ॉक्सिस्ट्रॉबिन स.त	११.००% भार/भार
टेबुकोनाजोल टेक्निकल (स.त.)	१८.३०% भार/भार
मैग्नेशियम अल्युमीनियम सिलिकेट	०.९२% भार/भार
पोलीएल्कॉक्सीलेटेड ब्युटाइल इथर	१.८३% भार/भार
मिथाइल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपॉलिमर	२.७५% भार/भार
सोडियम एल्किल नेफ्थालीन सल्फोनेट फॉमएल्डिहाइड कंडेनसेट	०.९२% भार/भार
डायमिथाइल पोलीसिलोक्सन	०.३७% भार/भार
१,२ बेन्झआयसोथिझोलिन-३ वन	०.०९% भार/भार
प्रोपीलीन ग्लयकॉल	७.३% भार/भार
हेट्रोपॉलीसैक्केराइड २% सॉल्यूशन	०.०२८% भार/भार
पानी	बनाने के लिए पर्याप्त परिमाण %
कुल	१०० % भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

कॉम्प्लिमेंट

अजोक्सिस्ट्रोबिन् 11%+

टेबुकोनजोल् 18.3% भा/भा एस्सि (शिलींध्रनाशिनि)

मिरप पैरुलను ఆశించు కాయకుళ్ళు, డై బ్యాక్ మరియు బూడిద తెగులు, ద్రాక్షలో వచ్చు బూజు తెగులు, బూడిద తెగులు, యాపిల్ తోటలను ఆశించు స్కాబ్ మచ్చు, బూడిద తెగులు, పక్వానికి రాకముందే ఆకురాలడం, ఉల్లిపాయపై ఊదారంగుమచ్చు, పరిపై పొడ తెగులు, గోధుమలలో పసుపుతుప్పు, బంగాళాదుంప పంటలో ముందుగావచ్చు ఎండుతెగులు, ఆల్యంగా వచ్చే ఎండుతెగులు వంటి వాటిని నియంత్రించు శిలీంధ్ర సంహారిణి. ఈ సూత్రీకరణ అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 12% + టెబుకోనజోల్ 20% ఎస్సి భా/పనకు సమానము.

హెచ్చరిక : ఈ మిశ్రమ ఉత్పాదన చేపలు మరియు జలచరములకు విషకారి. కావున జలచరాల సేద్యం వద్ద దీనిని ఉపయోగించరాదు.

सिफारस

पैरुलु	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు/హె.		నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పున:ప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
		స.ప. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మిలీ)			
ద్రాక్ష	బూజు తెగులు బూడిద తెగులు	82.5+ 137.25	750	500	10	-
బంగాళ దుంప	ముందుగా ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండుతెగులు	82.5+ 137.25	750	800	-	-
గోధుమ	పసుపురంగు తుప్పు	82.5+ 137.25	750	800	-	-
టమాట	ముందుగా వచ్చే ఎండు తెగులు	82.5+ 137.25	750	800	7	-
వరి	పాయుపొడతెగులు	82.5+ 137.25	750	800	-	-
ఉల్లి	ఊదామచ్చు	82.5+ 137.25	750	800	7	-
మిరప	కాయకుళ్ళు, బూడిదతెగులు డైబ్యాక్	72+120	600	500-750	5	-
ఆపిల్	స్కాబ్ మచ్చు బూడిద తెగులు ఆకు రాలడం	0.11+ 0.183/లీ	1.0/లీ నీరు	8-12 లీ/ చెట్టుకి	10	-

ఉపయోగించుటకు సూచన : కావలసినంత పరిమాణంలో శిలీంద్రనాశినిని కొంచెం నీటిలో కలిపి కర్రతో బాగా కలపండి. తర్వాత మిగతా నీటిని కూడా కలిపి బాగా కలియత్రిప్పి, పిచికారీ ద్రావణం సిద్ధం చేసుకోవలెను.

ఉపయోగించు సమయం : 15 రోజుల విరామంతో నివారణ చర్యగా వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు తెగులు ఉధృతిని బట్టి మరల పిచికారీ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ముందుజాగ్రత్తలు : 1. పిచికారీ చేయునపుడు తగిన శ్వాస పరికరాలను ధరించండి. 2. పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులను, రసాయన నిరోధక బూట్లు ధరించండి. 3. తగిన చేతితొడుగులను ధరించండి. 4. తగిన రసాయన నిరోధక కళ్లద్దాలను, ముఖకవచమును ధరించండి.

విష లక్షణాలు : కళ్ళకు దురదలు, చర్మంపై చికాకు వంటివి సంభవించును.

ప్రథమచికిత్స : పీల్చినచో : ప్రభావిత వ్యక్తిని తాజాగాలి లోనికి తరలించండి. రోగి శరీరం చెచ్చగా మరియు విశ్రాంతిగా ఉంచండి. శ్వాసలో ఇబ్బందిగా ఉన్నట్లయితే కృత్రిమ శ్వాసను అందించి, వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి మింగినచో: వాంతులు చేయించరాదు. నోటిని ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపరిచి, ఒక గ్లాసు నీటిని త్రాగించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. శ్వాసలో ఇబ్బందిగా ఉన్నట్లయితే కృత్రిమ శ్వాసను అందించి, వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మమునకు అంటినచో: కలుషిత దుస్తులను తొలగించి మరియు కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రపరచవలెను. ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 4. కళ్ళు కలుషితమైనచో: పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచండి. నొప్పిగా ఉన్నచో కళ్ళ వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషత్వం : సిఫార్సుల ప్రకారం ఉపయోగించినచో పంటలపై ఎలాంటి హానికరం కాదు.

విరుగుడు : నిర్దిష్టమైన విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలనుబట్టి సహాయక చికిత్స జరిపించాలి.

వాడిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటపడువపడ్డు. 2. కంటైనర్లను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా 1/2 మీటరు లోతులో పాతిపెట్టాలి. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీరు వాడిన కంటైనర్లను పర్యావరణము మరియు నీటి కాలుష్యము కానీయని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించవలెను.

నిల్వ షరతులు : 1. శిలీంధ్రనాశినులను ఆహార పదార్థాలకు, త్రాగే నీటికి లేదా పాగాకు ఉత్పత్తి వంటిని ఉన్నచోట నిల్వచేయరాదు. 2. దీనిని నిల్వచేయు గదులు బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా పొడిగా, చల్లగా, సరియగు కొలతలతో బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి. 3. శిలీంధ్ర నాశినులను పిల్లలకు, బాధ్యతారహిత వ్యక్తులకు మరియు పశువులకు దూరంగా, ఆహార పదార్థాలకు, పశువుల గ్రాసాలకు మరియు మిగతా వస్తువులకు దూరంగా వాటి ఒరిజినల్ ప్యాకెట్లలో ప్రత్యేక గదులలో తాళం వేసి నిల్వచేయవలెను. గాలి వెలుతురు వచ్చేలా మందు ఆవిరిని నిరోధించేలా సరైన కొలతలతో నిర్మించబడి ఉండాలి. 4. శిలీంధ్రనాశినులను రవాణా చేయునప్పుడు ఆహారపదార్థాలు, మరియు పశుగ్రాసాలకు హానికలగనియరాదు.

రసాయన మిశ్రమం:

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ స.ప.	11.00% భా/భా
టెబుకొనాజోల్ స.ప.	18.30% భా/భా
మెగ్నీషియమ్ అల్యూమినియమ్ సిలికేట్	0.92% భా/భా
పాలీఆల్కాక్సీలేటెడ్ బ్యుటిల్ ఈథర్	1.83% భా/భా
మిథైల్ మెథాక్రిలేట్ గ్రాఫ్ట్ కొపాలిమర్	2.75% భా/భా
సోడియమ్ ఆల్కలీనాప్థలీన్ ఫార్మల్డిహైడ్ కండెన్సేట్	0.92% భా/భా
డైమిథైల్‌పాలిసైలాక్సేన్	0.37% భా/భా
1,2-బెంజిసొథియజోలైన్-3-వన్	0.09% భా/భా
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	7.3% భా/భా
హెటరోపాలీశాకరైడ్	0.028% భా/భా
నీరు	క్యూ.ఎస్.%
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక : లేబుల్/కరపత్రంలో సూచింపబడిన పైర్లపై తప్ప. ఇతర పంటపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

COMPLIMENT

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC

(Fungicide)

कॉम्प्लिमेंट

अजोक्सिस्ट्रोबिन्11%+टेबुकोनजोल्18.3% भा/भा एस्सि

(शिलींध्रनाशिनि)

कामप्लिमेंट

एजोक्सीस्ट्राबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% व/व एस सी

(फफूंदीनाशक)

ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 11% + ಟೆಬುಕೋನಜೋಲ್ 18.3% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್.ಸಿ.

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उड्डमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,**
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Regd.No.: CIR-169540/2020-Azoxystrobin+Tebuconazole (SC) (414)-786

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

कामप्लिमेंट

ॲझोक्सीट्रॉबीन ११% + टेब्यूकोनाजोल १८.३% व/व एससी

(बुरशीनाशक)

अझॉक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेंबुकोनाझोल 18.3% व/व एससी हे मिरची मधील फळ कुजणे, परत मरणे आणि पावडर बुरशी नियंत्रणासाठी एक सस्पेन्सिबल कॉन्सन्ट्रेट बुरशीनाशक आहेय डाऊनी बुरशी, द्राक्षात पावडरी बुरशीय ऍपल मध्ये स्कॅब (व्हेंचुरिया इनिक्वेलिस), पावडरी बुरशी (पॉडोस्फ्रा ल्यूकोट्रचा), अकाली पाने पडणे (मार्सोनिया कोरोनरिया)य कांद्यावर जांभळा डाग (अल्टरनेरिया पोरी)य तांदळावर म्यानचा तुटवडाय गव्हातील पिवळा गंज (प्युसिनिया स्ट्रायफॉर्मिस)य लवकर अनिष्ट (अल्टरनेरिया सोलानी)य लवकर अनिष्ट (अल्टरनेरिया सोलानी), बटाटा पिकामध्ये उशीरा येणारा प्रकोप (फायटोफोरा इन्फेस्टन्स), हे फॉर्म्युलेशन व/व आधारावर अझॉक्सीस्ट्रोबिन 12% टेंबुकोनाझोल 20% एससी च्या समतुल्य आहे.

खबरदारी : एकत्रित उत्पादन हे मासे आणि जलचरांसाठी विषारी आहे, म्हणून ते जलचरांच्या जवळ वापरले जाऊ नये.

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर सघ (ग्राम्स)	मिश्रण (मिली)	पाण्यात सौम्यीकरण लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवस)
द्राक्ष	डाउनी बुरशी, पावडर बुरशी	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	१०
आलू	अदेती अंगमारी और पछेती अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	-
गेहूं	पीला रतुआ	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	-
टमाटर	अदेती अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	७
धान	पर्णछंद अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	-
प्याज	बैंगनी मुहासा	८२.५+१३७.२५	७५०	८००	७
मिरची	फळ सडणे पावडरी मेल्ड्यू,डाय बॅक	७२+१२०	६००	५००-७००	५
ऍपल	स्कॅब पावडर बुरशी अकाली पाने पडणे	0.11 0.183/ली	1.0/ली एवं पाणी	8–12	ली /झाड

वापरण्यासाठी सूचना: मोजलेल्या प्रमाणातील बुरशीनाशक घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात टाका. काठी केवी रॉजने चांगले ढवळा आणि नंतर राहिलेले पाणी टाका आणि शेवटचे फवारणीचे द्रावण होण्यसाठी चांगले ढवळा.

वापर करण्याची वेळ: प्रतिबंध करण्यासाठी वापरण्यात यावे आणि त्या वेळच्या हवामानाच्या स्थितीवर आणि रोगाच्या दबावावर अव्लंबून १५ दिवसांच्या अंतराने पुनहा वावरावे.

सावधगिरी: १. फवारणी करताना सोयीस्कर श्वसनसहाय्यक उपकरण घाला. २. सोयीस्कर संरक्षक कपडे आणि रसायन रोधक बूट घाला. ३. सोयीस्कर ग्लोवज् घाला. ४. रसायन रोधक गॉगल्स किंवा फेस शिल्ड घाला.

विषबाधेची लक्षणे: डोळे चुरचुरणे, त्वचेशी संपर्क आल्यास संवेदनशीलता होऊ शकते.

प्रथमोपचार: १. श्वासगतून आत जाणे: रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा. रुग्णाला उबदार आणि आरामात ठेवा. श्वास घेणे कठिण जात असेल तल, प्राणवायू द्या, वैद्यकीय मदत मिळवा.२. पोटात जाणे: उलटीला उद्युक्त करु नका. भरपूर पाण्याने तोंड धुवून काढा. एक्ग लास पाणी देण्यापूर्वी तोंड खळखळून धुवा. एकादा बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. ३. त्वचेशी संपर्क: दूषीत कप डे काढा आणि उद्दाडा पडलेला त्वचेचा भाग पाणी आणि साबणाने धुवा आणि नंतर कोमट पाण्याने खळखळून धुवा. कोणत्याही तकारीच्या बाबतीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ४. डोळ्यांशी संपर्क: वेदन चालू राहिल्या तर भरपूर पाण्याने धुवा, डोळ्यांच्या विशेत्रज्ञाचा सल्ला घ्या.

वनस्पतीजन्य विषबाधा: शिफारस केल्याप्रमाणे वापरले असता वनस्पतीजन्य विषबाधा नाही.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा आणि सहाय्यक औषधोपचार करा.

वापरलेल्या कंटनेर्सची विल्हेवाट: १. रिकाने कंटेनर्स पुन्हा वापरु नयेत. २. रिकामे कंटेनर्स नष्ट करा आणि ते वसाहतीपासून दूर मातीत १/२ मीटर खोल पुरा. ३. अधिकांश सामग्री किंवा मशिन आणि कंटेनर्समधील चिंच्यांची पर्यावरणाच्या आणि पाण्याचाच्या प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावा.

साठवण्याच्या अटी: १. अन्न, पेटे किंवा तंबाखू जिथे ते सामग्रीने दूषीत होतील अशा ठिकाणी साठवू नका किंवा खाऊ नका. २. बुरशीनाशके त्यांच्या मूळ पॅकमध्ये घट्ट बंद करुन, मुलांच्या, वेजबाबदार व्यक्ती आणि पशुधनापासून दूर, अन्नपदार्थ, पशुखाद्या किंवा इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरली जाणारी खोली किंवा जागेपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत, कुलुप आणि किल्लीकाली साठवाव्यात. ३. साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या बांधकामाच्या, भरपूर प्रकाशाच्या, कोरड्या, थंड आणि वाफेने दूषीतीकरण टालण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात. ४. बुरशीनाशकाची वाहतूक ते अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्याच्या संपर्कात येणार नाही अशा पद्धतीने करा.

रासायनिक रचना:

ॲझॉक्सीट्रॉबीन स.घ.	११.००% व/व
टेब्यूकोनाझोल स.घ.	१८.३०% व/व
मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट	०.९२% व/व
पॉलीअल्कोक्सीलेड बुटाइल इथर	१.८३% व/व
मेथाइल मेथाक्रायलेट ग्राफ्ट कोपॉलीमर	२.७५% व/व
सोडियम अल्काइल नॅप्थालीन सल्फोनेट फॉर्मलडिहाइड कन्डेन्सेट	०.१६% व/व
डायमीथाइलपॉलीसिलोक्सेन	०.३७% व/व
१,२ बांझीसोथियाढोलीन+३-वन	१०.०९% व/व
प्रॉपीलीन ग्लायकोल	७.३% व/व
हेटेरोपॉवलीसॅकराइड २सोल्यूशन	०.०२८% व/व
पाणी	पुरेशा प्रमाणात% व/व
एकूण	१००% व/व

इशारा: ''या लेबलवर/माहितीपत्रकात दिलेल्या व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरण्यासाठी नाही''

काम्प्लिमेंट्

अझोक्स्ट्रोबिन् 11% + टेबुकोनझोल् 18.3% ह्रा/ह्रा एस् सि

(शिलेन्द्रनाशक)

अझोक्स्ट्रोबिन् 11% + टेबुकोनझोल् 18.3% ह्रा/ह्रा एस् सि एन्बह्र मिलकायिल् उळ्ळ पळङ्कळ् अऴुकल्, इऱक्कम् मऱ्ऱुम् नुण्णह्कळ् पऴुच्ञ कालान् आकियवऱ्ऱाक्कि कट्टुप्पट्टह्म् ऒरु सस्पॆन्सिपिळ् सऱिपॆऱ्ऱट्टप्पट्ट पऴुच्ञकळ् कॊल्लियाकम्ह: पऴुच्ञ कालान्, तिरान्टसमियिल् नुण्णह्कळ् पऴुच्ञ कालान्; आप्पिळिल् ऎक्पे (वण्टॆऩ्ऱ्ऱ्ऱ इऩ्ऩिक्कॆल्ऎसॆ), नुण्णह्कळ् पऴुच्ञ कालान् (पॆटॊस्फ्रा लऊकॊय्ञ्ञ्), मान्कॊट्टिय इलै वॆழ्ச्சி (ऱ्ऱ्ऱ्