Thiamethoxam 30% FS

(Systemic Insecticide)

Thiamethoxam 30% FS is broad spectrum systemic insecticide that is well suited for seed treatment used to control early season sucking pests, Recommended as seed treatment to control Jassids, aphids and Whitefly in cotton, shoot fly on sorghum and Maize termites in wheat, jassid in okra, Thrips. GLH and Whorl Maggot in rice, jassid and thrips in sunflower, stem fly in soyabean and thrips in chilli crop. Due to its fast action on sucking pest. It limits the transmission of leaf curl virus.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / HA AI (gm per kg seed)	Dosage / HA Formulation (ml per kg seed)	Dilution in Water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Thrips	2.1	7.0			
Cotton	Jassids, Aphids White flies	3	10		This is used as seed dresser	
Maize	Shoot Fly	2.4	8.0			
Okra	Jassid	1.7	5.7			
Rice	Thrips, GLH, Whorl Maggot	0.9	3.0			
Sorghum	Shoot Fly	3.0	10.0			
Soybean	Stem fly	3.0	10.0			
Sunflower	Jassid, Thrips	3.0	10.0			
Wheat	Termites	1.0	3.3			

Direction of Use: For small lots, mix the required quantity of Thiamethoxam 30% FS with 10-20 ml of water for each kg of seed to be treated. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (Plastic drum) until the seeds are uniformly covered (usually jests than a minute)

It is recommended for application as slurry with continuously operation commercials seed equipment. For preparation of slurry proceed as follows.

1. Put ½ of the required water top the mix tank. 2. Add the required quantity of Thiamethoxam 30% FS while stirring continuously. 3. Allow the product to disperse. 4. Switch the agitation system of stir manually. 5. Top up with the remaining volume of water. 6. Maintain agitation of the slurry during the whole time of use. 7. The slurry has to be used within 24 hours after preparation.

Application Procedure: 1. Prepare this slurry as descried. 2. Fill the seed into the receptacle. 3. Start mixing the seed. 4. Apply the required amount of slurry by pouring onto the mixing seed. 5. Mix for about 30 seconds to one minutes to achieve a homogenous treatment . An extended mixing will lead to abrasion and dust forming

Time of Application : -

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots, while mixing. Do not eat, drink or smoke while handing or smoke while handling of applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement toxic convulsion and ptosis.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventiated area or fresh air and protect him from undercooling in CASE OF SKIN CONTACT. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water INCASE OF EYE CONTACT. Rinse eyes with clean water for several minutes IN CASE OF INGESTION . Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious perso do not induce vomiting.

Phytotoxicity : No phytotoxic, if applied as per recommendation.

Antidote: No Specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container: 1. Packages of surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The Packages containing the insecticides should be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premised used for storing other articles particularly articles of food or shall except in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for restoring the insecticides shall be well built. dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Thiamethoxam a.i	30.00 % w/w
Copolymer of butanol	4.30 % w/w
Glycerine	5.10 % w/w
1,2-Benzisothrazole 3 one	0.20 % w/w
Monazo dye (Irgalith Red C 2 B)	3.40 % w/w
Polyethylene glycol	2.60 % w/w
Water	Q.S. % w/w
Total	100%w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet"

థయామెథాక్సమ్ 30% యఫ్.ఎస్.

(అంతర్వాహికవర్యగల కీటకనాశిని)

థయామెథాక్సమ్ 30% ఎఫ్ ఎస్ అనునది విస్తృతచర్యగల అంతర్వాహిక కీటకనాశిని. విత్తనశుద్ధితో బాటుగా ప్రత్తి పైరును ఆశించు పచ్చదోమ, పేనుబంకలను, జొన్న, మొక్కజొన్నలను ఆశించు కాండంతొల్చు పురుగులు, గోధుమలోని చెదపురుగులు, బెండను ఆశించు పచ్చదోమలు వరి పైరును ఆశించు ముడత, మిడతలు మరియు రెల్లరాల్చు పురుగులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు పైరును ఆశించు ఆకుముడత, పచ్చదోమలను సమర్థవంతంగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను. రసంపీల్చు పురుగులపై సత్వర చర్యవలన వైరస్ తెగులును వ్యాప్తి చెందనీయదు.

సిఫారసులు :

పైరు	కీటకము మొక్క సాధారణ నామము	స.వ. (గ్రా/కేజి విత్తనం)	మోతాదు / హె. సూత్రీకరణ (మి.లీ/ కేజి విత్తనం)	నీటి పరిమాణము (లీ.)	చివరి పిచికారి నుండి కోతవరకు చేయుండుసమయం (రోజులలో)	మరల ప్రవేశం (గంటలు)
మిరప	తామరపురుగులు	2.1	7.0			
ప్రత్తి	పచ్చదోమ,పేనుబంక తెల్లదోమ	3	10		విత్తనశుద్ధికి	
మొక్కజొన్న	కాండంతొల్చు	2.4	8.0			
బెండ	పచ్చదోమ	1.7	5.70			
వరి	తామరపురుగు, మిడతలు తెల్లరాల్చుపురుగు	0.9	3.0			
జొన్న	కాండం ఈగ	3.0	10.0			
సోయాబిన్	కాండంతొల్చుపురుగు	3.0	10.00			
గోధుమ	చెదపురుగులు	1.0	3.3			
ప్రొద్దుపురుగు	పచ్చదోమ ఆకుముడత	3.0	10.0			

ఉపయోగించుటకు సూచనలు :

విత్తనశుద్ధికి : కొద్ది పరిమాణంగల విత్తనములకు థయామెథాక్సమ్ 30% ఎఫ్ ఎస్ కి.గ్రా.విత్తనమునకు 10-20 మిలీ నీటిలో కలిపి ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ లేదా బ్యాగులో విత్తనములకు పూర్తిగా సమానంగా కలిసేలా నిమిషం పాటు త్రిప్పవలెను. ఎక్కువ పరిమాణంగల విత్తనముల శుద్ధికి క్రింది పద్ధతి.

పాటించవలసిన పద్ధతి : 1. అనవసరమైన నీటి పరిమాణంలో సగం విత్తనములు కలుపు ట్యాంకులో నింపవలెను. 2. తగు పరిమాణంలో థయామెథాక్సమ్ 30% ఎఫ్ఎస్ను కలపండి. 3. బాగా వ్యాపించేలా చూడవలెను. 4. కర్రతో బాగా కలియతిప్పవలెను. 5. తరువాత మిగిలిన నీటిని కలపండి. 6. సమానంగా కలిసేట్లుగా చూడవలెను. 7. శుద్ధి చేసిన విత్తనాలను 24 గంటలలో విత్తవలెను.

ఉపయోగించు సమయం : -

ముందు జాగ్రత్తలు : మందు కలపటానికి వంట పాత్రలను వాడరాదు. మందు కలపటానికి కర్రను వాడాలి. చర్మము, కళ్ళు మరియు దుస్తులకు అంటనీయరాదు. మందు పిచికారి చేసేటపుడు మందును పీల్చరాదు. చేతి తొడుగులను ధరించాలి. ద్రావణమును కలుపునపుడు సురక్షిత దుస్తులు, ముఖ కవచం, కళ్ళజోడు మరియు బూట్లు ధరించాలి. ఉపయోగించునపుడు లేదా పిచికారి చేయనపుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. పని పూర్తయిన తరువాత చేతులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకొని, దుస్తులు మార్చుకోవాలి. కలుషిత దుస్తులను కూడా శుభ్రపరచుకోవాలి.

విషతుల్యత : సిఫార్సుల ప్రకారం ఉపయోగించిన యెడల ఎలాంటి హానికరం కాదు.

విరుగుడు : రోగి లక్షణముల బట్టి చికిత్స చేయండి. దీనికి ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమిలేదు.

ప్రథమ చికిత్స : కలుషితదుస్తులు తీసివేసి రోగిని బాగా గాలి తగిలే అరుబయట తరలించండి. మందు కళ్ళలో పడినచే నీటితో ధారగాకడగండి. రోగి స్పృహలో లేనప్పుడు నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు మరియు వాంతులుచేయించరాదు.

విష లక్షణములు : శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది మరియు కండరాల వణుకు, బిగుసుకొనుట, రోగి కదలలేకపోవుట వంటివి కనబడతాయి.

ఖాళీ డబ్బాల విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగుల పదార్థాలు మరియు యంత్రాలను శుభ్రపరిచిన నీటిని వాతావరణం కాలుష్యకానీరీతిలో పారపోయవలెను. 2. వాడిన కంటైనర్లను తిరిగి ఉపయోగించు విధంగా బయటపారవేయరాదు. 3. ఖాళీడబ్బాలను పగులగొట్టి తిరిగి ఉపయోగపడని రీతిలో జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో తొట్టాలి.

మందు నిల్వ : 1. ఆహార పదార్థము నిల్వ చేయని వేర్వేరు గదులలో మందులను, బీరువాలలో తాళంవేసి భద్రపరుచుకొనవలెను. 2. గదుల సరియగు కొలతలలో పొడి, బాగా గాలి వచ్చేలా కలుషితంగాని రీతిలో నిర్మించబడినగా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం

థయామిథాక్సమ్ స.వ.	30.00% భా/భా
బ్యుటానాల్ కో పాలిమర్	4.30% భా/భా
గ్లిసరిన్	5.10% భా/భా
1,2 - బెంజ్‌లెసో ధయజోల్ - 3. బన్	0.20% భా/భా
మోనజో డై (ఇర్‌గాలిట్‌రెడ్ సి2బి)	3.40% భా/భా
పాలి ఇథిలీన్ గ్లైకాల్	2.60% భా/భా
నీళ్ళు	క్యుయస్% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

थायामेथोक्साम ३०% एफ एस

(अंर्तप्रवाही कीटनाशक)

थयामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस एक पहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो बीज उपचार करने से फसल के आरंभ में आने वाले चूषक कीटों को नियंत्रित करती है। इसकी आवश्यक मात्रा कपास की फसल में होने वाले कीट जैसे तेला, माहु और सफेद मक्खी ज्वार व मक्का की प्ररोह मक्खी, गेहू के दीमक, भिंडी के तेला, धान के चुरदा, हरा पत्ती का फुदका व चकीय मेगोट, सूरजमुखी के तेला व चुरदा, सोयाबीन की तना मक्खी तथा मिर्च के चुरदा के नियंत्रण के लिए बीज उपचार करने के लिए सिफारिश की जाती है। चूषक कीटों पर शीघ्र असर होने के कारण, यह पत्ता मोड़क रोग होने से रोकती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम प्रति कि.ग्रा.बीज)	संरचना (मि.ली.प्रति कि.ग्रा.बीज)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	पुन:प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	तेला, माहो, सफेद मक्खी	३	१०		यह बीज उपचार के लिए प्रयोग क्या जाता है।	
गेहूँ	टीमक	१.०	३.३			
ज्वार	प्ररोह मक्खी	३.०	१०.०			
धान	चुरदा, हरा पत्ती का फुदका, चकीय मेगोट	०.९	३.०			
भिंडी	तेला	१.७	५.७			
मक्का	प्ररोह मक्खी	२.४	८.०			
मर्च	चुरदा	२.१	७.०			
सूरजमुखी	तेला, चुरदा	३.०	१०.०			
सोयाबीन	तना मक्खी	३.०	१०.००			

उपयोग के लिए निर्देश : छोटी ढेरी के लिए, इसकी अवश्यक मात्रा को उपचारित किए जाने वाले हर किलो बीज के लिए १०-२० मि.ली. पानी मिलायें। इस गाढे धोल को बीजों के साथ मिलाकर किसी डिब्बे (प्लास्टिक का पीपा या प्लास्टिक की थेली) को अच्छी तरह से तब तक (आम तोर पर एक मिनट से कम) हिलायें जब तक बीज पूरी तरह से थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस मिल न हो जाए। ये सलाह दी जाती है कि थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस का उपयोग गारे के रुप में किया जाए, जिसके दौरान व्यावासायिक बीजोपचार यंत्र सतत चलाया जाना चाहिए, बनाने की विधि नीचे दी गई है। १. धोल बनाने की टंकी मे जरुरत से आधे मात्रा पानी डालें। २. निधार्रित मात्रा थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस को हिलाते हुए मिलाइये। ३. उत्पादन को छितर जाने दें। ४. धोलक प्रणाली का स्विच ऑन करें या हाथ से हिलाकर धोले। ५. घोल में बचा हुआ पानी मिला दें। ६. घोल गका उपयोग करते समय उसे हिलाते रहें। ७. घोल बनने के उपरान्त, उसे २४ घंटे के अन्दर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। **इस्तेमाल का तरीका:** १. ऊपर बताये अनुसार गाढा तैयार करें। २. बर्तन में बीजों को उलट दें। ३. बीजों को मिलाना शुरु करें। ४. बीजों में घोल की अपेक्षित मात्रा मिलाकर बीजों पर लगने दें। ५. इन्हें करीब ३० सेकेण्ड से एक मिनट तक दें ताकि ये एक समान रुप से उपचारित हो जाए। ज्यादा देर तक मिलाने से बीजों पर रगड़ लगेगी तथा धूल जमने लगगी।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिड़काव तैयार करने के लिए खाना पकाने की बतनों का इस्तमाल नही कीजिए। स्प्रे के धोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा को स्प२ स्पर्थ से बचाव के लिए दसतने पहने। सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मारकए चश्मा, बूटस आदि पहनें। उतप्दा को उठाते, रखत या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धुम२पान नही करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून और ढेर सारी पानी से धोइए। पहने हुए कपकडे को बदल लें और उन्हें टब्दल्ली तरह से धोइए।

विष के लक्षण : सिरदर्द, मितली, आँखों और त्वचा में जलन हो सकती है।

पाधमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बैहोश हो तो उल्टी न करायें। २.यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पैधविशाक्तता: निर्धारित मात्रा अनुसार प्रयोग करने पर पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल-पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों-पैकेटों को वेसे ही बाहर नही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनको दुबारा उपयोग किया जा सकता है। ३. डिब्बों-पैकटों को तोडमोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक को डिब्बों को अन्य सामग्री खाने के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारियों में रखना चाहिए। २. कीटनाशको के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों या इमारतो मजबूत, सुखे प्रकाशित तथा हवादार होने चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सकें।

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम, स.त.	३०.००%भार/भार
ब्युटनोल का कोपालिमर	४.३०%भार/भार
ग्लिसरीन	५.१०%भार/भार
१,२-बेन्जीसोथयजोल-३ओन	०.२०%भार/भार
मोनोजो डाय (इरग्लिथ रेड सी२बि)	३.४०%भार/भार
पालीइथिलीन ग्लाइकोल	२.६०%भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योगः	१००.००० भार/भार

चेतावनी:इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

Amish CROP SCIENCES

CREDIBLE FS

Thiamethoxam 30% FS

(Systemic Insecticide)

క్రెడిబుల్ ఎఫ్ ఎస్

థయామెథాక్సమ్ 30% యఫ్.ఎస్.

(అంతర్వాహికవర్యగల కీటకనాశిని)

केडिबुल एफ एस

थायामेथोक्साम ३०% एफ एस

(अंर्तप्रवाही कीटनाशक)

ক্রিডেবলে এফ্‌এস্

ধয়ামেথাক্সমো30% এফ্‌এস্

(ব্যবস্থিত কীটনাশক)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகீ சிகீதம்தீ தூரவிடி.

खतरा अपायकारक

DANGER

BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-130822/2015-Thiamethoxam (FS) (356)-371

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

थायामेथोक्सम ३०% एफएस (सिस्टमिक कीटकनाशक)

थायामेथॉक्सम ३०% एफएस हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टिमिक कीटकनाशक आहे जे लवकर हंगामातील शोषक कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बियाणे प्रक्रियेसाठी योग्य आहे, कापसातील जस्सीड्स, ऍफिड्स आणि व्हाईटफ्लाय, ज्वारी आणि मक्यावरील शूट फ्लाय, गव्हातील ढीमक, जेसीड यांच्या नियंत्रणासाठी बीजप्रक्रिया म्हणून शिफारस केली जाते. भेंडी, थ्रिप्स मध्ये. तांदळात जीएलएच आणि व्हॉर्ल मॅगॉट, सूर्यफुलामध्ये जॅसिड आणि थ्रीप्स, सोयाबीनमध्ये स्टेम फ्लाय आणि मिरची पिकामध्ये थ्रिप्स. शोषक कीटकांवर जलद कृती केल्यामुळे, ते लीफ कर्ल विषाणूचा प्रसार मर्यादित करते.

शिफारस:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.तत्व	संरचना	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल
कॉटन	जॅसिड्स, ऍफिड्स	३	१०	हे म्हणून वापरले जाते पांढरे माशी बियाणे कपडे	
गहू	ढीमक	१.०	३.३		
ज्वारी	शूट फ्लाय	३.०	१०.०		
तांदूळ	थ्रिप्स, ऋक्क व्हॉर्ल मॅगॉट	०.९	३.०		
भेंडी	जस्सिद	१.७	५.७		
मका	शूट फ्लाय	२.४	८.०		
मिरची	थ्रिप्स	२.१	७.०		
सूर्यफूल	जस्सिद,	थ्रिप्स ३.०	१०.०		
सोयाबीन	स्टेम फ्लाय	३.०	१०.००		

वापरण्याची दिशा:

लहान चित्र्यांसाठी, प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येक किलो बियाण्यासाठी १०-२० मिली पाण्यात आवश्यक प्रमाणात थायामेथॉक्सम ३०% एफएस मिसळा. बियाण्यामध्ये स्लरी घाला आणि बिया एकसमान झाकल्या जाईपर्यंत कंटेनर (प्लास्टिक ड्रम एवं बैग) फिरवा किंवा हलवा. (सामान्यतः एका मिनिटापेक्षा जास्त विनोद करतो) सतत कार्यरत व्यावसायिक बियाणे उपकरणांसह स्लरी म्हणून वापरण्याची शिफारस केली जाते. स्लरी तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पुढे जा.

१. आवश्यक पाण्यापैकी अर्धा भाग मिक्स टाकीच्या वर ठेवा. २. सतत ढवळत असताना आवश्यक प्रमाणात ढ्ढळराशींहुरा ३०% ऋक्क घाला. ३. उत्पादनास विखुरण्यास अनुमती द्या. ४. स्वहस्ते नीट ढवळून घ्यावे च्या आंदोलन प्रणाली स्विच. ५. पाण्याच्या उर्वरित व्हॉल्यूमसह टॉप अप करा. ६. वापराच्या संपूर्ण कालावधीत स्लरीचे आंदोलन कायम ठेवा. ७. स्लरी तयार केल्यानंतर २४ तासांच्या आत वापरावी लागते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया: १. वर्णन केल्याप्रमाणे ही स्लरी तयार करा. २. भांड्यात बी भरा. ३. बियाणे मिसळणे सुरू करा. ४. मिक्सिंग बियांवर ओतून आवश्यक प्रमाणात स्लरी लावा. ५. एकसंध उपचार प्राप्त करण्यासाठी सुमारे ३० सेकंद ते एक मिनिटे मिसळा. विस्तारित मिश्रणामुळे घर्षण आणि धूळ तयार होईल

खबरदारी: स्लरी तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. स्लरी द्रावण ढवळण्यासाठी स्टिक वापरा. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांचा संपर्क टाळा धुके आणि बाष्पांचा श्वास घेणे टाळा. मिश्रण करताना संरक्षणात्मक कपडे, मास्क गॉगल आणि बूट घाला. हात लावताना खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धुम्रपान करू नका किंवा उत्पादनाची हाताळणी करताना धुम्रपान करू नका. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. तसेच दूषित कपडे धुवा.

विषबाधाची लक्षणे: विषबाधामुळे उत्स्फूर्त हालचाल कमी होण्याची लक्षणे विषारी आक्षेप आणि ॊॊळी होऊ शकतात

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तीला ताजी हवेच्या हवेशीर भागात काढा आणि थंड होण्यापासून त्याचे संरक्षण करा. त्वचेशी संपर्क झाल्यास: दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास : काही मिनिटे डोळे स्वच्छपाण्याने स्वच्छ धुवा. टीप: बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका, उलट्या होऊ देऊ नका.

फायटोटॉक्सिसिटी : शिफारशीनुसार लागू केल्यास फायटोटॉक्सिक नाही.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही लक्षणात्मक थेरपी लागू करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. मशिन आणि कंटेनरमधील अतिरिक्त साहित्य आणि धुण्याचे पॅकेजेसची पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर गाडले जावे.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारातील खोलीपासून दूर ठेवल्या पाहिजेत ज्यामध्ये इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जातील किंवा लॉक आणि चावीच्या खाली असलेल्या स्वतंत्र अलमिरीशिवाय. २. कीटकनाशके पुनर्संचयित करण्यासाठी खोल्या किंवा परिसर चांगले बांधले जावेत. कोरडे, चांगले प्रज्वलित आणि हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेसे आकारमान.

रासायनिक रचना:

थायामेथोक्सम र.ळ	३०.००% व/व
बुटानॉलचे कोपॉलिमर	४.३०% व/व
ग्लिसरीन	५.१०% व/व
१,२-बेंझिसोथ्राझोल ३ एक	०.२०% व/व
मोनाझो डाई (इरगालिथ रेड सी २ बी)	३.४०% व/व
पॉलीथिलीन ग्लायकॉल	२.६०% व/व
पाणी	Q.S. % व/व
एकूण	१००.००० % व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ధయామేథాక్సమ్30% ఎఫ్ఎస్ (వ్యవస్థిత కీటనాశక)

ధయామేథాక్సమ్ 30% ఎఫ్ఎస్ విశాల రోఫిత వ్యవస్థిత కీటనాశకవాగిద్దు, ఆరంభిక మితుపిత కీలరువ కీటనాశన్ను నియంత్రిసలు బీజ సంస్కరణేగే సూక్తవాగిరుత్తదే, హత్తియల్లి జాసిడ్, గిడహేనుగళు మత్తు బిళినొణగళన్ను నియంత్రిసలు బీజ చికిత్సేయాగి శిఫారసు మాడలాగిదే, చోళ మత్తు చోళద మేలే చిగురు, గోధి, జాసిడ్లల్లి గేద్దలు బెండేకాయియల్లి, థ్రిప్స్, భత్తదల్లి జిఎలోఎఎచ్ మత్తు వ్హార్ల్ మ్యాగోట్, సూర్యకాంతియల్లి జాసిడ్ మత్తు థ్రిప్స్, సోయాబీన్నల్లి కాండ నొణ మత్తు మేణసినకాయి బేళేయల్లి థ్రిప్స్ . హీరువ కీటద మేలే ఆదర వేగద క్రియేయిందాగి, ఇదు ఎలే సురుళియ వైరస్ హరడుపకేయన్ను మితిగేళుళిసుత్తదే.

శిఫారసుగళు:

బిళి	కీటగళుసామాన్య పేరు	ఎ.ఐ. (గ్రా)	డోసేజ్ / జా సరత్తిరగల (ఎంఎల్)	వాటర్ స్పేలర్ (లీటర్)	కాయియ అవధి మధ్య ప్రదేశ ప్రతియొందర సంకరద కొనెయ దినగళుగళు అక్కిరకగే సుర్యకి (దినగళు)	మరు ప్రదేశ (గంటెగళు)
హత్తి	జాసిడ్స్, ఆఫిడ్	3	10		ఇదన్ను బళసలాగుత్తదే బళ బీజ ఊడుపుగళన్ను హారుత్తదే	
గోధి	థ్రిమ్మిన్స్	1.0	3.3			
హులుజోళ	షూట్ ఫ్లై	3.0	10.0			
ఆళ్ళి	థ్రిప్స్, జిఎలోఆఎ, వ్హోర్ల్ మ్యాగట్	0.9	3.0			
ఒక్రా	జాసిడ్స్	1.7	5.7			
మెక్కెజోళద	షూట్ ఫ్లై	2.4	8.0			
చిల్లి	థ్రిప్స్	2.1	7.0			
సూర్యకాంతి	జాసిడ్స్, థ్రిప్స్,	3.0	10.0			
సోయాబీన్	స్టెమ్ ఫ్లై	3.00	10.00			

బళకేయ నిర్దేశన: అసన్నపాహారక్కాగి, ప్రతి కేజి బీజక్కాగి 10-20 మిలీల్. నీరన్ను హొందిరువ థయామేథాక్సమ్ను 30% ఎఫ్ఎస్ను బీజాద మిశ్రణవన్ను బేరేసి బీజక్కే సేరిసి మత్తు బీజగళన్ను ఏకరూపవాగి ముచ్చువవరెగూ ధారణవన్ను (ప్లాస్టిక్ డ్రమ్/అథవా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్) తిరుగిసి అథవా బేరేసి (సామాన్యవాగి ఒందు నిమిషక్కింతలూ హెచ్చు చిన్స్).

సిమేంటు తయారికేయల్లి ముందువరెయియే. 1. మిశ్రణద తొట్టియల్లి అర్ధదష్టు నీరిన అగత్యవిరుత్తదే. 2. నిరంతరవాగి స్క్రూతిదాయకవాద థయామేథోక్సమ్ను 30% ఎఫ్ఎస్ ప్రమాణవన్ను సేరిసి. 3. ఉత్పన్నవన్ను కెదురిసలు అవశ్యక మాడికోడి. 4. క్యేయారే మూడిసువ ఆందోళనద వ్యవస్థియన్ను బదలిసి. 5. నీరిన ఉళిద పరిమాణదొందిగే మేల్బాగ. 6. బళకేయ సంపూర్ణ సమయద సమయదల్లి సిమేంటుగళ ఆందోళనవన్ను కాపాడికొళ్ళి. 7. తయారికేయ నంతర 24 గంటెగళ ఒళగే సిమేంటు బళసబేకు.

అప్లికేశన్ కార్యవిధాన: 1. వివరిసిదంతే ఈ సిమేంటు తయారిసి. 2. బీజవన్ను రేసేప్పాకలల్లి తుంబిసి. 3. బీజవన్ను మిశ్రణవన్ను ప్పారంభిసి. మిశ్రణ బీజక్కే సురియువుదర మూలక ఆగత్యవాద సిమేంటుగళన్ను అన్నయిసి. ఒందు ఏకరూపద చికిత్సేయన్ను సాధిసలు సుమారు 20 సేకండుగళవరెగే ఒందు నిమిషక్కే మిక్స్ మాడి. విస్తృత మిశ్రణవు సవేత మత్తు ధూళిన రూపక్కే కారణవాగుత్తదే.

ప్రథమ చికిత్సే: 1. ఆపాయద వలయదింద ఆపాయకారి వ్యక్తియిందే చిన్నాగి గాళి కూణేగే అథవా తాజా గాళియింద తగదుహాకి మత్తు ఆంకూలిన్ నిందే రక్షిసి. 2. రోగి ఆనుమానాస్పద పిసనింగ్ తక్షణవే ఒబ్బ వైద్యనన్ను కరదురియుత్తదే. 3. చిమ్మదద కారణదిందాగి: కలుషితవాద బట్టెగళన్ను తేగదుహాకి మత్తు దేహదల్లి బాధిత భాగగళన్ను సోప్ మత్తు శాశక్షు నీరినింద సంపూర్ణవాగి తేగిదుహాకి. 4. కన్ను ప్రకరణదల్లి: హలవారు నిమిషగళ కాల శుద్ధ నీరినింద కణ్ణుగళన్ను నేనేసి. 5. నిరాధారద సంబర్ధదల్లి: పువరణవర్తివాగి ఔషధియ ఇద్దిలువన్ను దూరద్ద ప్రమాణదల్లి నీరినల్లి నిర్వహిసి. సూచన: సుప్తావస్థేయ వ్యక్తిగే హుడుగే బాయియే యావత్తూ నీడువుదిల్లు. వాంతి ఊంటుమాడువుదిల్లు.

విషద లక్షణగళు: స్వాభావిక చలన విషకారి మిదుళిన మత్తు పేటోసిస్నల్లి విషయుక్తతెయు రోగగలక్షణగళన్ను కడిమేగొళిసుత్తదే.

ప్రత్యౌషధ: నిర్దిష్టవాద యావుదే ప్రత్యౌషధ తేళియబందిల్లు. లక్షణగళిగనుసార చికిత్సేమాడిరి.

ఉపయోగిసద ధారకగళ విలేవారు: 1. పరిసర మత్తు జల మాలిన్యవన్ను తడేగట్టలు యంత్రగళు మత్తు ధారకగళింద హెచ్చువరి వస్తుగళన్ను మత్తు తొళియువ ప్యాకేజుగళన్ను సురక్షిత రీతియల్లి హొరహాకబేకు. 2. బళసిద ప్యాకేజుగళన్ను అవుగళ మరు-బళకేగే తడేగట్టలు హొరగే బిడువుదిల్లు. 3. ప్యాకేజుగళన్ను ముురియలాగువుదు మత్తు వాసస్థానదిందే దూర సమాధి మాడబేకు.

శేఖరణా నియమగళు: 1. కీటనాశకగళన్ను హొందిరువ ప్యాకేజుగళన్ను మూల కంటేనర్గళల్లి ప్రత్యేక కోణేగళల్లి హూరతుపడిసి ఇతర లీఖనగళన్ను సంగ్రహిసలు అథవా ఆవరణదల్లి శేఖరిసిడబేకాద స్థళగళ కోణేగళన్ను హొరతుపడిసి ఇతర లీఖనగళన్ను నిర్దిష్టవాగి ఆహారద స్యేవినగళు సంగ్రహిసలు అథవా లాక్ మత్తు తీ అడియల్లి ప్రత్యేక అమ్మిరాగళన్ను హొరతుపడిసి హుగిల్లె. 2. కీటనాశకగళన్ను సంగ్రహిసువ ఉద్దేశక్కాగి కొరడిగళు అథవా ఆవరణగళు చిన్నాగి నిర్మిసల్పడబేకు. శుష్క, చిన్నాగి లిట్ మత్తు గాళి మత్తు ఆవియొందిగే మాలిన్యవన్ను తప్పిసలు సాశక్షు ఆయామద.

రాసాయనిక సంయోజనే:

థయామేథోక్సమ్ స.ఫు.	30.00% తూక/తూక
కోపాలిమర్ ఆఫ్ బుటానాల్	4.30% తూక/తూక
గ్లిసరిన్	5.10% తూక/తూక
1,2-బేంజిసోథాయోజోలోల్ 3-ఒందు	0.20% తూక/తూక
మోనజోడ్యే (ఇగ్రలిఎ రేడ్ సి2బి)	3.40% తూక/తూక
గ్లేకోల్	2.60% తూక/తూక
నీరు	క్యుయస్% తూక/తూక
ఒంటు	100.000% తూక/తూక

ఎచ్చరికే: ఈ లేబల్/కరపత్రదల్లి నిర్దిష్టపడిసిద హొరతుపడిసి బేరే బేళగళల్లి బళసబారదు.

தியாமெதோக்சம் 30% ஊகு (முறையான பூச்சிக்கொல்லி)

தியாமெதோக்சம் 30% எஃப்எஸ் எனபது பரந்தஸ்பெக்ட்ரம் அமைப்பு சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லியாகும், இது ஆரம்ப பருவத்தில் உறிஞ்சும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் விதை நேர்த்திக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, பருத்தியில் ஜாசிட்ஸ், அசுவினி மற்றும் வெள்ளை ஈக்களைக் கட்டுப்படுத்த விதை நேர்த்தியாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, சோளம் மற்றும் சோளத்தில் பறக்கிறது, கோதுமை, ஜாசிட் ஆகியவற்றில் கரையான்கள். ஓக்ராவில், த்ரிப்ஸ். நெற்பயிரில் எஃப் மற்றும் கிண்ணினுடு இலைஞ்ஞண்ணு, குரியகாந்தியில் ஜாசிட் மற்றும் த்ரிப்ஸ், சோயாபீனில் தண்டு ஈ மற்றும் மிளகாய் பயிரில் த்ரிப்ஸ். உறிஞ்சும் பூச்சி மீது அதன் விரைவான நடவடிக்கை காரணமாக, இது இலை சுருட்டை வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர் (கள்) பெயர்	பூச்சியின் பொதுப்	Al (கிராம்)	அளவு / ஹெ ஸ்பார்ருலேஷன் (Ml)	தண்ணீரில் செறிவை (lite)	குறைக்கக்காத்திருப்பு காலம் கடைசியிலிருந்து அறுவடை வரை (நாட்களில்)
பருத்தி	ஜாசிட்ஸ், அஃபிட்ஸ்	3	10	இது பயன்படுத்தப்படுகிறது வெள்ளை ஈக்கள் விதை ஆடைகள்	
கோதுமை	கரையான்கள்	1.0	3.3		
சோளம்	வுஅட் ஃப்ளை	3.0	10.0		
ரைஸ்	த்ரிப்ஸ், எஃஎ, சுழல் மாகோட்	0.9	3.0		
ஓக்ரா	ஜாசிட்	1.7	5.7		
மக்கச்சோள	வுஅட் ஃப்ளை	2.4	8.0		
	மிளகாய்த்ரிப்ஸ்	2.1	7.0		
குரியகாந்தி	ஜாசிட்,த்ரிப்ஸ்	3.0	10.0		
சோயாபீன்	தண்டு ஈ	3.0	10.00		

பயன்பாட்டின் திசை:

சிறிய நிலங்களுக்கு, ஒவ்வொரு கிலோ விதைக்கும் தேவையான அளவு தியாமெதாக்சம் 30% ஊகுஐ 1020 மிலிலி தண்ணீரில் கலந்து விதையில் குழம்பு சேர்த்து விதைகள் ஒரே மாதிரியாக மூடப்படும் வரை கொள்கலனை (பிளாஸ்டிக் டிரம் அல்லது பிளாஸ்டிக் பை) சுழற்றவும் அல்லது கிளறவும். (பொதுவாக ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் கேலி செய்யும்) தொடர்ந்து செயல்படும் வணிக விதை உபகரணங்களுடன் குழம்பாகப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குழம்பு தயாரிப்பதற்கு பின்வருமாறு தொடரவும்.

1. தேவையான தண்ணீரை மிக்ஸ் டேங்கின் மேல் வைக்கவும். 2. தொடர்ந்து கிளறிக் கொண்டிருக்கும் போது தேவையான அளவு தியாமெதாக்சம் 30% ஊகு சேர்க்கவும். 3. தயாரிப்பு சீரற்ற அனுமதிக்கவும். 4. கிளறல் அமைப்பை கைமுறையாக மாற்றவும். 5. மீதமுள்ள தண்ணீரின் அளவை நிரப்பவும். 6. உபயோகத்தின் முழு நேரத்திலும் குழம்பு கிளர்ச்சியை பராமரிக்கவும். 7. குழம்பு தயாரித்த 24 மணி நேரத்திற்குள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: 1. விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்தக் குழம்பைத் தயாரிக்கவும். 2. விதையை கொள்கலனில் நிரப்பவும். 3. விதையை கலக்கத் தொடங்குங்கள். 4. கலவை விதை மீது ஊற்றி தேவையான அளவு குழம்பு பயன்படுத்தவும். 5. ஒரே மாதிரியான சிகிச்சையை அடைய சுமார் 30 வினாடிகள் முதல் ஒரு நிமிடம் வரை கலக்கவும். நீட்டிக்கப்பட்ட கலவையானது சிராய்ப்பு மற்றும் தூசி உருவாவதற்கு வழிவகுக்கும்

முன்னெச்சரிக்கை: குழம்பு தயாரிக்க கையில் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். குழம்பு கரைசலை கிளறுவதற்கு குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். தோல், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும் முடுபனி மற்றும் நீராவியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். கலக்கும் போது பாதுகாப்பு ஆடைகள், முகமூடி கண்ணாடிகள் மற்றும் பூட்ஸ் அணியுங்கள். கைகொடுக்கும் போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைபிடிக்கவோ அல்லது தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தும்போது புகைபிடிக்கவோ கூடாது. சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கைகளை கழுவி, வேலை முடிந்ததும் உடைகளை மாற்றவும். அசுத்தமானதுணிகளையும் துவைக்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: நச்சுத்தன்மையானது தன்னிச்சையான இயக்கம் நச்சு வலிப்பு மற்றும் ணீணுணிண்டிண் குறைவதற்கான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை புதிய காற்றின் நன்கு காற்றோட்டமான பகுதிக்கு அகற்றி, குளிர்ச்சியிலிருந்து அவரைப் பாதுகாக்கவும். சருமத்தில் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் நன்கு கழுவவும். கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: பல நிமிடங்களுக்கு கண்களை சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும்: உட்கொண்டால்: அதிக அளவு தண்ணீரில் மீண்டும் மீண்டும் மருத்துவ கரியை கெலுத்தவும். குறிப்பு: சுயநினைவற்ற நபருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம்.

பைட் டோடாக்ஸிசிட்டி: பரிந்துரையின்படி பயன்படுத்தினால், பைட்டோடாக்ஸிக் இல்லை.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை அறிகுறி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்தவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களில் இருந்து உபரியான பொருட்கள் மற்றும் சலவைகளின் தொகுப்புகள் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்புகளில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய தொகுப்புகள் அசல் கொள்கலனில் தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை மீட்டெடுக்கும் அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு புதைக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். உலர்ந்த, நன்கு ஒளிரும் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு.

வேதியியல் கலவை:

தியாமெதோக்சம் ச்.டி	30.00 % தீ/தீ
டியூட்டனால் கோபாலிமர்	4.30 % தீ/தீ
கிளிசரின்	5.10 % தீ/தீ
1,2பென்சிசோத்ராசோல் 3 ஒன்று	0.20 % தீ/தீ
மோனாசோ சாயம் (இர்கலிஎ ரெட் சி 2 பி)	3.40 % தீ/தீ
பாலிஎதிலீன் கிளைகோல்	2.60 % தீ/தீ
தண்ணீர்	கே.எஸ். % தீ/தீ
மொத்தம்	100.000%தீ/தீ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/ துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

CREDIBLE FS

Thiamethoxam 30% FS

(Systemic Insecticide)

క్రెడిబుల్ ఎఫ్ ఎస్

ధయామెథాక్సమ్ 30% యఫ్.ఎస్.

(అంతర్వాహికచర్యగల కీటకనాశిని)

केडिबुल एफ एस

थायामेथोक्साम ३०% एफ एस

(अंर्तप्रवाही कीटनाशक)

క్రిడేబుల్ ఎఫ్ఎస్

ధయామేథాక్సమ్30% ఎఫ్ఎస్

(వ్యవస్థిత కీటనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

मक्कळिगै सिगदंतै दूरविडि.

खतरा DANGER BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-130822/2015-Thiamethoxam (FS) (356)-371

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE