CREDIBLE
Thiamethoxam 25% WG
(Insecticide)

Thiamethoxam 25% WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper, (BPH), White Backed Plant Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper (GLH), Thrips of Rice; Jassids, Aphids and Whiteflies in Cotton; Hoppers in Mango; Aphids in Wheat; Aphids, Jassids in Okra; Aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; Mosquito bug in Tea & Aphids in Potato, Psylla in Citrus. It contains 250g Thiamethoxam as an active ingredient in a kg of the product (w/w)

Recommendation:

Crop(s)	Common name	Dosage A.I. (gm)	Formulation (gm)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Mango	Hoppers	25	100	1000	30
Potato	Aphids (Myzus Persicae)	25 (foliar spray) 50 (Soil drench)	100 (Foliar spray) 200(Soil drench)	500	77
Cotton	Jassids, Aphids White flies	25 50	100 200	500-750 500-750	21 21
Wheat	Aphids	12.5	50	500	21
Tea	Mosquito bug (Helopeltis theivora)	25	100	400-500	7
Tomato	Whiteflies	50	200	500	5
Tomato	Whiteflies	100	400	500	5 (Soil drenching)
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, brown Plant Hopper (BPH), White backed plant Hopper (WBPH), Green leaf hopper, Thrips	25	100	500-750	14
Citrus	Psylla	25	00	1000	20
Brinjal	whiteflies,	50	200	500	3
Okra	Jassid, Aphid, Thrips, White flies	25	100	500-1000	5
Mustard	Aphid	12.5-25.0	50-100	500-1000	21

Direction for Use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. P.P. Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, Battery operated power sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of application : 1. Mango: Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending o n the level of pest intensity) 2. Potato: Foliar-application - Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending o n the level of pest intensity. Soil drench: Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season. 3. Cotton : Apply first spray 25-30 DAS or at the time of pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending o n the level of pest intensity. 4. Wheat : Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending o n the level of pest intensity. 5. Tea: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending o n the level of pest intensity. 6. Tomato : Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending o n the level of pest intensity. 7. Rice: One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as stem borer, gall midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50-55 DAT) for the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc. 8. Brinjal : Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 10-15 days interval depending o n the level of pest intensity. 9. Okra Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending o n the level of pest intensity. 10. Mustard : Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending o n the level of pest intensity. 11. Citrus : Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending o n the level of pest intensity.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Symptoms : Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur.

Disposal of used Container : 1. The Packages and surplus material and washing from the machines and containers should be disposed off water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. The Package shall be broken and burried sway from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition :

Thiamethoxam a.i.	25.00% w/w
DispersingAgent : Sodium Lauryl Sulphate	3.75% w/w
Plasticiser : Butylated Polyvinyl Pyrrolidione	1.25% w/w
Carrier Diatomaceous Earth	5.00% w/w
Binder Corn Starch	Q.S. % w/w
Total	100.00 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

క్రెడిబుల్
థయోమెథాక్సమ్ 25% డబ్ల్యూ జి
(కీటకనాశిని)

థయోమెథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి. అనునది విస్తృత చర్యగల అంతర్వాహిక కీటకనాశిని. దీని త్వరితగతి గల స్పర్శచర్య కీటకము మొక్క, ఉదరముపై వెంటనే ప్రభావము చూపుతుంది. అందుచే కీటకములు వెంటనే నిర్మూలింపబడతాయి. దీనిని వరిపైరునాశించు కాండము తొలుపురుగు, ఉల్లికోడు, ఆకుచుట్టు పురుగు, సుడిదోమ, తెల్లదీపు గల సుడిదోమ, మిడతలు మరియు తామర పురుగులు, ప్రత్తి పైరునాశించు పచ్చదోమ, పేనుబంక మరియు తెల్లదోమలు, మామిడిపైరు నాశించు తేనెమంచు పురుగులు, గోధుమలో పేనుబంక, పచ్చదోమ, బెండలో తెల్లదోమ, ఆవాలుపైరులో పేనుబంక, టమోటాలో తెల్లదోమ, వంగలో పచ్చదోమలు, తేయాకులో నల్లి, బంగాళదుంపలో పేనుబంక, నిమ్మజాతి నాశించు ఎగిరేపేను మరియు జిలకర్ర పైరు నాశించు పేనుబంకలను సమర్థవంతముగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను.

సిఫారసులు :

పైర్లు	కీటకాల సాధారణ నామములు	మోతాదు/హె.			చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయము (రోజులలో)
		స.వ. (గ్రా)	మందు ద్రావణం (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లిటరు)	
మామిడి	దోమ	25	100	1000	30
బంగాళదుంప	పేనుబంక (మైజస్ సెర్సికా)	25 (పిచికారి) 50(నేలసేద్యం)	100 (పిచికారీ) 200(నేలసేద్యం)	500	77
ప్రత్తి	దీపపుపురుగు, పేనుబంక, తెల్లదోమ	25 50	100 200	500-750 500-750	21 21
గోధుమ	పేనుబంక	12.5	50	500	21
టి	దోమల బగ్ (హెలాల్పెల్టిస్ థియోరా)	25	100	400-500	7
టమాటా	తెల్లదోమ	50	200	500	5
టమాటా	తెల్లదోమ	100	400	500	5 (నేల సేద్యానికి)
వరి	కాండం తొల్చు, గాలి మిడ్డి ఆకుముడుత, దోమపోటు (సుడిదోమ) తెల్ల వీపుగల పురుగులు పచ్చపురుగులు, తామరపురుగులు	25	100	500-750	14
నిమ్మజాతి	స్రైల్లా	25	00	1000	20
వంగ	తెల్లదోమ	50	200	500	3
అక్రా	దీపపుపురుగు, పేనుబంక, తామరపురుగులు, తెల్లదోమ	25	100	500-1000	5
ఆవాలు	పేనుబంక	12.5-25.0	50-100	500-1000	21

ఉపయోగించుటకు సూచనలు: ఉత్పత్తి అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొలవడం మరియు చిన్న పరిమాణంలో నీరు బాగా కలపాలి. సరైన తుషార యంత్రంతో పంట మొత్తం కవర్ చేస్తూ మిగిలిన నీటిని జోడించండి. యంత్రసామగ్రి: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ పవర్ స్ప్రేయర్ మరియు ఆస్పీ-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్.

పిచికారీ సమయం : 1. మామిడి: హప్పర్లు (సెస్టో తీవ్రత మీద ఆధారపడి మొదటి పురుగు ప్రదర్శనలో మరియు 15 రోజుల విరామం వద్ద ఒకటి లేదా రెండు పిచికారీలను మరల మరల చేయాలి) 2. బంగాళాదుంప: ఆకులపై పిచికారీ - ప్రారంభదశలో పురుగు కనబడిన వెంటనే పిచికారీ చేయాలి. మరియు పురుగు తీవ్రత స్థాయిని బట్టి 10-15 రోజుల విరామం వద్ద 2-3 పిచికారీలను మరల మరల చేయాలి. నేలలోని తేమను బట్టి : పంట కాలంలో ఒకసారి, ప్రారంభంలో చేళ్ళ దగ్గర పిచికారీ చేయాలి. 3. ప్రత్తి : మొదటి పిచికారీ 25-30 DAS లేదా తెగులు కనిపించే సమయంలో మరియు తెగులు తీవ్రత స్థాయిని బట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 పిచికారీలను మరల మరల చేయండి. 4. గోధుమ : తెగులు ప్రారంభ సమయంలో మొదటి పిచికారీ చేయండి మరియు తెగులు తీవ్రత స్థాయిని బట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో ఒకటి లేదా రెండు పిచికారీలను మరల మరల చేయండి. 5. తేయాకు: తెగులు ప్రారంభ సమయంలో మొదటి పిచికారీ చేసి మరియు తెగులు తీవ్రత స్థాయిని బట్టి 15-21 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 పిచికారీలను మరల మరల చేయండి. 6. టొమాటో : తెగులు ప్రారంభ సమయంలో మొదటి పిచికారీ చేయండి మరియు తెగులు తీవ్రత స్థాయిని బట్టి 10-15 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 ప్రిచికారీలను మరల మరల చేయండి. 7. వరి: ప్రారంభలో పచ్చ కాండం తొలుచు పురుగు, గాల్ మిడ్డ్ పంట తెగుళ్ళ నివారణకు పంట ప్రారంభ దశలో 25-30 DAT వద్ద ఒక పిచికారీ మరియు మరొకటి ఆకు దశలో (ఏ 50-55 DAT) నియంత్రణ కోసం పిచికారీ చేయాలి. చివరి దశలో పలలో పచ్చు తెగుళ్లు GLH, BPH, WBPH మొదలైనవి. 8. వంగ: పంట ప్రారంభ దశలో మొదటి పిచికారీ చేయాలి. తెగుళ్ళ తీవ్రతను బట్టి 10-15 రోజుల విరామంలో ఒకటి లేదా రెండు ప్రిచికారీలు మరల మరల చేయాలి. బెండ పంట ప్రారంభ దశలో తెగుళ్ళ తీవ్రత బట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో మొదటి పిచికారీ చేయాలి మరియు ఒకటి లేదా రెండు పిచికారీలను మాత్రమే చేయాలి. 10. అవాలు : పంట ప్రారంభ దశలో మొదటి పిచికారీ చేయాలి. తెగుళ్ళ తీవ్రతను బట్టి 15 రోజుల విరామంలో ఒకటి లేదా రెండు ప్రిచికారీలు మరల మరల చేయాలి. 11. నిమ్మజాతి: పంట ప్రారంభ దశలో మొదటి పిచికారీ చేయాలి. తెగుళ్ళ తీవ్రతను బట్టి 10-21 రోజుల విరామంలో ఒకటి లేదా రెండు ప్రిచికారీలు మరల మరల చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1) ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసముల నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2) ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనియరాదు. 3) మందు ద్రావణమును పీల్చరాదు. గాలి వాటమునగే పిచికారి చేయండి. 4) కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5) పిచికారి చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6) పిచికారి చేయునపుడు మరియు మందు కలుపునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

విరుగుడు :నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమీ లేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మందును మింగినచో, నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు మరియు వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి పుష్కలమైన నీరు మరియు సబ్బుతో బాగా శుభ్రము చేసుకొనవలెను. 3. కళ్ళలో మందు పడిన వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో 10-15 నిల వరకు ధారగా కడగండి.

విషలక్షణములు: తలనొప్పి, మగత, కండరముల చలుకు, వాంతులు మరియు ఉత్సుకత వంటివి కనబడతాయి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిర్వహణ : 1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రావణం పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా వినియోగించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

థయోమెథాక్సామ్ స.వ.	25.0 % భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ : సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్	5.00 % భా/భా
వెటింగ్ ఏజెంట్: సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్	3.75% భా/భా
ప్లాస్టిసైజర్ బుటిలేటెడ్ పాలివినైల్ పైరోలిడాన్	1.25 % భా/భా
క్యారియర్: డయటామెషియస్ ఎర్త్	5.00 % భా/భా
బైండర్ కార్న్ స్టార్చ్	క్యు.ఎస్. % భా/భా
మొత్తం	100.00 % భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

केडिबुल
थायामेथॉक्साम २५% डब्ल्यू जी
(कीटनाशक)

थायामेथॉक्साम २५ डब्ल्यू.जी की सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पीधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू, तेला, सफेद मक्खी, आम में टिड्डो, गैहूं में माहू, बैंगन में सफेद मक्खी व तेला, सरसों में माहू, टमाटर में सफेद मक्खी, चाय में मच्छर कीट तथा आलू में माहू, नींबू में सिल्ला तथा जीरा में माहू की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा(लीटर)	अन्तिम छिडकाम तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
आम	टिड्डे	२५	१००	१०००	३०
आलू	माहू	२५ (पत्ते पर छिड़काव) ५० (मिट्टी को मिगोना)	१००(पत्ते पर छिड़काव) २०० (मिट्टी को मिगोना)	५००	७७
कपास	माहू, तेला, सफेद मक्खी	२५ ५०	१०० १००	५००-७५० ५००	२१ २१
गेहूँ	माहू	१२.५	५०	५००	२१
चाय	चाय का मच्छर कीट	२५	१००	४००-५००	७
टमाटर	सफेद मक्खी	५०	२००	५००	५
टमाटर	सफेद मक्खी	१००	४००	५००	५ (भूमि उपचार)
धान	तना छेदक, माजू मक्खी, मोडक, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौदा टिड्डा हरा पत्ती टिड्डा चुरदा	२५	१००	५००-७५०	१४
नींबू	सिल्ला	२५	००	१०००	२०
बैंगन	सफेद मक्खी, तेला	५०	२००	५००	३
भिंडी	माहू, तेला	२५	१००	५००-१००	५
सरसों	माहू	१२.५-२५.०	५०-१००	५००-१०००	२१

उपयोग के लिए निर्देश : उत्पाद का लिखितमात्रा लीजीए उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे कीजिए। निदिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिली लीजिए।

प्रयोग का समय: १. आम: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनों के अंतर से १-२ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। २. आलू: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर ओर उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से १-२ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ३. कपास-पहली छिड़काव बुआई के २-३० दिनों के बाद पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद २-३ छिड़काव १५ दिनों के अंतर से कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ४. गेहूँ : पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनों के अंतर से १-२ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ५. चाय: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनों के अंतर से २-३ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ६. टमाटर: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमि उपचार: कीटो के नजर आने से पहले, पौदो की जड़ की श्रेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें। ७. धान: रोपाई के २५-३० दिनों के बाद एक छिड़काव फसल पर आने वाले धान के शुरुआती कीटों जैसे कि तना छेदक, माजू मक्खी आदि की रोकथाम के लिए, तत्पश्चात रोपाई के ५०-५५ दिनों के बाद दूसरा छिड़काव धान के फसल पर बाद की अवस्था पर आने वाले कीटों जैसे कि भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, आदि की रोकथाम के लिए, कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ८. बैंगन: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ९. भिंडी: पत्ते पर छिड़काव: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनों के अंतर से १-२ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। १०. सरसों: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनों के अंतर से १-२ कीटो की मौजूदगी के आधार पर। ११. नींबू: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनों के अंतर से २-३ कीटो की मौजूदगी के आधार पर।

सावधानी : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थों के खाली डिब्बे तथा पशुखाद्य से दूर रखें। २. मुँह, आँखें तथा त्वचा से संपर्क टालें। ३. फुहारने के समय फुहार से तुषार श्वसन क्रिया द्वारा अंदर न लें। हवा बहती हो उसी दिशा में फुहारें। ४. फुहार कार्य समाप्ति के बाद प्रदूषित कपड़े तथा शरीर के विविध अंगों को अच्छी तरह धो डालें। ५. फुहारने का कार्य करते समय तथा मिश्रण तैयार करते समय धूम्रपान, खानी, पीना, चबाना इत्यादि क्रिया करने की सख्त मनाई है। ६. फुहारने का मिश्रण तैयार करते समय तथा फुहारने का कार्य करते समय पूरी तरह सुरक्षित हो ऐसा पेहराव करें।

निवारक प्रति उपचार : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाए तो उल्टी न कराएं या कोई पदार्थ मुँह द्वारा न दें। २. यदि निगल जाएं तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक कि उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। ३. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ४. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सेलाइन - साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ५. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं।

लक्षण : विष के लक्षण से शरीर में ठीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को तोड कर जमीन में निवास स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दें। २. प्रयोग किए डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई सामगी या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि पानी, वातावरण दुषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग अलग कमरों या अलमारियों में अन्य पदार्थों खास करके खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों या जगह से दूर या अलग-अलग अलमारियों में कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के अनुसार ताला चाबी मे बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जिस कमरे जगहों में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह जगह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवादार और आयतन में लम्बा चौड़ा होना चाहिए ताकि कीटनाशक के भाप से वातावरण के प्रदूषित होने का भय न रहें।

रासायनिक संरचना :

थायामेथॉक्साम सक्रिय तत्व	२५.०० % भार/भार
छितराने वाले तत्व सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	५.०० % भार/भार
गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल सल्फेट	३.७५ % भार/भार
प्लारिटसाइज़र ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरॉलिडॉन	१.२५ % भार/भार
संवाहक डाइ-एटोमेशियस मिट्टी	५.०० % भार/भार
बाईन्डर कॉर्न स्टार्च	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल	१००.०० % भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Amish® CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

CREDIBLE
Thiamethoxam 25% WG
(Insecticide)

క్రెడిబుల్
థయోమెథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యూ.జి.
(కీటకనాశిని)

केडिबुल
थायामेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी.
(कीटनाशक)

ક્રેડિબુલ્
થિયામેથાક્સામ્ 25% ડબ્લ્યુ જી
(કીટકનાશક્)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर : १७२, उड्डमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल), नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR- 130851/2015-Thiamethoxam (WG) (356)-372
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

केडिबुल

थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी

(कीटकनाशक)

थायामेथॉक्सम 25% डब्ल्यूजी हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक कीटकनाशक आहे ज्यामध्ये पोटात जलद आणि संपर्क क्रिया आहे आणि स्टेम बोअरर, गॅल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर, (बीपीएच), व्हाईट बॅक्ड प्लांट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफ नियंत्रित करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यासाठी शिफारस केली जाते. हॉपर (जीएलएच), थ्रीप्स ऑफ राइसच कापसातील जॅसिड्स, एफिड्स आणि व्हाईटफ्लायय आंबा मध्ये हॉपर्सय गहू मध्ये ऍफिडस्य भेंडीमध्ये एफिड्स जस्सिड्सय मोहरी मध्ये ऍफिड्सय टोमॅटो मध्ये पजमसिपमेय वांग्यातील पांढरी माशी, जस्सीडय चहामध्ये डासांचा ब ग आणि बटाट्यामध्ये ऍफिड्स, सायट्रसमध्ये सायला. एक किलो उत्पादनामध्ये 250 ग्रॅम थायामेथोक्सम सक्रिय घटक म्हणून समाविष्ट आहे (ग/ब)

शिफारसी :

पीक	कीट कारणे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरक्षण (ग्रा.) (ग्रा.)	प्रतिक्षा सौम्यकरण पायन (लिटर)	अवशिष्टत्व फवारणी ते काणणी (दिवस)
मैंगो	हॉपर्स	25	100	1000	30
बटाटा	ऍफिड्स (मायग्रास 25 रसे) पर्सीके)	25 (मायग्रास 25 रसे) 50 (माती भिजवणे)	100 (फोलियर 100 रसे) 200(माती भिजवणे)	फोलियर 500	77
कापूस	जॅसिड्स, एफिड्स	25	100	500–750	21
	पांढरी माशी	50	200	500–750	21
गहू	ऍफिड्स	12.5	50	500	21
चहा	मच्छर बग हेलोपेल्टिस थिव्होरा)	25	100	400–500	7
टोमॅटो	व्हाईटफ्लाइज	50	200	500	5
टोमॅटो	व्हाईटफ्लाय	100	400	500	5 (माती भिजवणे)
तांदूळ	स्टेम बोअरर, गॅल मिज, लीफ फोल्डर, तपकिरी वनस्पती हॉपर (टच), पांढरपा आधार असलेली वनस्पती हॉपर WBPH ग्रीन लीफ हॉपर, थ्रिप्स	25	100	500–750	14
लिंबूवर्गीय वांगी	सायला	25	00	1000	20
	पांढरी माशी,	50	200	500	3
भेंडी	जस्सीद, ऍफिड, थ्रिप्स, व्हाईट फ्लाईज	25	100	500–1000	5
मोहरी	ऍफिड	12.5–25.0	50–100	500–1000	21
ऊस	गुळ छेदक	७५-१००	२५०-३३.३	-	९ महीने

वापरण्याची पद्धत: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राच्या साह्याने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी कसून आंदोलनासह निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला. पी. पी. उपकरणेरू नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर, बॅटरी ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेअर आणि ा्रेअ–रूक पॉवर स्प्रेअर.

अर्ज करण्याची वेळ : 1. आंबारू फवारणी (सुरुवातीची कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीड तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी पुन्हा करा) 2. बटाटारू पर्ण–अर्ज – कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा. आणि किडीच्या तीव्रतेनुसार 10–15 दिवसांच्या अंतराने 2–3 फवारण्या करा. माती भिजवणेरू पिकाच्या हंगामात एकदा माती भिजत असताना कीड दिसण्यापूर्वी रूट झोन लावा. 3. कापूस रू पहिली फवारणी 25–30 डीएएस किंवा कीड दिसण्याच्या वेळी करा आणि 2–3 फवारण्या 15 दिवसांच्या अंतराने किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार करा. 4. गहू रू किडीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा. 5. चहारू किडीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15–21 दिवसांच्या अंतराने 2–3 फवारण्या करा. 6. टोमॅटो रू किडीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 10–15 दिवसांच्या अंतराने 2–3 फवारण्या करा. 7. तांदूळरू एक फवारणी पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत 25–30 दिवस पी फवारणी तांदळाच्या सुरवातीच्या अवस्थेत स्टेम बोअरर, गॅल मिडज यांसारख्या किडींच्या नियंत्रणासाठी आणि दुसरी फवारणी पानांच्या बुटण्याच्या टप्प्यावर (50–55 DAT) नियंत्रणासाठी करा. उशीरा भात कीटक जसे की GLH) BPH) WBPH इ. 8. वांगी : किडीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 10–15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा. 9. भेंडी पहिली फवारणी किडीच्या सुरुवातीच्या काळात करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा. 10. मोहरी रू किडीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा. 11. मोसंबी रू कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15–21 दिवसांच्या अंतराने 2–3 फवारण्या करा.

खबरदारी : 1. अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थाचे डबे आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 3. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. 5. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. 6. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

प्रथमोपचार: 1. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. 3. डोळे दूषित असल्यास, 10 ते 15 मिनिटे भरपूर खारटध्त्वच्छ पाण्याने धुवा. 4. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

लक्षणे : उत्स्फूर्त हालचाल कमी होणे, टॉनिक आकुंचन, चजंवये होऊ शकते.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणेरू 1. पॅकेजेस आणि अतिरिक्त साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनरमधून वॉशिंग करून पाण्याचे प्रदूषण दूर केले पाहिजे. 2. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. 3. संकुल तोडले जावे आणि वस्तीपासून दूर गाडले जावे.

स्थोरेज अटी: 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू, विशेषतरू अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जायात किंवा प्रमाण आणि स्वरूपानुसार लॉक आणि चाविच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. बुरशीनाशक च्या. 2. बुरशीनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले, हवेशीर, चांगले प्रकाश आणि हवेशीर आणि बाष्पांपासून दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना :

थायामेथोक्सम स. घ	25.00% ब/ब
डिस्पर्सिंग एजंट : सोडियम लॉरील सल्फेट	3.75% ब/ब
प्लॅस्टिकायझर : ब्युटिलेटेड पॉलीविनाइल पायरोलिडिओन	1.25% ब/ब
वाहक डायटोमेशियस अर्थ	5.00% ब/ब
बाईंडर कॉर्न स्टार्च	ब्यु.एस.% ब/ब
एकूण	100.00ग/ब

खबरदारी : हया लेबल आणि हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुदल्याहि पीकांवर याचा प्रयोग करू नये प्रयोग करून झालेल्या रिकाम्या

क्रैडीबुल्

थियामेथाक्सम् 25% डब्ल्यू जी

(कीटनाशक)

थियामेथाक्सम् 25% डब्ल्यूजी ब्रॉड स्पेक्ट्रम् व्यवस्थित कीटनाशकवाणिदु त्वरित हॊट्टे मत्तु संपर्क क्रियेयन्नु हॊंदिदॆ मत्तु काण्ड कॊरॆयॊळ हायु. गाल् मिड्ज् लीफ् फोल्ड्रर्, ब्रौन् प्लाण्ट् हाप्पर्, (बि.पि.एच्), व्हैट् ब्याक्ड् प्लाण्ट् हाप्पर् (डब्ल्यूबि.पि.एच्), ग्रीन् लीफ् यन्नु नियंत्रिसुवल्लि इदर उपयोगि माडलागुत्तॆ. हाप्पर् (GLH), व्हैट्ट् आफ् राईस् हाप्पर्स् जस्सिड्स्, एफिड्स् मत्तु मामॆयल्लि हाप्पर्स् गोधुमियल्लि एफिड्स् भॆण्डियल्लि एफिड्स् जस्सिड्स् मोहरी मध्ये ऍफिड्सय टोमॅटो मध्ये पजमसिपमेय वांग्यातील पांढरी माशी, जस्सीडय चहामध्ये डासांचा ब ग आणि बटाट्यामध्ये ऍफिड्स, सायट्रसमध्ये सायला. एक किलो उत्पादनामध्ये 250 ग्रॅम थायामेथोक्सम सक्रिय घटक म्हणून समाविष्ट आहे (ग/ब)

शिफारसी:

बॆळॆ	कीटगळिगॆन्नु कॆडुवुदु मत्तु	अळवडॆ/ह. स.त.	संरक्षण (ग्रा.)	निवॆय कॊरॆयु मत्तु	ऎसॆयुवुदु मत्तु कॊय्दु दिनगळु
मॅङ्गोलोइ	हाप्पर्स्	25	100	1000	30
आलुगॆड्डॆ	गिडतॆगळु (मॆय्यन् 25 रसॆगळु)	50 (माण्ड्य कॆडदा)	(ऎलॆगळु 100 (ऎलॆगळु स्प्रॆ) 200(माण्ड्य कॆडदा)	500	77
ऱुळ्ळु	जाळ्ळॆ, गिडतॆगळुगळु	25	100	500-750	21
	बळ कॊरॆगळु	50	200	500-750	21
गोधि	गिडतॆगळुगळु	12.5	50	500	21
चॆ	सॊण्डॆ दॊडॆय (हॆलॊपॆल्टिस् थिव्होरा)	25	100	400-500	7
टॊमॅटो	व्हैट्ट् व्हैट्ट्	50	200	500	5
टॊमॅटोय	व्हैट्ट् व्हैट्ट्	100	400	500	5 (माण्ड्य कॆडदा)
भत्तद	काण्ड कॊरॆयुवन् मत्तु, गाल् मिड्ज्, लीफ् फोल्ड्रर्, कन्दु रस् हाप्पर् (BPH), बॆळ दॆय्दॆयुवन् गिड हाप्पर् (WBPH), ब्राउ ऎलॆ हाप्पर्, व्हैट्ट्	25	100	500-750	14
ऱुळ्ळु	सैल्लु	25	00	1000	20
बदनॆ बॆळॆ	सॊण्डॆगळु.	50	200	500	3
भॆण्डि	ज्स्ड्, ऎफ्ड्, व्हैट्ट् व्हैट्ट्	25	100	500-1000	5
साउॆ	गिडतॆगळु	12.5-25.0	50-100	500-1000	21

ब्ळॆकॆगॆ निर्देशगळु: ऎल्लरुदन अगत्यवॆनिसुव प्रमाणवन्नु ऎळॆयिरुवॆ मत्तु स्वल्प प्रमाणदल्लि निरॆयॊंदिगॆ चॆन्नागि मिश्रण माडि. सूकुवन्नद 'ऎदसिसुव यंत्रॊदॆयॊंदिगॆ बॆळॆगॆय संपूर्णव्व व्यॆप्तिगॆ सम्पूर्णव्व आदॊडॆयसदॊंदिगॆ निर्दिष्टपडिसद ऎळॆद प्रमाणद निरॆयन्नु सेरिसॆ. प.पी. सलकरणॆ: न्याप्सॉक् स्प्रॆयर्, फूट्ट् स्प्रॆयर्, कंप्रेशन् न्याप्सॉक् स्प्रॆयर्, कंप्रेशन् न्याप्सॉक् ब्याट्टरि स्प्रॆयर्, ब्याट्टरि ऱुळिदॆ पवर् स्प्रॆयर् मत्तु ASPEE-HTP पवर् स्प्रॆयर्.

अर्ज्जुळिसुव समय : 1. मामवु: हाप्पर्स् (अरॊळॆद कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदुवन्नु मॊदलु ऎळॆदाग्दॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळिगॆ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि ऒंदु अथवा ऎरडु सिंपरदॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु अवलंबिसि 10-15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. मण्णन्नु तॆगदुळॆयबेकुवुदु: कीटगळु ब्ळॆगॆयुवद मॊदलु बॆरॆयन बॆलयवन्नु बॆळॆ अवदियल्लि ऒम्बॆ मान्ड्रॆग ड्रॆंजॆ आगि अर्ज्जुयिसि. 3. भत्ती : मॊदलु स्प्रॆ 25-30 DAS अन्नु अथवा कीटगळु ब्ळॆगॆयॊंदुवन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 4. गोधि : ऎरळुळि कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदुवन् समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटॆ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 5. नुळॆ: ब्ळॆगॆयॊंदुवन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 6. टॊमॅटॊ : ऎरळुळि कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदु समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 10-15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 7. नुळॆ: ब्ळॆगॆयॊंदु समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15-21 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 8. भॆण्डि : ऎरळुळि कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदु समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि ऒंदु अथवा ऎरडु सिंपरदॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 10. सासिवॆ : ऎरळुळि कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदु समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि ऒंदु अथवा ऎरडु सिंपरदॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ. 11. सिट्रस् : ऎरळुळि कीटॆ ब्ळॆगॆयॊंदु समयदल्लि मॊदलु स्प्रॆयर्दॆगळॆयन्नु अर्ज्जुयिसि मत्तु कीटगळ तीव्रतॆयन्नु मट्टुवन्नु अवलंबिसि 15-21 दिनगळ मद्ध्यंतरदल्लि 2-3 स्प्रॆगळॆयन्नु पुनरावर्तिसॆ.

मुन्नॆच्चरॆगळु : 1. आहार पदार्थगळु, ग्रामॊ आहार पदार्थगळु मत्तु प्राणिगळ आहारदिंदा दूरवॆयि. 2. बायि, कॆण्णु मत्तु चर्म्मद सम्पर्कवन्नु तप्पुसि. 3. स्प्रॆ माडुवुदन्नु इन्नूलॆयसॆगॆ माडॊवुदन्नु तप्पुसि. गाळियि दिॆन्नॆयि निॆडॆयि. 4. निॆडॆयिदि नंतरद कॆलवॆयि बॆट्टि मत्तु दॆंडद भागगळन्नु चॆन्नागि कॊळॆयॆयु. 5. स्प्रॆ माडुवागि धूमपान माडबॆडि. कुडियबेडॆ. ऎन्नुबॆडि मत्तु ऎगियबेडॆ. 6. ऎल्लान मत्तु निंदॊडियवागि संरक्षण रक्षणात्मक उडुपुगळन्नु धरियि.

प्रतिविष: यावुदॆ निर्दिष्ट प्रतिविष तिळियलु, रोगगळिल्लदाद चिकित्सॆ.

प्रथमद चिकित्सॆ : 1. मुंगिदरॆ, गंगळिगॆ ऒंदुभागदल्लि कॆत्तगॆयॊडुवद मूलबॆ वान्तिगॆ प्रॆरणॆयऎत्तुवुदॆ. वान्तिगॆ स्पष्टवाद्दवरॆगॆ अदन्नु पुनरावर्तिसि. रोगगॆयु प्रज्ञाह्यीन स्थितियल्लिद्दरॆ वान्तिगॆ माडबेडि. 2. बट्टॆ मत्तु चर्म्मवु कॆलवॆयिद्दरॆगॆ, बट्टॆगळन्नु तॆगॆदुहाकि मत्तु कॆलवॆयि चर्म्मवन्नु साकबॆयु प्रमाणद साबुनदॊडु मत्तु निरॊंदिगॆ धॊळॆयॆयि. 3. कॆण्णुगळु कॆलवॆयिद्दरॆ, सुमारु 10 रिंदॆ 15 निमिषगळ कालद सरबद साकबॆयु ऎत्तुवुदु/धॊळु निरॊंदिगॆ झॆळ माडि. 4. ऎयिरदाद रोगगळन्नु जाक्रत नागॆगॆ सॆरॆयि.

बळ्ळगळु : स्यूडाऎविक चॆलनॆयॊन्नु कॆडियॆ माडुवुदु, टॊनिक् सॆळॆत, बटोऎनिसि सम्भविसबहुदु.

बळिद कण्टॆय्नॆर विलॆविरुवि : 1. प्याकॆजुगळु मत्तु ॠयुदादि वस्तुगळन्नु मत्तु यंत्रगळु मत्तु कण्टॆय्नॆरगळिंद बॆळॆयॆयुवुदु निरॊंदि माडलॆय्यदिंद हॊरॊडबहुदॆगळु. 2. बळिद प्याकॆजुगळन्नु अवुगळ मॆयबळॆगॆयन्नु बॆडॆयलु हॊरगॆ बिडबहुदु. 3. प्याकॆजुगळु मत्तु ऒडॆदु हाकबेडि मत्तु वास्तुगळिंदा हॊरबॆडॆयु.

शॆल्फ्रॆग परिस्थितिगळु: 1. कीटॆनाशकदन्नु हॊंदिदुवद पॊट्टॆयुगळन्नु प्रत्यॆक कॊठडिगळु अथवा अवरणदल्लि इतर वस्तुगळन्नु ऎरॆसुवदन्नु आहारद वस्तुगळन्नु संग्रहिसलु ब्ळॆसुव कॊठडिगळु अथवा अवरणगळिंद दूरदल्लि संग्रहिसबेकु अथवा प्रमाणद मत्तु स्वभावदन्नु अवलंबिसि बगॆ मत्तु किरॆ ऒडियुवि प्रत्यॆक ऒळ्ळॆगळिगॆ इडबेकु. 2. सिंण्ढ्रदानकॆद. 2. ण्ढ्रदानकॆदन्नु संग्रहिसलु ऊर्द्ध्वॆगळदल्लि कॊठडिगळु अथवा अवरणगळु चॆन्नागि निर्माणसुव्वुदुदॆबेकु, गाळि, चॆन्नागि बॆळॆकु मत्तु गाळि मत्तु ऒळगॆंद मालॆगळन्नु कॆट्टगॆलु साकबॆयु ऒयाबमवन्नु हॊंदिरबेकु.

रासायनिक संयोजनॆ:

थियामॆथाक्सम् स घ.	25.00% ऎ/ऎ
डिस्पर्सिंग् ऎजॆंट् : सोडियम् लारील् सल्फॆट्	3.75% ऎ/ऎ
प्ल्यॆस्टिकायझर् : ब्युटिलेटेड् पॉलीविनाइल् पायरोलिडिओन्	1.25% ऎ/ऎ
वाहक् डायटोमॆशियस् अर्थ्	5.00% ऎ/ऎ
बॉइंडर् कॉर्न् स्टार्च्	ऎ.ऎस्.% ऎ/ऎ
ऒट्टु	100.00 % ऎ/ऎ

ऎच्चॆरिकॆ: ईय लॆबॆल्/कॆरदपत्रदल्लि निर्दिष्टपडिसद हॊरतुपडॆ' बॆरॆय बॆगॆगळल्लि ब्ळॆसबारदद

क்ரபெொள்

தியாமதொக்சம் 25% டயூபளுடீ ஜி

(பூச்சிக்கொல்லி)

தியாமதெோக்சம் 25% WG என்பது வயிறு மற்றும் தொடர்பு யெெல்பாட்பினகை கொண்ட ஒரு பரந்த நிறமாலை அமைப்பு பூச்சிக்கொல்லியாகும். மலேம் தண்ட் துளைப்பான், பித்தப்பை, இலைகை கொப்பறுதை, பழுப்புத் தாவரத் தொப்பி, (BPH), வளெள்ள மாதுகத் தாவரத் தொப்பி (WBPH), பச்சை இலை ஆகியவற்றுக்கை கட்டுப்படுத்தக் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஹாப்பர் (GLH), திரிப்ஸ் ஆஃப் ராஸ்; பருத்தியில் ஜாசிட்ஸ், அஃபிட்ஸ் மற்றும் வளெள்ள ாக்கள்; மாம்பழத்தில் ஹாப்பர்ஸ்; கொதுமையில் அஃபிட்ஸ்; ஒகுராவில் அஃபிட்ஸ், ஜாசிட்ஸ்: கடுக்காய் உள்ள அசுவினி, தக்காளியில் வளெள்ள ாக்கள்; கத்திரிக்காயில் வளெள்ள ாக்கள், ஜாசிட்ஸ்; தநேீரில் கொசுப் பூச்சி மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் அஃபிட்ஸ், சிட்ரஸில் சலைல். இது ஒரு கிலோ உற்பத்தியில் (w/w) செயலில் உள்ள பொருளாக 250 கிராம் தியாமதெோக்சம் கொண்டுளளது.

பரிந்துரை:அதிகரிக்கிறது.

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பெரும் பெயர்கள்	அளவு / ஹெக்டேர் A.I.	குவாத்தல் (லி)	தண்ணீரில் நெற்பயு காலம் (லி)	காத்திருக்கும்
ராஜமாஸ்கிழங்கு*	அஃபிட்ஸ் பெரிஃபெரிப் தக்கெிபோ	25 (ராஜமாஸ் 50 மணல் 200,மண் தணமுகம் தணமுகம்)	25 (ராஜமாஸ்)	500 (ராஜமாஸ்) 750 (ராஜமாஸ்) 500 75	
பாதுகி	ஜாஸிட்ஸ் அஃபிட்ஸ்	25	100	500-750	21
கம்பு/சுடை	வளெள்ள ாக்கள்	50	50	500	21
தரமெள	கம்பச் பிழுவை ஹுழுவெெபெெப்பெ) தீவிரெ	25	100	400-500	7
தக்காளி	வளெள்ள ாக்கள்	50	200	500	5
தக்காளி	வளெள்ள ாக்கள்	100	400	500	5 (மண்ணை தணமுகத்தல்)
நல்ல தக்கட	தாவரப்பேன் (ஹெமிப்டெரா, இலை சுரெப்பாளுடன், பழுப்பு நிற சமெப் ஹுழுபபி 1874)	25	100	500-750	14
கூடுதல்	வளெள்ள ாக்கள் (ஹுழுபபி ஹுழுபபி (1872), பச்சை இலை தணட் தநிப்ஸ் சுவாங்கா	25	00	1000	20
சிட்ரஸ்	வளெள்ள ாக்கள்.	50	200	500	3
பிஞ்சி	அஃபிட்	25	100	500-	5
ஒர்கா ஹாரிட்	திரிப்ஸ், வளெள்ள ாக்கள் 1908 தணட்ஸி			1000	
கடுகு		12.5-25.0	50-100	500-	21

பயன்படுத்தவதற்கான திசை: உற்பத்தியின் தவேயான அளவை அளந்து, அதை ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்கு கலக்கவும். தகுந்த தளெிப்பான் மூலம் பயிரின் மறெத்துப் பரப்பிறுக் மழுமையான கிளாச்சியுடன் காறிபிட்ட அளவு தண்ணீரசை சரேக்கவும். பி.பி. உபகரணங்கள்: நாப்சாக் தளெிப்பான், கால் தளெிப்பான். சாறாக்க நாப்சாக் தளெிப்பான், சாறாக்க நாப்சாக் பட்டேரி தளெிப்பான், பட்டேரி மூலம் இயக்கப்படும் பவர் ஸ்ப்ரயேர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரயேர்.

விண்ணப்பிக்கும் நரேம் : 1. மாம்பழம்: ஹாப்பர்ஸ் (குடெக்க பூச்சி தரேற்றத்தின் பரேதா மூதல தளெிக்கவும் மற்றும் பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவளெியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தளெிப்பகள மீண்டும் செய்யவும். 2. உருளைக்கிழங்கு: இலைபயன்பாடு - ஆரம்ப பூச்சி தரேற்றத்தின் பரேதா மூதல தளெிக்கவும். பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 10-15 நாட்கள் இடைவளெியில் 2-3 தளெிப்பகளை மீண்டும் செய்யவும். மண் நனவைா. பயிர் பருவத்தில் ஒரு மாறை, பூச்சிகள் தரேன்றவதற்கு மான், வரே மண்டலத்தை மண்ணில் நனைக்க வண்டும். 3. பருத்தி: மூதல தளெிப்பா 25-30 DAS அல்லது பூச்சி தரேன்றம் நரேதில் பயன்படுத்தவும் மற்றும் பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவளெியில் 2-3 தளெிப்பகளை மீண்டும் செய்யவும். 4. கரேதாமை: பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவளெியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தளெிப்பகளை மீண்டும் செய்யவும். 5. தபேேமை: பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15-21 நாட்கள் இடைவளெியில் 2-3 ஸப்ரேகளை மீண்டும் பூச்சிகள் தரேன்றும்பரேது மூதல தளெிக்கவும். 6. தக்காளி : பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 10-15 நாட்கள் இடைவளெியில் 2-3 தளெிப்பகளை மீண்டும் பூச்சிகள் தரேன்றும்பரேது மூதல தளெிக்கவும். 7. நுலெ: தண்டீத் துளைப்பான், பித்தப்பை நடீபகல் பரேன்று ஆரும் நடுப்பயிர்களைக் கட்டுப்படுத்த பயிரின் ஆரம்ப கட்டத்தில் 25-30 DAT என்ற அளவில் ஒர தளெிக்கவும். மற்றொன்று பூக்கும் இலை நிலையில் (@ 50-55 DAT) தளெிக்கவும். தாமதமான நலெ பூச்சிகளான GLH, BPH, WBPH பரேன்றவன 8. **கத்தரிக்காய் :** பூச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் மூதல தளெிப்பை பயன்படுத்தவுங்கள் மற்றும் பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 10-15 நாட்கள் இடைவளெியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தளெிப்பகளை மீண்டும் சயெய்யவும். 9. வண்டைக்காய் பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவளெியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தளெிப்பகளை மீண்டும் பூச்சிகள் தரேன்றும்பரேது மூதல தளெிக்கவும். 10. கடீக : பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவளெியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தளெிப்பகளை மீண்டும் பூச்சிகள் தரேன்றும்பரேது மூதல தளெிக்கவும். 11. சிட்ரஸ்: பூச்சியின் தீவிரத்தின் அளவைப் பொறுத்து 15-21 நாட்கள் இடைவளெியில் 2-3 தளெிப்பகளை 15-21 நாட்கள் இடைவளெியில் பூச்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் மூதல தளெிக்கவும்.

மான்ஸெச்ரிக்கைகள்: 1. உணவைப் பொரட்கள், வறெற்ற உணவைப் பொரட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்கைகளின் உணவை ஆகியவற்றிலிரேந்து விலக்கி வக்கைவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தரேலுடன் தொடெர்பை தவிர்க்கவும். 3. ஸப்ரே மிஸட்டுடன் உள்ளிழுப்பதை தவிர்க்கவும். காற்றும் வீசும் திசையில் தளெிக்கவும். 4. தளெித்தலின் அசுத்தமான ஆடகைள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு தவகைைவும். 5. தளெிக்கையில் பரேதா பாகபெிக்காதீர்கள், கூபெிக்காதீர்கள், சாப்பிடாங்கள் மற்றும் மலெல்லாதீர்கள். 6. கலந்து தளெிக்கையில் பரேதா மழு பாதுகாப்பு ஆடகைளை அணியவும்.

மாற்றம் மரந்து: காறிபிட்ட மாற்றம் மரந்து எதுவும் தரியிய்லல்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

மூதலுதவி: 1. விழுங்கினனால். தொண்டையின் பின்பகுதியில் லெச்சப்படுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டீட. வாந்தி தளெிவாக்க வரை அதன் மீண்டும் செய்யவைாம். நரேயாளி சுயநினவைின்றி இரேந்தால் வாந்தி எடீக்க வண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தரேல் மாசுபட்டிரேந்தால், தண்ணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தரேலை ஏராளமான சபோப் மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிரேந்தால், 10 மூதல 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நரேயாளியை மூதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

அறிகுறிகள் : தளர்ச்சியான இயக்கம் காறதைல், டானிக் வலிப்பு, ptosis ஏற்படலாம்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்தல் : 1. பொதிகள் மற்றும் உபரி பொரட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களில் இரேந்து கழுவதல் ஆகியவை நீர் மாசுபாட்டிலிரேந்து அகற்றப்பட வண்டீம். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகப்பர்களை மீண்டீம் பயன்படுத்தவுதை தடுக்க வளெியே விடக்கூடாது. 3. தொகப்பர் உடைக்கப்பட்டீ, கூபெிரியப்பில் இரேந்து பாதுகைக்கப்பட வண்டீம்.

சமபெிப்க நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள், மற்ற