

## Diafenthiuron 50% WP (Systemic and Contact Insecticide)

Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It paralyzes the pest which remain immobile on the crop until death in about 3-4 days. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in Cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, mites in chilli, whitefly in brinjal, thrips and capsule borer in cardamom and mites in citrus crops. It contains 500 g Diafenthiuron as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

### Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (g)	Formulation (g)		
Cardamom	Thrips, Capsule borer	400	800	500-1000	21 days
Cotton	Whiteflies, Aphids	300	600		
Cabbage	Thrips, Jassids Diamond Back Moth (Plutella xylostella)	300	600	500-750	7 days
Brinjal	Whitefly	300	600	500-750	3 days
Chilli	Mites	300	600	500-750	3 days

**Direction of Use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable spray.

**Time of Application :** Cotton : Apply first spray during initial appearance of pests and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on pest intensity.

**Cabbage :** First spray at 30 DAT or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on pest intensity.

**Chilli :** First spray at 30 DAT or at the time of first pest appearance and repeat two or four sprays at 14-21 days interval depending on pest intensity.

**Brinjal :** First spray at the time of pest appearance and repeat two sprays at 14-21 days interval depending on pest intensity.

**Cardamom :** First spray at the time of pest appearance and repeat two sprays at 21-30 days interval depending on pest intensity.

**Precaution:** 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. 4. Also avoid inhalation and contact with eyes. 5. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. 6. Do not blow nozzles with mouth. 7. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 8. Do not store unused spray solution. 9. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 10. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 11. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers contaminated buckets etc. in them. 12. Do not spray when bees are active. 13. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

**Symptoms of Poisoning:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation.

**First Aid:** 1. Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. 2. In case of suspected poisoning : Immediately call a physician. 3. In case of skin contact : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. 4. In case of eye contact : Rinse eyes with clean water for several minutes. 5. In case of ingestion : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water.

**NOTE :** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

**Phytotoxicity :** The product is non phytotoxic when used as per field recommendation.

**Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

**Disposal of used Container:** 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner to prevent environment pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from inhabitation.

**Storage Condition:** 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-ill and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

**Chemical Composition:**

Diafenthiuron a.i	50.00% w/w
Wetting Agent-Ethoxyated fatty alcohol	12.00% w/w
Dispersing Agent-Condensed alkyl naphthalene sulphonate, sodium salt	15.00% w/w
Carrier-Precipitated Silica	Q.S.%
Total	100.000% w/w

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".**

## డయాఫెంథియూరాన్ 50% డబ్బుస్

అంతర్జాతీయ మరయు స్పర్శ చర్యలుగల కీటకనాశిని

డయాఫెంథియూరాన్ 50% డబ్బుస్ విస్తృత వ్యాప్తి చర్యలకు కీటకనాశిని. ఇది కీటకాలకు పక్షపాతం కల్పిస్తుంది. అది ఆకులపై కడలకేక 3-4 రోజుల్లో నెమ్మదిగా చనిపోతుంది. ప్రత్యేక పంటల ఆశింపు తెల్లదోమలు, పేనుబంక, తామరపురుగులు, పచ్చదోమలు మరియు క్యాట్టెజ్ తోటలను ఆశింపు ప్రైమరీ డిఫెంథియూరాన్, మరల తోటలలోని నల్ల, పంక తోటలలోని తెల్లదోమ, యాలలం తోటలను ఆశింపు తామరపురుగులు, కాయతొట్టుపురుగులు, వంక కీటకాలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. ఒక కి.గ్రా. ఉత్పాదనలో 500 గ్రా. డయాఫెంథియూరాన్ నిల్వేయ వచ్చుతూ ఉంటుంది.

### నిర్దేశములు:

పంట	కీటకాల పేర్లు/పేర్లు	మోతాదు/మీ.		వివిధ పంటలకు సుదీర్ఘత
		స.ప.	సా.కీ/కరణ	
యాలలం	తామరపురుగులు	400	800	1000

యాలలం తామరపురుగులు  
 పంట  
 తెల్లదోమలు, పేనుబంక  
 300  
 600  
 500-1000  
 21 రోజులు

క్యాట్టెజ్  
 ప్రైమరీ డిఫెంథియూరాన్  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

మరల తోటలలోని తెల్లదోమ  
 300  
 600  
 500-750  
 3 రోజులు

పంక తోటలలోని తెల్లదోమ  
 300  
 600  
 500-750  
 3 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

## డయాఫెంథియూరాన్ 50% ప్రతిశత డబ్బుస్

(అంతర్జాతీయ మరయు స్పర్శ చర్యలుగల కీటకనాశిని)

డయాఫెంథియూరాన్ 50% ప్రతిశత డబ్బుస్ ఏక బహుళయోగి కీటకనాశకం! ఇది కీటకాలకు లక్ష్యాగ్రస్తం చేస్తుంది. ఇది ఆకులపై కడలకేక 3-4 రోజుల్లో నెమ్మదిగా చనిపోతుంది. ప్రత్యేక పంటల ఆశింపు తెల్లదోమలు, పేనుబంక, తామరపురుగులు, పచ్చదోమలు మరియు క్యాట్టెజ్ తోటలను ఆశింపు ప్రైమరీ డిఫెంథియూరాన్, మరల తోటలలోని నల్ల, పంక తోటలలోని తెల్లదోమ, యాలలం తోటలను ఆశింపు తామరపురుగులు, కాయతొట్టుపురుగులు, వంక కీటకాలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. ఒక కి.గ్రా. ఉత్పాదనలో 500 గ్రా. డయాఫెంథియూరాన్ నిల్వేయ వచ్చుతూ ఉంటుంది.

### ఉపయోగం

కామ	కీటకాల పేర్లు/పేర్లు	మోతాదు/మీ.		వివిధ పంటలకు సుదీర్ఘత
		స.ప.	సా.కీ/కరణ	
యాలలం	తామరపురుగులు	400	800	1000

యాలలం తామరపురుగులు  
 పంట  
 తెల్లదోమలు, పేనుబంక  
 300  
 600  
 500-1000  
 21 రోజులు

క్యాట్టెజ్  
 ప్రైమరీ డిఫెంథియూరాన్  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

మరల తోటలలోని తెల్లదోమ  
 300  
 600  
 500-750  
 3 రోజులు

పంక తోటలలోని తెల్లదోమ  
 300  
 600  
 500-750  
 3 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు

యాలలం తామరపురుగులు  
 300  
 600  
 500-750  
 7 రోజులు



## DIGNITY Diafenthiuron 50% WP (Systemic and Contact Insecticide)

డిజినిటీ  
డయాఫెంథియూరాన్ 50% డబ్బుస్  
(అంతర్జాతీయ మరయు స్పర్శ చర్యలు గల కీటకనాశిని)

## డిజినిటీ

## డయాఫెంథియూరాన్ 50% ప్రతిశత డబ్బుస్ (అంతర్జాతీయ మరయు స్పర్శ చర్యలు గల కీటకనాశిని)

డిజినిటీ  
డయాఫెంథియూరాన్ 50% డబ్బుస్  
(అంతర్జాతీయ మరయు స్పర్శ చర్యలు గల కీటకనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

## INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

వచ్చినా దూరముగా ఉంచండి.  
వచ్చినా దూరముగా ఉంచండి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుముందుకు ముందు లేదా తర్వాత మరయు స్పర్శ చర్యలు చేయవలసింది.

ఇస్టేమల కరనే సే పులై  
సారి పూర్తి తరహా పులై.

Manufactured & Marketed by  
**AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD**

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),  
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222  
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,  
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,  
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMMM/PM/2018/5281  
Reg. No.: CIR-136102/2016-Diafenthiuron (WP) (354)-268

FOR AGRICULTURAL USE  
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



వేటాయింపు : ఇది తేలిక నుండి తేలికగా ఉంటుంది. ఇది కీటకాలకు లక్ష్యాగ్రస్తం చేస్తుంది. ఇది ఆకులపై కడలకేక 3-4 రోజుల్లో నెమ్మదిగా చనిపోతుంది. ప్రత్యేక పంటల ఆశింపు తెల్లదోమలు, పేనుబంక, తామరపురుగులు, పచ్చదోమలు మరియు క్యాట్టెజ్ తోటలను ఆశింపు ప్రైమరీ డిఫెంథియూరాన్, మరల తోటలలోని నల్ల, పంక తోటలలోని తెల్లదోమ, యాలలం తోటలను ఆశింపు తామరపురుగులు, కాయతొట్టుపురుగులు, వంక కీటకాలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. ఒక కి.గ్రా. ఉత్పాదనలో 500 గ్రా. డయాఫెంథియూరాన్ నిల్వేయ వచ్చుతూ ఉంటుంది.

