Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతచేరిన కరపత్రమును చదవండి.

Fipronil 4% w/w + Thiamethoxam 4% w/w SC

(Insecticide)

Direction Of Use : Please read enclosed leaflet before use. Direction of use :- It should be applied of foliar spray for the control of brown plant hopper, green leaf hopper and white backed plant hopper as soon as they appear on the Rice crop. Dosages : 1100 ml/h diluted in 500 liter of water Re-enty period : Do not allow entdy into treated area untill spray has dried. Pre-harvest interval : 45 days. **Precautions :** Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body parts of the body after application. Avoid inhalation. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application. **Antidote :** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid :** Remove the person from the contaminated environment. In case of skin contact: Wash material off the skin in flowing water or shower with soap. If irritation persists consult a physician immediately. Eye contact: Immediately flush with sufficient amount of water for atleast 15 minutes. Inhalation: Remove the victim to fresh air and keep him warm and quiet. get a medical attention immediately. If not breathing, clear the airways and give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Ingestion: Do not induce vomiting unless told to by doctor. Do not give anything to unconscious person. Have person sip a glass of water if able to swallow. Get medical attention immediately. **Symptoms :** It may causes irritability, lethargy and muscles tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur. Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur. **Recommendations :** Fipronil 4% + Thiamethoxam 4% sc is a unique combination of a new generation phenyl pyazole compound, Fipronil and a nconicotinoid, thiamethoxam. The combination product formulation presents excellent synergism through contact, systemic and residual activity on the target pests. Fipronil which remains on the surfaced of the plants. Thiamethoxam is translocated in plants and provided long term inherent protection against target insects-pest. It is a safe to use formulation. Warning :- 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label and leaflet. 2. No to be used for post harvest application. 3. Do not spray during active bee for aging period of the day. 4. Destroy container after use as directed on leaflet . 5. More toxic to fish, hence harmful to aquatic organism therefore, not be used near aquaculture and rice-fish farming. Do not contaminate lakes, rivers, ponds and streams. **Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".**

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । दवा की मात्रा :- 1100 मि. ली./हेक्टर, 500 लीटर पानी में घोल कर पुनः प्रवेश का समय छिड़काव क्षेत्र में तब तक न जाए जब तक स्प्रे सुख न जाये अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल 45 दिन सावधानियां मिश्रण और छिड़काव करते समय शरीर पर ढकने वाले कपड़े पहन लें । छिड़काव के बाद दूषित दूषित कपड़ों को और शरीर को अच्छी तरह से धो लें इस कीटनाशक को छिड़कते व मिलाते समय सांस द्वारा अंदर न ले जायें छिड़काव के समय धुमपान करना, खाना-पीना और तम्बाकू चबाना इत्यादि का सेवन न करें इस्तेमाल का तरीका :- इसका उपयोग कूदने वाले भूरा, हरा और सफेद पिति वाले किट जैसे ही धान की फसल पर दिखाई दे की रोकथाम के लिए फोलिएर स्प्रे द्वारा इसका उपयोग किया जाता है. **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ :** छिड़काव व मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर ढकने वाले वस्त्र पहन ले छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो व शरीर अच्छी तरह से धो ले। इस कीटनाशक को छिड़कते व मिलाते समय सांस द्वारा अन्दर लेने व त्वचा से बचें। छिड़काव करते समय खाना, पीना, धूमपान करना व तम्बाकू चबाना नही करें। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नही है, लक्षणो के अनुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** रोगी को तुरन्त दूषित स्थान से दूर हटा दें। त्वचाः त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातार पानी व पव्वारे से साबुन के साथ धो ले। अगर खुजलाहट, दर्द या त्वचा पर लाली में वृद्धी हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। आँखः आँख को तुरंत पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम 15 मिनट तक धो लें। सूँघनाः सूँघने पर रोगी को खुली हवा में ले जाये व उसे गरम व शान्त स्थान पर रखे। अगर श्वसन नही चल रही हो, या सांस लेने में तकलीफ हो तो कृत्रिम श्वसन क्रिया करें ऐर आक्सीजन दें। सांस लेने में तकली हो तो डॉक्टरी सहायता लें। निगलनाः बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी न करायें। अचेत रोगी को कुछ न दें। मुँह को पानी से धो दें, अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे निगलास से थोडा सा पानी पिलाये, तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। **लक्षणः** मुख्यतः चिड़चिड़ापन, उदासी, मांस-पेशियो में ऐठन। अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में दौरे पड़ने की सम्भावनाये हो सकती हैं। विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिगीं जैसे झटके प्टोसिस हो सकते हैं। **उपयोगः** फिप्रोनिल 4% + थायोमैथोग्जाम 4% विस्त्रक्त सासकन्द्रिकरण एक नये जमाने के योगिक है जिसमे फिनायलपायराजोव युक्त फिपरोनिल व निओनिकोटिनोड्ड युक्त थायोमैथोग्जाम का मिश्रण है। सूत्र का मिश्रण एक उच्च किस्म के उत्पाद का निर्माण करते है जो कि स्पर्शीय, अंतर्प्रवाही व अवशिष्ट क्रिया से निर्धारित कीटो पर असर करता है। फिप्रोनिल पौधे के ऊपर रहकर तथा थायोमैथोग्जाम कीटनाशक पौधो पर एक जगह से दूर सारी जगह लम्बे समय तक कीटो से सुरक्षा प्रदान करते है। यह एक सुरक्षित मिश्रण है। **सावधानी :** १. पत्रिका व लेवल में दिए हुए फसलों व कीटो के अलावा अन्य के लिए उपयोगित नहीं है २. फसल पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें ३. मधुमखी के सक्रीय मधुपान करने के समय में इसका छिड़काव न करें ४. पर्पी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें. ५. मछलियों के अत्यंत जहरीला है इसलिए जल जीवों की लिए हानिकारक है अतः मत्स्यपालन और धान की खेती के नजदीक इसका इस्तेमाल न करें झरनों, नदियों, तालाब व नहर में न मिलने दें **निर्माता :** अंगेजी मे लिखे अनुसार.

आयात कर्ता का उत्पादन परिसर : अंग्रेजी मे लिखे अनुसार.

Amish CROP SCIENCES

Innovation starts with Amish

FIPROPA

Fipronil 4 % + Thiamethoxam 4% w/w SC

Insecticide



Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Content : 500 ml

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबर: १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायते-कीडकैं के लिए ब्यटरम केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेलः customercare@amishcropsciences.com

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखें
खतरा
அபாயம்
ఆపాయ అపాయము
DANGER
పిల్లలకు అందకుండా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಬರದಂತೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE
For Agricultural Use Only

Regn. No / रजि नं. ए. सं. : **CIR-167666/2019 Fipronil + Thiamethoxam (SC) (408)-2956**

Mfg.Lic.No./ : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**

उत्पादक लायसेंस. नं.
మాన్యుఫాక్చరింగ్ లైసెన్సు సం.

Net Content : **500 ml**

उतशुद्ध सामग्री निवर प्रमाण :

Batch No :
बैच नं. బ్యాచ్ నెం

Mfg.Date :

उत्पादन तिथि.తయారీ తేదీ.

Exp.Date :

निष्प्रभावी होने का तिथि:
గడువు తేదీ:

Max. Retail Price ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य
గరిష్ట అమ్మకపు ధర
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)
(అన్ని రకాల పన్నులు కలుపుకొని)

Unit Sale Price ₹ :

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

For Agricultural Use Only