FLAREUP

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC
(Systemic Fungicide)

Picoxystrobin a.i. 6.78 % w/w. Tricyclazole a.i. 20.33 % w/w. Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer 1.40 % w/w. Mixture of ethyleneoxide / propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol 3.20 % w/w. Poly siloxane emulsion 0.20 % w/w. Propylene glycol 6.50 % w/w. Xantham Gum 0.30 % w/w. 1,2-benzisothiazolin 5.27 pt

Direction Of Use : Please read enclosed leaflet before use.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhalation of the fungicide spray mist. 3. Wear full protective clothing such as apron, boots or coveralls as appropriate. 4. Wear protective eye wear. 5. Wash contaminated clothes and body parts with soap and plenty of water. 6. Do not eat, drink, smoke while applying. 7. The product is toxic to aquatic organisms hence should not be used water bodies aquaculture/ pisciculture area.

Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically.

First Aid : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger mails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and wash separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist.

Symptoms : Mild eye irritant. Acute ingestion may lead to lethargy, salivation and convulsion. Headache, giddiness, nausea and vomiting tremors & laboned breathing may occur.

Recommendations : Picoxystrobin 6.78% w/w +tricyclazole 20.33% w/w sc is a broad spectrum fungicide with systemic activity. It is recommended to be used against fungal diseases of paddy

Chemical Composition :

Picoxystrobin a.i.	6.78 % w/w
Tricyclazole a.i.	20.33 % w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	1.40 % w/w
Mixture of ethyleneoxide/propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol	3.20 % w/w
Poly siloxane emulsion	0.20 % w/w
Propylene glycol	6.50 % w/w
Xantham Gum	0.30 % w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.20 % w/w
Water	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

ఫ్లేర్‌అప్

పికోక్సిస్ట్రోబిన్ 6.78% w/w +ట్రైసైక్లాజోల్ 20.33% w/w SC
(దైహిక శిలీంద్ర సంహారిణి)

పికోక్సిస్ట్రోబిన్ a.i. 6.78% w/w. ట్రైసైక్లాజోల్ a.i. 20.33% w/w. మిథైల్ మెథాక్రిలేట్ ఇథాక్సిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ 1.40% w/w. ఇథిలీన్‌క్సైడ్/ప్రొపైలిన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్ మరియు ఇథాక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్ 3.20% w/w మిశ్రమం. పాలీ సిలోక్సేన్ ఎమల్షన్ 0.20% w/w. 6. ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ 6.50% w/w. గ్వాంతం గమ్ 0.30% w/w. 8. 1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్ 0.20% w/w. 9. నీరు Q.S. % మొత్తం 100% w/w.

ఉపయోగం యొక్క దిశ: దయచేసి ఉపయోగించే ముందు పరివేష్టిత కరపత్రాన్ని చదవండి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి మరియు శిలీంద్ర సంహారిణి స్ప్రే పొగమంచు పీల్చడం. 3. తగిన విధంగా ఆప్రాన్, బూట్లు లేదా కవరాల్స్ వంటి పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. 4. రక్షిత కంటి దుస్తులు ధరించండి. 5. కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి. 6. దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు తినకూడదు, త్రాగకూడదు, పొగ త్రాగకూడదు. 7. ఉత్పత్తి జలచరాలకు విషపూరితమైనది కాబట్టి నీటి వనరులను ఆక్వాకల్చర్/ పిసికల్చర్ ప్రాంతంలో ఉపయోగించకూడదు

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు, రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ప్రథమ చికిత్స: తీసుకున్నట్లయితే: వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడుక్కోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి.అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. కావలసినంత వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దుహాజరైన వైద్యుడు పిల్చినట్లయితే: రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవటానికి లేదా కష్టంతో శ్వాస తీసుకోవడం, కృత్రిమ శ్వాసను అందించడం, ప్రాధాన్యంగా నోటితో నోటితో శ్వాస తీసుకోవడం. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. చర్మం సంపర్కం విషయంలో: సబ్బు మరియు వెంట్రుకలు మరియు పుష్కలంగా నీటితో సహా శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాలను బాగా కడగాలి.

రసాయన కూర్పు:

పికోక్సిస్ట్రోబిన్ a.i.	6.78% w/w.
ట్రైసైక్లాజోల్ a.i.	20.33% w/w.
మిథైల్ మెథాక్రిలేట్ ఇథాక్సిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్	1.40% w/w.
ఇథిలీన్‌క్సైడ్/ప్రొపైలిన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్ మరియు ఇథాక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్ మిశ్రమం.	3.20% w/w
పాలీ సిలోక్సేన్ ఎమల్షన్	0.20% w/w.
ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్	6.50% w/w.
గ్వాంతం గమ్	0.30% w/w.
1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	0.20% w/w.
నీరు	Q.S. %
	మొత్తం 100% w/w.

జాగ్రత్త: ఈ లేబుల్ / లీఫ్ లెట్ లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.

ଫ୍ଲୟାରଅପ୍

ପିକୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୬.୭୮% + ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ୍ ୨୦.୩୩% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍‌ସି
(ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହୀ କବକନାଶକ)

ପିକୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୬.୭୮% ଓଜନ/ଓଜନ. ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ୍ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୨୦.୩୩%. ମିଥାଇଲ ମିଥାକ୍ରାଇଲେଟ ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ ଗ୍ରାଫ୍ଟ କୋପଲିମର ୧.୪୦% ଓ/ଓ. ଏଥିଲିନ ଅକ୍ସାଇଡ/ପ୍ରୋପିଲିନ ଅକ୍ସାଇଡ ବ୍ଲକ କୋପଲିମର ଓ ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ ଆଲକୋହଲର ମିଶ୍ରଣ ୩.୨୦% ଓ/ଓ. ପଲି ସିଲୋକ୍ସେନ୍ ଇମୁଲସନ ୦.୨୦% ଓ/ଓ. ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ୬.୫୦% ଓ/ଓ ୭. ଜାନଥମ ଗମ୍ ୦.୩୦% ଓ/ଓ. ୧,୨-ବେଞ୍ଜିସୋଥିଆଜୋଲିନ ୩-୧ ୦.୨୦% ଓ/ଓ. ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ%। **ମୋଟ** ୧୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ସଂଲଗ୍ନ ଲିଫଲେଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା: ୧. ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । **୨.** ମୁହଁ, ଆଖି ଓ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କବକନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ ବାଷ୍ପକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । **୩.** ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ ମାସ୍କ, ଏପ୍ରୋନ, ବୁଟ୍, ଲମ୍ବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । **୪.** ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । **୫.** କବକନାଶକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଦୂଷିତ କପଡ଼ା ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣିରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ । **୬.** ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା, ପିଇବା କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରିବା ମନା । **୭.** ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୋଖରୀ, ମାଛଚାଷ ହେଉଥିବା ଜାଗା କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପ୍ରତିକାର (ବିଷନାଶକ): ଏହାର କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ବିଷନାଶକ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ୧. ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ: ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଓ ସଜାଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଭଲଭାବେ ପାଣିରେ ସଫା କରି ୧ ବା ୨ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ଥିଲେ, ପାଟିବାଟେ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତର ନ କହିବା ଯାଏ ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । **୨. ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ:** ଶୁଦ୍ଧବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ରୋଗୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଇ ପାରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । **୩. ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ:** ଶରୀରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ବାଳ ଓ ନଖ ସହିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ଚର୍ମ ଜାଲିପଡ଼ିଲେ, କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଲେ ; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ସାବୁନରେ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ । **୪. ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ:** ଅତିକମ୍‌ରେ ୧୫ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆଖିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନାଲି ପଡ଼ିବା, ଜ୍ୱଳନ ବା ଆଲୁଅକୁ ବାହିଁ ନପାରୁଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଲକ୍ଷଣ: ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ, ଖାଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତି, ଲାଳ ବହିବା ଓ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, କମ୍ପ ଆସିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ଇଥୋକ୍ସାକାର୍ବ ସକ୍ରିୟ	୧୪.୫୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ଉପାଦାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପାଦାନ	୬.୦୦% ଓ/ଓ
ଆମୋରଫସ୍ ସିଲିକନ୍ ଡାଇକ୍ସାଇଡ୍	୭.୦୦% ଓ/ଓ
ପଲିଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ପଲିଆରାଇଲ ଫିନଲ	୯.୦୦% ଓ/ଓ
ପଲିଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ପଲିଆରାଇଲ ଫିନଲ ଫସଫେଟ	୬.୦୦% ଓ/ଓ
ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ମିଥାଇଲ୍ ସୋୟେଟ୍	୫୭.୫୦% ଓ/ଓ
	ମୋଟ:୧୦୦.୦୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ସାବଧାନ : ଏହି ଲେବଲ ବା ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ଏହା କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Amish®
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

FLAREUP

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC
(Systemic Fungicide)

ఫ్లేర్‌అప్

పికోక్సిస్ట్రోబిన్ 6.78% w/w +ట్రైసైక్లాజోల్ 20.33% w/w SC
(దైహిక శిలీంద్ర సంహారిణి)

फ्लेयरअप

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + ट्राइसाइक्लोजोल 20.33% भा/भा एस.सी
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್

ಪಿಕಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೬.೭೮% w/w +ಟೈಸೈಕ್ಲಝೋಲ್ 20.33% w/w ಎಸ್ ಸಿ
(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Read enclosed leaflet before use.
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂದು ಜತೆಪರಿಸಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतों-पीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेलः customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No. : CIR-247957/2023-Picoxystrobin+Tricyclazole (SC) (442)-50

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

फ्लेयरअप

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + ट्राइसाइक्लोजोल 20.33% भा/भा एस.सी
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

पिकोक्सीस्ट्रोबिन स.त. 6.78 % भा/भा. ट्राइसाइक्लोज़ोल स.त. 20.33 % भा/भा. मिथाइल मिथाक्राइलेट ईथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट को-पॉलिमर 1.40 % भा/भा. इथिलीने ऑक्साइड/प्रोपिलिनऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर और ईथोक्सीलेटिड अल्कोहल का मिश्रण 3.20 % भा/भा. पॉलि सिलोक्सेन इम्लशन 0.20 % भा/भा. प्रोपाईलीन ग्लायकोल 6.50 % भा/भा. जैनथन गोंद 0.30 % भा/भा. 1,2-बेन्ज़िसोथियाज़ोलिन -3-वन 0.20 % भा/भा. जल पर्याप्त मात्रा % कुल 100% w/w.

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें ।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : 1. खाध सामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। 2. फंफूदीनाशक को मुंह, त्वचा और आंखों में तथा स्प्रे फुहारो को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। 3. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहने जैसे कि रसायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, ऐप्रन, जूते या कवरऑल्स जो भी उचित हो। 4. आँखो की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने। 5. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को साबुन और खूब सारे पानी से धोए। 6. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 7. यह उत्पाद जलीय जीवो के लिए विषैला है इसलिए इसका इस्तेमाल जल क्षेत्रो के पास, जलसंवर्धन / मत्स्य पालन गतिविधिया में नही करना चाहिए।
विष नाशक : कोई भी ज्ञात विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।
प्राथमिक चिकित्सा : 1. यदि निगल लिया गया है: यदि मरीज होश मे और सचेत है तो मुँह को पानी के साथ कुल्ला करवाएं और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दे। कभी भी किसी बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कोई चीज न दें, चिकित्सक को बुलाएं। जब तक चिकित्सक को बुलाए द्वारा कहा न जाए तब तक उल्टी करवाने की कोशिश न करें। 2. यदि साँस के साथ ग्रहण कर लिया है: मरीज को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान की देखभाल करें, यदि मरीज सांस सांस नही ले रहा है या सांस लेने में कठनाई हो रही हो तो कृत्रिम श्वासन दें, तरजीही तौर पर मुँह से मुँह को सांस दे। चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा से संपर्क होने पर: बालो और नाखुनो के नीचे के भाग सहित शरीर के प्रभाविक अंगो को साबून और खूब सारे पानी से साथ अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द, जलन या लालिमा बनी रहती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ो को अलग करे और इस्तेमाल से पहले साबुन एंव पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोए। 4. आँख के संपर्क के संपर्क होने पर: कम से कम 15 मिनट तक खूब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखो को धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा और प्रकाशभीति बनी रहती है तो आँखो के विशेषज्ञ से संपर्क करें।
लक्षण : आँखो में हल्की जलन। निगल ली जाने पर सुस्ती, लार का बहना और ऐंठन हो सकती है। सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना और उल्टी कंपकंपी एंव स्वाँस लेने में तकलीफ हो सकती है।
उपयोग : पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + ट्राइसाइक्लोज़ोल 20.33% भा/भा एस.सी एक बहु आयामी फंफूदीनाशक है जो अन्तरप्रवाही क्रियाशीलता रखता है। इसकी सिफारिश धान के फंफूदी रोगो के विरुद्ध की जाती है **निर्माता :** अंग्रेजी में लिखे अनुसार
आयात कर्ता का उत्पादन परिसर : अंग्रेजी मे लिखे अनुसार
रासायनिक संरचना :

पिकोक्सीस्ट्रोबिन स.त.	6.78 % भा/भा.
ट्राइसाइक्लोज़ोल स.त.	20.33 % भा/भा.
मिथाइल मिथाक्राइलेट ईथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट को-पॉलिमर	1.40 % भा/भा
इथिलीने ऑक्साइड/प्रोपिलिनऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर और ईथोक्सीलेटिड अल्कोहल का मिश्रण	3.20 % भा/भा.
पॉलि सिलोक्सेन इम्लशन	0.20 % भा/भा.
प्रोपाईलीन ग्लायकोल	6.50 % भा/भा.
जैनथन गोंद	0.30 % भा/भा.
1,2-बेन्ज़िसोथियाज़ोलिन-3-वन	0.20 % भा/भा.
जल	पर्याप्त मात्रा %
	कुल: 100% w/w.

सावधानीः इस लेबल / पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್

ಪಿಕಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೬.೭೮8% w/w +ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಝೋಲ್ 20.33% w/w ಎಸ್ ಸಿ
(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಪಿಕಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ ಎ .ಐ. ೬.೭೮% W/w. ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಝೋಲ್ a. i. ೨೦.೩೩% W/w. ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರೈಲೇಟ್ ಎಥೋಕ್ಸಿ ಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ ೧.೪೦% w/w. ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್/ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಮಿಶ್ರಣ ೩.೨೦% w/w. ಪಾಲಿ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ೦.೨೦% w/w. ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ೬.೫೦% w/w. ಝಂತ್ತಾಂ ಗಮ್ ೦.೩೦% w/w. 1,2-ಬೆನ್ಜ್ಐಸೋಥಿಯಾಝೋಲಿನ್ -3-ಒನ್ ೦-.೨೦% w/w. ವಾಟರ್ ಕ್ಯೂ .ಎಸ್. % ಒಟ್ಟು 100% w/w.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮಡಚಿದ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ೧. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರದ ಡಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. ೨. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ೩. ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಪ್ರಾನ್, ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಕವರ್ ಆಲ್. ೪. ಕಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಧರಿಸನ್ನು ಬಳಸಿ. ೫. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ೬. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ಸೇದಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. ೭. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್/ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ನಂತಹ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು
ಆಂಟಿಡೋಟ್: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ., ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ೧ ಅಥವಾ ೨ ಲೋಟಗಳಷ್ಟು ನೀರು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನುಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಮೂಗಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ: ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರಿನ ಅಡಿ ಸೇರಿ ತಾಕಿದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ . ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋವು , ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬೇಕು . ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ **ತಾಗಿದಲ್ಲಿ:** ಕನಿಷ್ಠ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ವಿಶೇಷಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ.ತೀವ್ರವಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಲಸ್ಯ, ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರಿಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯ ನಡುಕ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಕರ ಉಸಿರಾಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

ಪಿಕಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ ಎ .ಐ.	೬.೭೮% w/w.
ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಝೋಲ್ a. i.	೨೦.೩೩% w/w.
ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರೈಲೇಟ್ ಎಥೋಕ್ಸಿ ಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್	೧.೪೦% w/w.
ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್/ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಮಿಶ್ರಣ	೩.೨೦% w/w.
ಪಾಲಿ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ ಎಮಲ್ಷನ್	೦.೨೦% w/w.
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	೬.೫೦% w/w.
ಝಂತ್ತಾಂ ಗಮ್	೦.೩೦% w/w.
1,2-ಬೆನ್ಜ್ಐಸೋಥಿಯಾಝೋಲಿನ್ -3-ಒನ್	೦-.೨೦% w/w.
ವಾಟರ್	ಕ್ಯೂ .ಎಸ್. %
	ಒಟ್ಟು 100% w/w.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು"

ப்லோர் அப்

பிகாக்சிஸ்ட்ரோபின் ௬.௭௮% w/w + ட்ரைசைக்ளசோலே ௨0.௩௩% w/w எஸ் சி
(ஸிஸ்டெமிக் ஃபிங்கிசைட்)

பிகாக்சிஸ்ட்ரோபின் ௬.௭௮% w/w. ட்ரைசைக்ளசோலே எ. ஐ. ௨0.௩௩%. மீதைல் மேதாக்ரை லேட் எதோக்சி லேடெட் கிராஃப்ட் கோபாலிமர் க.௪0% w/w. எதிலீன் ஆக்சைட்/ ப்ரோபிலீன் ஆக்சைட் ப்லோக் கோபாலிமர் மற்றும் எதாக்சி லேடெட் அல்கோஹாலின் கலவை ௩.௨0% w/w. பாலி சிலோக்சேன் எமில்ஷன் .௨0% w/w. ப்ரோபிலீன் க்ளைகோல் ௬.௫0% w/w. ஐந்தாம் கம் 0.௩0% w/w. க,௨-பென்ஸ்ஐசோதியாஜோலின் -௩-ஒன் .௨0% w/w. வாட்டர் க்யூ .எஸ் . % மொத்தம் க00% w/w.
பயன்படுத்தும் முறை: பயன்பத்தும் முன் பக்கத்தை படுங்கள்.
முன்னெச்சரிக்கை: க. உணவு பொருட்கள், வெற்று உணவு கேன்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களை விலகி வெய்யுங்கள். ௨. கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாயால் தொடாதீங்க. ஸ்பிரே மிஸ்ட்டய் ஶ்உள்ளிழிக்காதீங்க. ௩. முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். உதாரணமாக எப்ரோன், பூட்கள் அலல்து கவர் ஆல். ௪.கண் பாதுகாப்பு பயன்படுத்தவும். ௫. ஸ்பிரே பண்ண பிறகு மாசுபட்ட துணிகளை அப்பறோம் உடல் உறுப்பை சோப் மூலமா நல்ல சுத்தமாக்குங்கள். ௬. ஸ்பிரே பண்ணும்போது எதையும் உள்ளிழுக்காதீங்க, குடிக்காதீங்க, சாப்பிடாதீங்க அப்பறோம் மெல்லாதீங்க. ௭. இந்த தயாரிப்பு நீர்வாழ் விலங்குகளுக்கு விஷம்.அதனாலே ஆக்வாகல்ச்சர்/பிசிகல்ச்சர் மாதரி தண்ணி இருக்கும் இடங்களில் பயன்படுத்த கூடாது.
ஆன்டிடொட்: குறிப்பாக எந்த ஆன்டிடொட் கெடையாது, சிம்ப்டோமாட்டிக்கா ட்ரீட் பண்ணுங்க.

முதலுதவி: உட்கொள்கின்றால் : நபர் விழித்திருந்து எச்சரிக்கையாக இருந்தால், தண்ணீரில் வாய் கொப்பளிக்கவும் மற்றும் குடிக்க க அல்லது ௨ கிளாஸ் தண்ணி குடிங்க. சுயநினைவை இழந்தவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அணுகவும். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி வாந்தியை பண்ண வெக்காதீங்க.
உள்ளிழுக்கினால்: நோயாளியை சுத்தம் காற்று இருக்கும் இடத்துக்கு கொண்டு போங்க மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருந்தால், வாயிலிருந்து வாயக்கு சுவாசிச்சி செயற்கை சுவாசத்தை குடுங்க. மருத்துவரை அணுகவும்.
தோலுக்கு தாக்கினால் : முடி மற்றும் அண்ணியின் கீழே சேர்ந்து தாக்கின உடல் உறுப்புகளை போதுமான அளவுக்கு தண்ணி மற்றும் சோப் பயன்படுத்தி நல்ல சுத்தமாக்கிடுங்க. வலி அல்லது , தோல் செகப்பாகிறது அல்லது எரிச்சல் இருந்தால், மருத்துவரை அலைக்குங்க. மாசுபட்ட எல்லா துணியையும் வேறு படுத்துங்கள் அப்பறோம் தனி தனியாக சோப பயன்படுத்தி நல்லபடியா சுத்தமாகின பிறகு தான் அந்த துணிகளை பயன்படுத்தனும்.
கண்ணுக்கு தாக்கினால்: குறைந்தபட்சம் கரு நிமிடங்கள் வரை கண்ணை தண்ணியால் துவைக்குங்க. எரிச்சல், கண்ணு செகப்பாக்குறது அல்லது போட்டோபோபியா இருந்தால் கண்ணின் நிபுணர்களை தொடர்புங்கள்.
அறிகுறிகள்: கண்ணில் கொஞ்சம் எரிச்சல்.அதிக அளவு உள்ளிழுத்தால் சோம்பல், எச்சில் ஊறுகிறது மற்றும் வலிப்பு உண்டாகலாம். தலைவலி, தலைச்சுற்றல், குமட்டல் மற்றும் வொமிட்டிங் ட்ரெமோர் மற்றும் உழைப்பு சுவாசம் ஆகலாம்.

இரசாயன கலவை:

பிகாக்சிஸ்ட்ரோபின்	௬.௭௮% w/w
ட்ரைசைக்ளசோலே	எ. ஐ. ௨0.௩௩%
மீதைல் மேதாக்ரை லேட் எதோக்சி லேடெட் கிராஃப்ட் கோபாலிமர்	க.௪0% w/w.
எதிலீன் ஆக்சைட்/ ப்ரோபிலீன் ஆக்சைட் ப்லோக் கோபாலிமர் மற்றும் எதாக்சி லேடெட் அல்கோஹாலின் கலவை	௩.௨0% w/w.
பாலி சிலோக்சேன் எமில்ஷன்.	௨0% w/w.
ப்ரோபிலீன் க்ளைகோல்	௬.௫0% w/w.
ஐந்தாம் கம்	0.௩0% w/w.
க,௨-பென்ஸ்ஐசோதியாஜோலின் -௩-ஒன் .	௨0% w/w.
வாட்டர்	க்யூ .எஸ் . %
மொத்தம்	க00% w/w.

எச்சரிக்கை: " இந்த லேபிள் / பக்கத்தில் இருக்காத எந்த பயிரின் மேலும் பயன்படுத்த கூடாது"

Innovation starts with Amish

FLAREUP

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC
(Systemic Fungicide)

ఫ్లేర్అప్

పికోక్సిస్ట్రోబిన్ 6.78% w/w +ట్రైసైక్లాజోల్ 20.33% w/w SC
(ద్రైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి)

फ्लेयरअप

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + ट्राइसाइक्लोजोल 20.33% भा/भा एस.सी
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್

ಪಿಕಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೬.೭೮8% w/w +ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಝೋಲ್ 20.33% w/w ಎಸ್ ಸಿ
(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Read enclosed leaflet before use.
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। +९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No. : CIR-247957/2023-Picoxystrobin+Tricyclazole (SC) (442)-50

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE