

Thiifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

It is used to control sheath blight disease of Rice; Early blight on Tomato and Black scurf on Potato.

Caution : The product is very toxic to aquatic organism therefore not be used in and around aquaculture.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Al (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after Application (in hours)
Potato	Black scurf (As seed treatment)	0.6 g. a.i./ 10kg potato tuber	2.5 ml/10kg	-	-	Used as seed treatment in potato	-
Rice	Sheath blight, Rhizoctonia solani	90	375	500	28	-	-
Tomato	Early blight	120	500	500	7	-	-

Direction of use : Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Then add the remaining quantity of water as specified with through agitation for high volume of application through knapsack sprayer of high volume sprayers.

Time of application :-

Precautions : Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original container under lock and key, away from foodstuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling the product. Avoid inhalation and contact with eyes and skin.

Symptoms Of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal paid diarrhea, irritation if swallowed.

First Aid : 1. If inhaled, remove the patient to fresh air. 2.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. 3. Remove the clothes. wash the contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 4. In eyes are contamination, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically.

Phytotoxicity :-

Disposal of used container: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used package shall not left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions : 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The rooms or premises used for storing fungicides shall be well built, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to prevent environmental contamination with vapour of fungicide.

Chemical Composition :

Thiifluzamide a.i.	24.00% w/w
Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol	03.00% w/w
Fatty alcohol ethoxylate	02.00% w/w
Poly dimethyl siloxane	0.50% w/w
Propylene glycol	6.00% w/w
Xanthane gum	0.40% w/w
Deminerlized water	Q.S.%w/w
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

थाईफ्लुजामाईड २४% एस.सी.

(अंत्रप्रवाही फफूंदीनाशक)

इसका उपयोग धान की पर्णच्छेद अंगमारी रोकथाम, टमाटर की अगेली अंगमारी तथा आलू में ब्लैक स्कर्फ के लिए किया जाता है।

सावधान - यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए बहुत ही विषैला होता है इसलिए जलीय कृषि में और इसके आसपास इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

उपयोग:

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टरपर मात्रा	अंतिम छिड़काव तथ्या कसल	पुनः प्रवेश की अवधि
आलू	ब्लैक स्कर्फ (बीज उपचारण)	०.६ ग्रा.प. आई/ १० कि. ग्रा.	संरचना (मि.सी) मात्रा (लीटर) -	काले के बीच अन्तराल (दिन) (घंटे) -
धान	पर्णच्छेद अंगमारी, रिजोक्टोनिया सोलानी	१०	पानी की मात्रा (लीटर) -	आलू में बीज उपचारण हेतु
टमाटर	अगेली अंगमारी	१२०	१००	१००

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:

फफूंदनाशक की आवश्यक मात्रा लें इसे पानी की थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी की शेष मात्रा जो बताई गई है, अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाएं और इसका उच्च आयतन छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर से करें।

प्रयोग का समय :-

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकिंग में ताला चाबी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुंच से दूर संग्रहित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़ें पहनें। यदि कपड़ें दूषित हो गए हों तो उन्हें तुरंत बदल लें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धाएँ। फफूंदनाशक के समय खाना - पीना, दूधपान करना या तम्बाकू चबाना आदि कार्य न करें। इसे सूखें नहीं तथा आखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएँ।

विष के लक्षण: निगल जाने पर मिचली, उल्टी, पेट में दर्द व दस्त, खुजली आदि।

प्राथमिक चिकित्सा: १. अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को रवच हवा में वे जाएँ। २. निगल जाने पर तुरंत गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करायेँ। ३. दूषित कपड़ें उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। ४. यदि आँखें दूषित हो गई हों तो रवच पानी से १५ मिनट तक धोएँ।

पौधविशक्तता :

विष नाशक : कोई खास विषनाशक नहीं। लक्षणानुशार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह फफूंदनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों पैकेजिंग या बची हुई फफूंदनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण प्रदूषण न हो। २. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजिंग को बाहर न फेंकें। जिससे दुबारा दुबारा इस्तेमाल न हो। ३. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजिंग को तोड़फोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। **संग्रहण की शर्तें:** १. फफूंदनाशक रखें हुए डिब्बों पैकेजिंग को अलग कमरों या ऐसी जगहों में जिसमें अन्य वस्तुएँ रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अगमारियों में ताला - चाबी लगाकर रखें। फफूंदनाशक को माथण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरों या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाप से वातावरण प्रदुषित होने का खतरा न रहे।

रासायनिक संरचना :

थाईफ्लुजामाईड स.त.	२४.००% भार/भार
इताक्वीलेटेड पॉलीमिथाक्रिलेट इन प्रोपिलिन ग्लाइकोल	०३.००% भार/भार
फैटी एल्कोहल इथोक्सीलेट	०२.००% भार/भार
पोली डाईमिथाइल सिलोक्सेन	०.५०% भार/भार
प्रोपाईलीन ग्लाइकोल	६.००% भार/भार
जेन्थेन गम	०.४०% भार/भार
डिमिनालाईज्ड वाटर	पर्याप्त मात्रा/भार/भार
कुल	१००% भार/भार

सावधानी:या लेबल पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य पर प्रयोग न करें।

తైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సి

(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

వరి పంటను ఆశించు పొడ తెగులు, దివాలా తోటలను ఆశించు ముందుగా వచ్చు ఎండు తెగులు మరియు బంగాళంపంసు ఆశించు నల్లమచ్చలు తెగుళ్ళను ఆరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను.

పాచ్చరిక : ఇది జల చరములకు వివహరి కావున వాటి చుట్టుపక్కల దీనిని ఉపయోగించరాదు.

నివారణము :

పంట	తెగులు పాచారణ నామము	గ్రీ.కీ. (గ్రా.)	మోతాదు / పాచారణ క్రిమిసంబంధిత నీటి మందం (గ్రా.)	పాచారణ మద్దకాలం (గ్రా.)	అవధి పరిధి (గంటలు)	మరల (గంటలు)
బంగాళంపంసు	నల్లమచ్చ తెగులు (పచ్చన కట్టక)	0.6 గ్రా.పంసు / 2.5 మి.లీ. / 10 కి.గ్రా	10 కి.గ్రా	10 కి.గ్రా	28	28
వరి	పొడ తెగులు, పొడ తెగులు	90	375	500	28	28
దివాలా	పొడ తెగులు	120	500	500	7	7

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : అవసరమైన పరిమాణంలోని తైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సిలో కొద్దిపాటి నీటిని కలిపి బాగా కలియతిప్పి మిగతా నీటిని కలిపి పిచికారి ద్రావణాన్ని నిష్కం చేసుకొనవలెను. దీనిని అధిక నీటి పరిమాణం గల నాచికాక్ (స్ప్రేయర్)తో పిచికారి చేయాలి.

పిచికారి సమయం :-

ముందు జాగ్రత్తలు : దయచేసి లేబుల్‌ను చదివి సూచనలు పాటించండి. శిలీంధ్రనాశినిని దాని ఒడ్డుననే కంప్లైసర్‌లోనే ఆహార పదార్థాలు, పశుగ్రాహాలు మరియు పిల్లలకు దూరంగా తాళం వేసి నిల్వచేయాలి. ఉపయోగించునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించవలెను. కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించండి. కలుషిత శరీర భాగములను మరియు దుస్తులను సబ్బు మరియు పుష్పలమైన నీటితో శుభ్రపరచండి. దీనిని ఉపయోగించునపుడు ఏదైనా తినుట, త్రాగుట, పానీయాలు లేదా పానీయ నములుట వంటివి చేయరాదు. మందును పీల్చుకొనుట, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటునీయరాదు. ఏవీ లక్షణములు : మింగినచో, పిచికారి, వాంతులు, పొత్తికడుపులో నొప్పి, విరిచనాలు, పిచికారి వంటివి సంభవించును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మందు పీల్చినచో రోగిని ఆరుబయట వాతావరణములోనికి తరలించండి. 2. పీల్చినచో, మెడ వెనుక భాగమున ప్రేరిపించి వాంతి చేయించండి. 3. చర్మము మరియు దుస్తులు కలుషితమైనచో ఎక్కువ పరిమాణము గల నీటితో, సబ్బుతో, బాగా శుభ్రపరచవలెను. 4. కళ్ళలో మందు పడితే స్వచ్ఛమైన నీటితో బాగుగా 15 ని.ల వరకు కడగండి.

ఏవీతుల్యుత :-

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంప్లైసర్ విసర్జన : 1. తయారీదార్లు, పార్కులీటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించదానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గడిన బావనాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపిట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమూలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత అవినిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

తైఫ్లూజమైడ్ స.ప.	24.00% భా/భా
ఇథోక్సిలేటెడ్ పాలి మిథాక్రిలేట్ ఇన్ ప్రొపిలిన గ్లైకోల్	03.00% భా/భా
ఫాటీ అల్కొహాల్ ఇథోక్సిలేట్	02.00% భా/భా
పాలి డైమిథైల్ సైలొక్సెన్	0.50% భా/భా
ప్రొపిలిన గ్లైకోల్	6.00% భా/భా
జెంథెన్ గమ్	0.40% భా/భా
డి మినరలైజ్డ్ నీరు	క్యూ.ఎస్.ఎస్. భా/భా
మొత్తం	100 % భా/భా

పాచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై తప్ప, ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవూడదు.



FLUZO Thiifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

ఫ్లూజో థిఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

అమీశ థిఫ్లూజమైడ్ 24% ప్రతితల एस. सी. (अंत्रप्रवाही फफूंदीनाशक)

అమీశ థిఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలెయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पढ़ी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by: **AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,** Survey No.: 172, Uumulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता : **अमीश कौपर साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड** सर्व नंब : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल), नंध्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : "Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana. ఇంపానా శికారా-కోటికే కే లిఫ్. కర్రయ కేవర మేనేజర్ ఇంఫోకా పరో యా కౌన్ పర్ ఇలబా హే. +91 70750 68855, కే-మెయిల్: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281 Reg.No. : CIR-226156/2022-Thiifluzamide (SC) (442)-88

FOR AGRICULTURAL USE EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



