Lambda Cyhalothrin 5% EC
(Insecticide)

Lambda Cyhalothrin 5% EC is a Contact and Systemic Insecticide.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period from last Spray to Harvest (in days)
Red-gram	Pod borer, Pod fly	20-25	400-500	400-600	15
Mango	Hoppers	0.0025-0.005%	0.50-1.00 ml/tree		7
Cotton	Bollworms	15-25	300-500	400-600	21
	Jassids	15-25	300-500	400-600	21
	Thrips	15-25	300-500	400-600	21
Chikpea	Pod borer	25	500	300-400	6
Tomato	Fruit Borer	15	300	400-600	4
Rice	Leaf Folder Stem Borer, Green Leaf Hopper Gall Midge, Thrips, BPH, WBPH, Whorl Maggot	12.5	250	400-600	15
Onion	Thrips	15	300	300-400	5
Brinjal	Shoot & Fruit Borer	15	300	400-600	4
Okra/ Bhindi	Jassid, Shoot Borer	15	300	300-400	4
Chilli	Thrips, Mite	15	300	400-600	5
Ground-nut	Thrips, Leaf hopper, Leaf minor	10-15	200-300	400-500	10

Direction of use :

Plant Protection Equipment : Bucket sprayer, Rocking sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and double barrel), knapsack sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery or ASPEE HTP Power sprayer.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff container and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew, smoke anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

First Aid : 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known, Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of used Container: 1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient demensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Lambda Cyhalothrin a.i.	5.00% w/w
Emulsifiers : Creslox AE 4 (Mixture of Calcium salt of alkyl benzene Sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	7.00% w/w
Creslox AE 5 (Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%)	3.00% w/w
Solvent (Aromax)	Q.S.
Total	100.000% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ 5% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ 5% ఇ.సి. స్పర్శ మరియు అంతర్వాహిక చర్యలుగల కీటకనాశిని.

సిఫారసు :

పైర్లు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. న.మ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత మధ్య విరామం (రోజులు)
కంది	కాయ తొల్చుపురుగు కాండంతంగ	20-25	400-500	400-600	15
మామిడి	తేనెమంచు పురుగులు	0.0025-0.005%	0.50-1.00 మిలీ/చెట్టు		7
ప్రత్తి	కాయతొల్చుపురుగులు	15-25	300-500	400-600	21
	పచ్చదోమ	15-25	300-500	400-600	21
	తామర పురుగు	15-25	300-500	400-600	21
శనగ	కాయ తొల్చుపురుగు	25	500	300-400	6
టమోట	కాయతొల్చుపురుగు	15	300	400-600	4
వరి	ఆకుచుట్టు పురుగు, కాండంతొల్చుపురుగు పచ్చదోమ, ఉల్లికోడు తామరపురుగులు సుడిదోమ, తెల్లపీపుగల సుడిదోమ, వరి నల్లి	12.5	250	400-600	15
ఉల్లి	తామరపురుగులు	15	300	300-400	5
వంగ	కొమ్మ మరియు కాయతొలుచుపురుగు	15	300	400-600	4
బెండ	పచ్చదోమ, కొమ్మ తొల్చుపురుగు	15	300	300-400	4
మిరప	తామరపురుగులు, నల్లి	15	300	400-600	5
వేరుశనగ	తామరపురుగులు, పచ్చదోమ, ఆకుతొల్చుపురుగు	10-15	200-300	400-500	10

ఉపయోగించుటకు సూచన:

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరం : బకెట్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ పంప్ స్ప్రేయర్ (సింగిల్ మరియు డబుల్ బ్యారెల్), నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, వీల్‌బారో స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ లేదా ఆస్పీ హెచ్.టి.పి. పవర్ స్ప్రేయరు.

ముందు జాగ్రత్త: 1. ఆహారపదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపాత్రలకు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందు తుంపరలను పీల్చకండి. గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయాలి. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవలెను. 5. పిచికారీ చేయునపుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట, మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి.

విషతుల్యత : సిఫార్సుల మేరకు పొలంలో ఉపయోగించిన యెడల హానికరం కాదు.

విషలక్షణాలు: మింగినచో భయం, ఆందోళన, వణుకు, మూర్ఛలు, చర్మ అలర్జీ, తుమ్ములు, ముక్కు కారుట మరియు ముక్కు గట్టిపడుట వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మ్రింగినచో, వాంతి చేయించరాదు లేదా ఏ ద్రవమునూ ఇవ్వకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైనచో, దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును పుష్కలమైన నీరు మరియు సబ్బుతో శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినపుడు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో 10-15 నిముషాల పాటు ధారగా కళ్ళను కడగాలి. 4. పీల్చినచో : రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. అలర్జీల నియంత్రణకు యాంటిహిస్టమైన్లను ఇవ్వండి.

ఖాళీ కిరైనర్ల విసర్జన : 1. ఉపయోగించన ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు కీటకనాశినులను కడిగిన నీరు మరియు కంటైనర్‌ను వాతావరణం మరియు నీటివనరులు కలుషితం కాని విధంగా విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించేందుకు వీలు కాకుండా బయట పడలివేయరాదు. 3. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను పసులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా సురక్షితమైన ప్రాంతంలో వాతావరణం మరియు నీటివనరులు కలుషితం కాని విధంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటకనాశిని గల ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేదా ప్రాంతంలో ఇతర సరకులు ప్రత్యేకంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వచేయు గదులకు దూరంగా ప్రత్యేకమైన అల్మారాల్లో వాటి ప్రభావం, స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి వుంచాలి. 2. కీటకనాశిని నిల్వచేయు గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా గాలి, వెలుతురు, పొడిగా, చల్లగా సరియగు కొలతలతో కీటకనాశినుల ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ స.వ.	5.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్లు : క్రెస్‌లాక్స్ ఎఇ 4 (మిక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం సాల్ట్ ఆఫ్ అల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫొనేట్ 20%, అల్కిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్ 57% మరియు సాల్వెంట్లు (మెథనాల్, ఐసోబుటనాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 23%)	7.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్లు : క్రెస్‌లాక్స్ ఎఇ 5 (మిక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం సాల్ట్ ఆఫ్ అల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫొనేట్ 36%, అల్కిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్ 34% మరియు సాల్వెంట్లు (మెథనాల్, ఐసోబుటనాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 30%)	3.00% భా/భా
సాల్వెంట్ (ఆరోమాక్స్)	క్యు.ఎస్
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५ प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी. स्पर्श और पेट में असर करने वाला कीटनाशक हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टर मात्रा स.तत्व. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों मे)
अरहर	फली छेदक, फली मक्खी	२०-२५	४०-५००	४००-६००	१५
आम	टिड्डों	०.००२५-०.०० ५ प्रतिशत	०.५०-१.००मिली/ लीटर		७
कपास	डोडे की सुंडिया	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
	तेला	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
	चुरदा	१५-२५	३००-६००	४००-६००	२१
चना	फली छेदक,	२५	५००	३००-४००	६
टमाटर	फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
धान	पत्ता मोड़क,तना छेदक हरा पत्ती का टिड्डा, गाल मिज, हिस्पा, भूरा पौध टिड्डा, सफेद पीठ वाला टिड्डा, मैगटा	१२.५	२५०	४००-६००	१५
याज	चुरदा	१५	३००	३००-४००	५
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
भिन्डी	चुरदा, प्ररोह छेदक	१५	३००	३००-४००	४
मिर्च	चुरदा, थुन	१५	३००	४००-६००	५
मूंगफली	चुरदा, पत्ता फुदका, सुरंगी कीट	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०

उपयोग के लिये निर्देश:

उपयोग में आने वाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें । ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लछण: घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी), त्वचा की ऐलर्जिक, छींक आना, नाक बहना, और जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगला जाये तो उल्टी न करायें या कोई पदार्थ मुंह द्वारा न दें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन-साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लिए एन्टोहिस्टेमिल्स दिए जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बो या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओ विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिये या कीटनाशक की मात्रा और सम्भाव पर निर्भर करते हुए इसका संग्रहण अलग अलमारी मे ताला-चाबी लगाकर करे। २. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण कक्ष या रोशनदारी, मजबूत, शुष्क, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिये। जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण नही हो।

रासायनिक संघटन :

लैम्बडासायहैलोथ्रीन स.त.	५.००% भार/भार
सरफेटिन्ट-क्रिसलोक्स ए ई.४ (२०% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैलशियम साल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स २३%)	७.००% भार/भार
क्रिसलोक्स ए ई. ५ (३६% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैलशियम साल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स ३०%)	३.००% भार/भार
सोलवैंट ऐरोमेक्स	पर्याप्त मात्रा
योग	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

Amish CROP SCIENCES

LAMBIX
Lambda Cyhalothrin 5% EC
(Insecticide)

లాంబిక్స్
లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ 5% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

लाम्बीक्स
लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी.
(कीटनाशक)

ಲಾಂಬಿಕ್ಸ್
ಲಾಂಬ್ಡಾಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
ವಿಷಗುಳಿ
విష పదార్థము
POISON
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIBRC no:CIR-130797/2015-Lambdacyhalothrin (EC) (354) - 289

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५ प्रतिशत ई.सी.

(कीटकनाशक)

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% इसी हे संपर्क आणि प्रणालीगत कीटकनाशक आहे.

शिफारसी:

पीक(ते)	सामान्य नाव कीटक	डोस / हेक्टर २.डी. पाण्यात (ग्रा)	फॉर्म्युला 'डिप (मिली)	शेवटच्या कापणी (लिटर)	प्रतीक्षा कालावधी फवारणीपासून पातळ करणे करण्यासाठी (दिवस)
कापूस	बोंडअळी जस्सीड्स, थ्रीप्स	१४-२५	३००-५००	४००-६००	२१
तांदळाची	पाने फोल्डर स्टेम बोअरर, गॅल मिज हिस्पा, बीपीएच, ग्रीन लीफ हॉपर शइझाक व्होर्ल मॅगॉट वांगी अंकुर आणि फ्रूट बोरर	१२.५	२५०	४००-६००	१५
टोमॅटो	फ्रूट बोरर	१४	३००	४००-६००	४
आंबा	हॉपर्स	०.००२५-०.००५%	०.५०-१.०० मिली/झाड		७
हरभरा	बोंडअळी	२४	५००	३००-४००	६
भेंडी/ जस्सिड,	शूटबोअर	१४	३००	३००-४००	४
रेडग्राम	पॉड बोअरर, शेंगा माशी	२०-२५	४००-५००	४००-६००	१४
मिरची	थ्रिप्स, माइट	१४	३००	४००-६००	५
	मुर्डमूळ थ्रिप्स, पान हॉपर, लीफ किरकोळ	१०-१४	२००-३००	४००-५००	१०
कांदा	थ्रिप्स	१४	३००	३००-४००	५

वापरण्याची दिशा:

वनस्पती संरक्षण उपकरणे : बकेट स्प्रेअर, रॉकिंग स्प्रेअर, स्टिरप पंप स्प्रेअर (सिंगल आणि डबल बॅरल), नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, व्हील बॅरो स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर किंवा एएसपीईई एचटीपी पॉवर स्प्रेअर.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि चघळणे, काहीही धूम्रपान करू नका. ६. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

फायटोटॉक्सिसिटी : फाईल केलेल्या शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

विषबाधाची लक्षणे : घबराहट, चिंता, थरकाप, आकुंचन, त्वचेची ऍलर्जी, शिंका येणे, नाक वाहणे आणि नाक कडक होणे.

प्रथमोपचार: १. गिळल्यास, उलट्या होऊ देऊ नका किंवा द्रव देऊ नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छपाण्याने धुवा. ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही, लक्षणात्मक उपचार करा. ऍलर्जी नियंत्रित करण्यासाठी अँटीहिस्टामाइन्स द्विली जाऊ शकतात.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. वापरलेल्या पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि कीटकनाशके आणि कंटेनरची धुलाई सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जावी जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. पॅकेजेस तोडल्या जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरल्या जातील.

स्टोरेज : १. साहित्य असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाया खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा त्यांच्या प्रमाण आणि स्वरूपानुसार लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. साहित्य. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नयेत म्हणून पुरेशा खोल्या असतील.

रासायनिक रचना :

लमडा सायहॅलोथ्रिन ५.००% व/व

इमल्सीफायर्स: क्रेस्लॉक्स

अए ४ (७.००% व/व. मिश्रण

अल्काइल बेंझिन सल्फोनेटचे कॅल्शियम मीठ २०%,

अल्काइल फिनॉल इथॉक्सिलेट ४७% आणि

सॉल्व्हेंट्स (मिथेनॉल, आयसोब्युटॅनॉल आणि अरोमेक्स २३%)

क्रेस्लॉक्स

अए ५ (कॅल्शियम मिठाचे मिश्रण ३.००% व/व

अल्काइल बेंझिन सल्फोनेट ३६%,

अल्काइल फिनॉल इथॉक्सिलेट ३४% आणि

सॉल्व्हेंट्स (मिथेनॉल, आयसोब्युटॅनॉल आणि ॲरोमेक्स ३०%)

दिवाळखोर (अरोमॅक्स) ८६%

एकूण १००.००% व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ल्यांब्डा सैहलोथ्रिन 5% ई.सी.

(कीटनाशक)

ल्यांब्डा सैलोथ्रिन 5% ई.सी.ऐंदो संपर्क मत्तु विस्तृतवागि हरडुव कीटनाशक.

सिफारसुगळु :

बेळे	रोगद हेसरु	हेक्टरिगे प्रमाण मूळ औषधद ग्रा.	सूचिसिद शिलींद्रनाशक ग्रा.	नीरिन प्रमाण ली.	कोनेय सिंपरणे हागू कोय्युगे बरुव समय (दिनगळु)
नेलगडलेबेळे	थ्रिप्स्, एलोव हाफ्पर्, लीफ्मायनर	10-15	200-300	400-500	10
मामिडि	हाफर्प्स	0.0025-0.005%	0.50-1.00 मिलि/मर		7
हत्ति	कायोकोरक हुळु एलेसुरदग कीटे हत्ति तिगॅ नासि कॅण्ड्रा तिगॅ	15-25	300-500	400-600	21
कडलेबेळे	कायोकोरक हुळु	25	500	300-400	6
टमॅटो	कायोकोरक हुळु कायोहुळुगळु हुळु	15.0	300	400-600	4
भत्ति	एलेयु मैट्स् मत्तु नसि कंदु जिगिहुळु कायोकोरक हुळु हसिरु दुमॅ.एलेसुरुवहुळु हसिरु जिगिहुळु	12.5	250	400-600	15
ईरुल्लि	थ्रिप्स्	15	300	300-400	5
बदनॅ	कायोकोरक हुळु एलेसुरुव हुळु	15.0	300	400-600	4
बॅण्डि	जासिड्, कायोकोरक	15	300	300-400	4
मणसिन काय	थ्रिप्स् नल्लि	15	300	400-600	5

बळकेय दिक्कु:

सिंपरणॅ परिकरगळु : कै पंपु, कालुगळिंद तुळियुव पंपु, विद्युत् चालित स्प्रैयर् पंप्, ब्याटिरि चालित स्प्रैयर्, ऑस् पवर पंप्.

मुंजाग्रतॆ क्रमगळु : 1. आहार पदार्थगळिगॆ, पशु आहारगळिगॆ हागू शाळि, बॆंकिगॆ दूरवागि इरिसकॆड्डु.2. बाय्यिय मूलळॆ, चॆर्मर मूलळॆ प्रवॆशिसदंतॆ ऎच्चॆरिकॆ वहिसबॆकु. 3.स्प्रॆ मंजनु इन्हलॆशन्स् माडुवुदन्नु तप्पिसि. गाळियु दिक्कॆनल्लि सिंपडिसि. 4. सिंपडिसिद नंतर कलुषितॆ बिट्टॆ मत्तु दॆहद भागगळन्नु चिन्नागि तॊळियॆकॆ. 5. सिंपरणॆ माडुव समयदल्लि तिन्नुवुदु, कुडियुवुदु माडबारदु. 6. रब्बर ब्रॊव्ज्गॆ, बूटुगळु, कै रक्ष्य कवचॆ, कण्णिगॆ ब्रॊषिसु, दॆहद मुंदिन भागवन्नु मुच्चिकॊंडु, मुंबिक्कॆ कवचॆवन्नु धरिसिकॊंडु सिंपरणॆ माडबॆकु.

प्ळैटोटाक्सिसिटि: सल्लिसिद शिफारसिन प्रकारद बळसिदागॆ उत्पन्नवु प्ळैटोटाक्सिक् आगिरुवुदिल्ल.

विषदलक्षणगळु: नर, अंगडॆ, नडुकॆ, सॆळॆत, चॆर्मद अलर्जि, सीनुविकॆ, मूगु हरियुवुदु मत्तु मूगु बगिक्कॆ ऊंगुवागबहुदु.

प्रथम चिकित्सॆ: 1. सुंगिदरॆ, वान्तॆ माडबॆकु अथवा द्रवदन्नु सीडबॆकु. 2. बिट्टॆ मत्तु चॆर्मवु कलुषितवागिद्दरॆ, बिट्टॆगळन्नु तॆगॆदुहाकॆ मत्तु कलुषितॆ चॆर्मवन्नु साशक्यु प्रमाणद साबूनु मत्तु सीरिनिंद तॊळियिरि. 3. कण्णुगळु कलुषितवागिद्दरॆ, सुमारु 10 रिंद 15 निमिषगळ कालॆ साशक्यु ऊय्यु/शुद्धु सीरिनिंद शुभ्र माडु. 4. ऊसिराडिदरॆ, रोगियन्नु ताजा गाळिगॆ तॆगॆदुबाकॆ.

वैद्योपचारगळु : यावुदॆ निर्दिष्टु प्रतिविष तिळिदिल्लु, रोगलक्षणद चिकित्सॆ, अलर्जियन्नु नियंत्रिसलु अंटीहिस्टमिन्स्गळन्नु निंडबहुदु.

बळसिद कंटॆन्यॆनर् विलॆवारि: 1. परिसिद अथवा जल मालिन्यवन्नु तडॆगट्टलु बळसिद प्याकॆजुगळु अथवा कॊंडुवुदरि वस्तुगळु मत्तु कीटनाशकगळु मत्तु पात्रॆयु तॊळियुविकॆयन्नु सुरक्षितवागि रीतियल्लि विलॆवारि माडबॆकु. 2. बळसिद प्याकॆज्ज् अन्नु अवुगळॆ मरु-बळकॆयन्नु तडॆयलु हॊरगॆ बिडबारदु. 3. प्याकॆजुगळन्नु मरुदिंदु जनवसतियिंदद हॊरगॆबॆकु.

शॆखरगॆ: 1. वस्तुगळन्नु ऒळगॊंडिरुव प्याकॆजुगळन्नु प्रत्यॆक्कॆ कॊडदिगळु अथवा आवरणगळिंद दूरवियिरुव कॊणॆगळु अथवा आवरणदिंद दूरवदल्लि संग्रहिसलागुत्तदॆ अथवा इतर वस्तुगळन्नु विशॆषवागि आहारद वस्तुगळन्नु संग्रहिसलु बळसलागुत्तदॆ अथवा प्रमाण मत्तु स्वभावदन्नु अवलंबिसि बॆगॆ मत्तु कॆ आडियल्लि प्रत्यॆक्कॆ अल्लिरागळल्लि इरिसलागुत्तदॆ वस्तु. 2. कीटनाशकगळन्नु संग्रहिसलु ऊदगॆलिसलाद कॊठडिगळु अथवा आवरणगळन्नु बॆळवागि निर्मिसुवुदु, लागिदॆ, शुद्धु, तंडवागिरुव, गाळि मत्तु ऒयियिंद मालिन्यवन्नु तप्पिसलु साशक्यु बंधनगळन्नु हॊंदिरबॆकु.

रासायनिक संयोजनॆगळु:

ल्यांब्डा सैलोथ्रिन् 5.00% तूक/तूक

एमर्ल्सि फ्यूर् : (क्र्यलारॊ.ए.इ.-4)

अल्कै्ल्बिन्जिन् सल्फ्यूनेट्न् क्याल्सियं क्षरतॆ 20% मत्तु

अल्कै्ल् फॆनल् इथाक्सिलेट् 57%

क्याल्सियं क्षारतॆ मिश्रणवु

(मिथनाल् ऐसोब्युटॆनाल् मत्तु यूरोमॆक्स् 23% 7.00% तूक/तूक

क्रिसॊलाक्स् ए.इ.-5

अल्कै्ल्बिन्जिन् सल्फ्यूनेट्न् क्याल्सियं क्षरतॆ 36% मत्तु

अल्कै्ल् फॆनल् इथाक्सिलेट् क्याल्सियं 34%

मत्तु अरोमॆक्स् 30% 3.00% तूक/तूक

स्याल्वॆंट् (अरोमॆक्स्) बेकादा प्रमाण

मत्तु 100.000% तूक/तूक

ऎच्चरिकॆ : लगत्तिसलाद करपत्रदल्लिय सूचिसलाद बॆळॆगळ मॆलॆयॆयॆ ऊषधियन्नु ऊपयोगिसबॆकु. इतर बॆळॆगळ मॆलॆ इदन्नु ऊपयोगिसबारदु.

ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ.ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕೀಟನಾಶಕ.

ಸಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಗ್ರಾಂ.	ಸೂಚಿಸಿದ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಗ್ರಾಂ.	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೀ.	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)
ನೆಲಗಡಲೆ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಎಲೋ ಹಾಪರ್, ಲೀಫ್‌ಮೈನರ್	10-15	200-300	400-500	10
ಮಾಮಿಡಿ	ಹಾಪರ್ಸ್	0.0025-0.005%	0.50-1.00 ಮಿಲಿ/ಮರ		7
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಎಲೆಸುರಳಿ ಕೀಟ ಹತ್ತಿ ತಿಗಣೆ ನಾಸಿ ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ	15-25	300-500	400-600	21
ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು	25	500	300-400	6
ಟಮೋಟ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಕಾಯಿಹುಳುಕು ಹುಳು	15.0	300	400-600	4
ಭತ್ತ	ಎಲೆಯ ಮೈಟ್ಸ್ ನಸಿ ಕಂದು ಜಿಗಿಹುಳು ಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳು ಹಸಿರು ದುಮ್ಮೆ.ಎಲೆ ಸುರುಳಿಹುಳು ಹಸಿರು ಜಿಗಿಹುಳು	12.5	250	400-600	15
ಈರುಳ್ಳಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	15	300	300-400	5
ಬದನೆ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಎಲೆಸುರುಳಿ ಹುಳು	15.0	300	400-600	4
ಬೆಂಡಿ	ಜಾಸಿಡ್, ಕಾಂಡಕೊರಕ	15	300	300-400	4
ಮಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ	15	300	400-600	5

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು:

ಸಿಂಪರಣೆ ಪರಿಕರಗಳು : ಕೈ ಪಂಪು, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುವ ಪಂಪು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಪಂಪ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಆಸ್ಸ್ ಪವರ ಪಂಪ್.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಕಕ್ಕದ್ದು.2. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ, ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 3.ಸ್ಪ್ರೆ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಶನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿಕೆ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ರಬ್ಬರ ಬೊಪ್ಪಿಗೆ, ಬೂಟುಗಳು, ಕೈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಾಳಿಸು, ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷದಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ, ಅಂತಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಹರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ದ್ರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮರಿದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ: 1. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಊದಗೆಲಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೀನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ತಂಪಾಗಿರುವ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲೊಥ್ರಿನ್ 5.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಮರ್ಲ್ಸಿ ಫ್ಯೂರ್ : (ಕ್ರಪಲಾರ್ಲ್ ಎ.ಇ.-4)

ಅಲ್ಕೈ್ಲ್ಬಿನ್ಜಿನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷರತೆ 20% ಮತ್ತು

ಅಲ್ಕೈ್ಲ್ ಫೆನಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ 57%

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರತೆ ಮಿಶ್ರಣವು

(ಮಿಥನಾಲ್ ಐಸೋಬ್ಯುಟಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 23% 7.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಕ್ರಿಸೊಲಾಕ್ಸ್ ಎ.ಇ.-5

ಅಲ್ಕೈ್ಲ್ಬಿನ್ಜಿನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷರತೆ 36% ಮತ್ತು

ಅಲ್ಕೈ್ಲ್ ಫೆನಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 34%

ಮತ್ತು ಅರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% 3.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಸ್ಯಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಅರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್) ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಮತ್ತು 100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ

(ಪೂಚಿಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿ)

ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ ಒರು ತೊಡರ್ಪು ಮತ್ರುಂ ಮುಱೈಯಾನ ಪೂಚಿಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿಯಾಗುಂ.

ಪರಿನ್ದುರೈಕಳ್:

ಪಯಿರ್(ಕಳ್)	ಪೊದುವಾನ ಪೂಚಿಮಿಳ್	ಪಯರ್ ಅಳವು / ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅ.ಇ.	ಫೊರ್ಮುಲಾ - (ಗ್ರಾಂ) tion (ಮಿಲಿ)	ಕಾತ್ತಿರುಕ್‌ಕುಂ ಕಡೈಶಿ ಅಱುವடைக்கு (ಲಿಟ್ಟರ್)	ಕಾಲಂ ನಿರ್ತ್ತುದಲ್ ದೆಳಿಪ್ಪಿಲಿರುನ್ದು ತಣ್ಣೀರಿಲ್ (ನಾಟ್‌ಕಳ್)
ಪರುತ್ತಿ	ಕಾಯ್ಪುழுக்கள் ಜಸ್ಸಿಟ್‌ಸ್, ತ್ರಿಪ್ಸ್	15-25	300-500	400-600	21
ಅರಿಸಿ	ಇಲೈಕ್ ಸೋಪ್‌ಪுறை ತಣ್ಡು ತುಳಸಿಪಾನ್, ಪಿತ್ತಪಾಪ ಹ್ರಿಸ್ಪಾ, BPH, ಪಚ್ಚೈ ಇಲೈ ತುಳ್ಳಲ್ WBPH, ವೋರ್ಲ್ ಮೆಕೋಟ್	12.5 250	400-600	15	
ಪಿಗ್ಸ್‌ಫಿ ಷ್‌ಟ್ & ಪழ	ತುಳಸಿಪಾನ್	15	300	400-600	4
ತಕ್ಕಾಳಿ	ಪழ ತುಳಸಿಪಾನ್	15	300	400-600	4
ಮೆಂಗೊ	ಹೊಪ್ಪರ್ಸ್		0.0025-0.50-1.00 0.005%	ಮಿಲಿ/ಮರம்	7
ಕಡಲೈಪರ್ಪ್ಪಾ	ಕಾಯ್ ತೊಳೆಪಾನ್	25	500	300-400	6
ಒಕ್ರಾ/ ಜಾಸಿಟ್,	ಷ್‌ಟ್ ತುಳಸಿಪಾನ್	15	300	300-400	4
ರೆಟ್‌ಕಿರಾಂ ಕಾಯ್	ತುಳಸಿಪಾನ್, ಕಾಯ್ ಈ	20-25	400-500	400-600	15
ಮಿಳಕಾಯ್	ತ್ರಿಪ್ಸ್, ಮೈಟ್	15	300	400-600	5
ನಿಲಕ್‌ಕಡಲೆ	ತ್ರಿಪ್ಸ್, ಇಲೈ ತೊಪ್ಪಿ, ಇಲೈ ಸಿறிபது	10-15	200-300	400-500	10
ವೆಂಡಕಾಯ	ತ್ರಿಪ್ಸ್	15	300	300-400	5

ಬಯನ್‌ಪಾಟ್‌ಟಿನ್ ದಿಶೈ:

ತಾವರ ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಉಪಕರಣಂಕಳ್: ಪಕ್‌ಕೆಟ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ರಾಕ್‌ಕಿಂಗ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಸ್ಟಿರಪ್ ಪಂಪ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್ (ಒಱ್ಱೈ ಮತ್ರುಂ ಇರಟ್ಟೈ ಪೆಂಪಾಯ್), ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಕಾಲ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ವೆಲ್ ಪೆರೋ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಸುರುಕ್ಕ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಸುರುಕ್ಕ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಪೆಟ್ಟರಿ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್ ಅಲ್ಲತು ASPEE HTP ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುನ್‌ನೆಚ್ಚರಿಕೈಕಳ್: 1. ಉಣವುಪ್ ಪೊರುட்கள், ಪೆಱ್ಱು ಉಣವುಪ್ ಪೊರುட்கள் ಕೊಳ್‌ಕಲನ್ ಮತ್ರುಂ ವಿಲಂಗುಕಳಿನ್ ಉಣವು ಆಕಿಯವற்ற்றிலிருந்து ವಿಲಕ್‌ಕಿಕಳುಂ. 2. ವಾಯ್, ಕಣ್‌ಕಳ್ ಮತ್ರುಂ ತೋಲುடன் ತೊಡರ್ಪು ಕೊಳ್‌ವತೈತ್ ತವಿರ್‌ಕ್‌ಕವುಂ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಸ್‌ಟ್‌ಟೈ ಉಳ್‌ಳಿழுப்பதைத் ತವಿರ್‌ಕ್‌ಕವುಂ. ಕಾಱ್ಱು ವೀಸುಂ ದಿಸೈಯಿಲ್ ತೆಳಿಕ್‌ಕವುಂ. 4. ತೆಳಿತ್ತಿತ ಪಿಱಗು ಅಸುತ್ತಮಾನ ಆಡೈಕಳ್ ಮತ್ರುಂ ಉಡಲಿನ್ ಪಾಕಂಕಳೈ ನನ್‌ಕು ತುವೈಕ್‌ಕವುಂ. 5. ತೆಳಿಕ್‌ಕುಂ ಪೋತು ಪುಕೈಪಿಡಿಕ್‌ಕಾತಿರ್‌ಕಳ್, ಕುಟಿಕ್‌ಕಾತಿರ್‌ಕಳ್, ಚಾಪಿಡುಂಗಳ್ ಮತ್ರುಂ ಮೆಲ್‌ಲಾತಿರ್‌ಕಳ್, ಪುಕೈಪಿಡಿಕ್‌ಕಾತಿರ್‌ಕಳ್. 6. ಕಲವை மற்றும் ತೆಳಿಕ್‌ಕುಂ ಪೋತು ಮುழு ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಆಡೈಕಳೈ ಅಣಿಯುಂಕಳ್.

ಪೈಟ್‌ಟಾಟಾಕ್‌ಸಿಸಿಟಿ: ತಾಕ್‌ಕಲ್ ಸೆಯ್‌ಯಪ್ಪಟ್ಟ ಪರಿನ್ದುರೈಯಿನ್‌ಪಟಿ ಪಯನ್‌ಪடுத்தப்படும் ಪೋತು ತಯಾರಿಪ್ಪು ಪೈಟ್‌ಟೋಟಾಕ್‌ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ವಿಷತ್ತಿನ್ ಅಱಿಕುಱಿಕಳ್: ನರಾಂಪುತ್ ತளர்ச்சி, ಪತ್ಟಂಪು, ನಡುಕ್‌ಕಂ, ವಲಿಪ್ಪು, ತೋಲ್ ಒವ್‌ವಾಮை, ತುಂಮಲ್, ಮೂಕ್‌ಕು ಒழு