

## Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR (Insecticide)

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide which contains 0.4% Chlorantraniliprole active ingredient.

### Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA		Dilution in water	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In hours)
		A.I. (gms)	Formulation (Kgs)			
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Paddy leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40	10	Broadcast	53	
Sugar cane	Early Shoot Borer (Chilo infuscatellus) Top Borer (Scirpophaga exocarpalis)	75	18.75	Broadcast	147	

**Direction of Use :** Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4 kg/acre in Rice and 7.5 kg/ acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to be done in furrows at planting or at the base of young emerging shoots along the furrows followed by an irrigation.

**Time of Application:** 1. 15-35 DAT (Days after transplanting) for Rice. 2. In case of sugarcane, application between planting to 1st irrigation is recommended for Early Shoot Borer while for Top borer application should coincide with appearance of Top borer moths.

**Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhalation of the insecticide. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 4. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles, eye/face shield while handling.

**Symptoms Of Poisoning :** Lethargy, nasal secretion and blurred vision.

**First Aid :** 1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water. 2. If on eyes, flushing with plenty of water is plenty of water is advisable. Consult a physician if necessary. 3. If inhaled, no specific intervention is indicated. 4. If swallowed, Consult a physician.

**Phytotoxicity :** No phytotoxic at recommended stages.

**Antidote:** No specific antidote is available, treat symptomatically.

**Disposal Of Used Container:** 1. The packages shall be broken and buried 1/2 meter deep in soil away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

**Storage Conditions:** 1. The packages containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almaris under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. Don't store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 3. The room and premises meant for storing the insecticides shall be well built, cool dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition:	
Chlorantraniliprole a.i.	0.40% w/w
Polyacrylic acid	0.40% w/w
Water	0.40% w/w
Dodecyl hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	0.40% w/w
Calcium lignosulphonate	1.00% w/w
Dye blue	0.05% w/w
Talc powder	8.00% w/w
Sand	Q.S% w/w
Total	100% w/w

**Caution :** "Not to be Used on Crops Other Than specified on This Label/Leaflet"

## क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% भार/भार जी आर (कीटनाशक)

क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% भार/भार जी आर एक नवीन ग्रौनुलर कीट नाशी है जिसमें ०.८ % क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व के रूप में मिश्रित है।

### उपयोग :

खसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा ग्र. तत्व (ग्राम)	प्रति हेक्टेयर मात्रा तथा तैयार करने के लिए आवश्यक (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम फिफुकाव तथा तैयार करने के लिए आवश्यक (दिने में)	पुनः प्रवेश की अवधि अवधि फिफुकाव के बाद (घंटे)
धान	पीना तना छेदक (फिफुकावा एन्ट्रानिलिप्रोल) धान का पत्ता भेड़क (पेनाल अंतिम फिफुकाव)	५०	५०	बिखराव	५३	
गन्ना	प्रारंभिक छेदक (आइसे इन्फुसकैटेलस) शीर्ष छेदक (फिफुकावा एक्करटेलिस)	७५	१८.७५	बिखराव	१४७	

**उपयोग के लिए दिशा निर्देश:** क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल ग्रेनुल्स ४ कि.ग्रा. प्रति ए-ड धान के खेत में और ७.५ कि.ग्रा. प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बिखरे। गन्ने में फरट्टेरा का प्रयोग बुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लो की जड़ों के पास मिट्टी में पतल में डाले और इसके बाद सिंचाई कर।

**प्रयोग का समय:** १. धान की रोपाई के १५-३५ दिन बाद बिखरा करें। २. गन्ने के खेत में बुआई से पहले सिंचाई तक प्रयोग करने पर तना छेदक से बचाव होता है। ३. शीर्ष छेदक से बचने के लिए शीर्ष छेदक कीटों के अण्डज दिखते ही प्रयोग करें।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा, आंखों और सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ३. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिये। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चश्मे और आंख/चेहरे का नकाब पहने।

**विष के लक्षण:** आलस आना, धुंधला दिखना तथा नाक बहना।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १. त्वचा सम्पर्क पर: त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २. आंख से सम्पर्क होने पर: आंखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से सम्पर्क करें। ३. सांस में जाने पर- कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है। ४. निगलने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें।

**पौधविशक्तता:** सिफारिश स्तर में छिड़कने पर पौध विषाक्तता नहीं होती।

**विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के इलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. खाली डिब्बों को तोड़ कर जमीन में, मीटर गहराई में निवार स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दें। २. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोड़ें। ३. किटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धूलई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दूषित न हो, खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर अबादी से दूर गाड़ देना चाहिए या पात्रों को तोड़फोड़कर अबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

**संग्रहण की शर्त :** १. कीटनाशक के पैकेटो को अलग-अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तुएं खाद्य पदार्थों भंडारण किये जाने वाले कमरों या जगहों से दूर कीटनाशक के प्रकार व परिणाम के अनुसार ताना चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जहाँ भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि संरक्षित हो जाए, वैसी जगह पर इस सामग्री को स्टोर न करें और न ही वहाँ खाने पीयें। ३. जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बंद हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व आयतन में पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :	
क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल स.त.	०.४०% भार/भार
पोलिएथिलेन एसेटेट	०.४०% भार/भार
जल	०.४०% भार/भार
डोडिसिल हाइड्रॉक्सीपोलि (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फास्फेट	०.४०% भार/भार
कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	१.००% भार/भार
डाइ ब्लू	०.०५% भार/भार
टाल्क पावडर	८.००% भार/भार
बालू	पर्याप्त मात्रा भार/भार
कुल	१००% भार/भार

**चेतावनी :** इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी फसलों के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

## क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% ग्रा/ग्रा डी आर (कीटनाशक)

क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% ग्रा/ग्रा डी आर अर्थात् 0.4% क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल क्रियाशील तत्व का ग्रा/ग्रा रूप में मिश्रित है।

### निर्देश :

उपयोग	उपयोग	उपयोग	उपयोग	उपयोग
धान	पीना तना छेदक (फिफुकावा एन्ट्रानिलिप्रोल) धान का पत्ता भेड़क (पेनाल अंतिम फिफुकाव)	५०	५०	बिखराव
गन्ना	प्रारंभिक छेदक (आइसे इन्फुसकैटेलस) शीर्ष छेदक (फिफुकावा एक्करटेलिस)	७५	१८.७५	बिखराव

**उपयोग के लिए दिशा निर्देश:** क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल ग्रेनुल्स ४ कि.ग्रा. प्रति ए-ड धान के खेत में और ७.५ कि.ग्रा. प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बिखरे। गन्ने में फरट्टेरा का प्रयोग बुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लो की जड़ों के पास मिट्टी में पतल में डाले और इसके बाद सिंचाई कर।

**प्रयोग का समय:** १. धान की रोपाई के १५-३५ दिन बाद बिखरा करें। २. गन्ने के खेत में बुआई से पहले सिंचाई तक प्रयोग करने पर तना छेदक से बचाव होता है। ३. शीर्ष छेदक से बचने के लिए शीर्ष छेदक कीटों के अण्डज दिखते ही प्रयोग करें।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा, आंखों और सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ३. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिये। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चश्मे और आंख/चेहरे का नकाब पहने।

**विष के लक्षण:** आलस आना, धुंधला दिखना तथा नाक बहना।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १. त्वचा सम्पर्क पर: त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २. आंख से सम्पर्क होने पर: आंखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से सम्पर्क करें। ३. सांस में जाने पर- कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है। ४. निगलने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें।

**पौधविशक्तता:** सिफारिश स्तर में छिड़कने पर पौध विषाक्तता नहीं होती।

**विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के इलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. खाली डिब्बों को तोड़ कर जमीन में, मीटर गहराई में निवार स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दें। २. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोड़ें। ३. किटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धूलई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दूषित न हो, खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर अबादी से दूर गाड़ देना चाहिए या पात्रों को तोड़फोड़कर अबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

**संग्रहण की शर्त :** १. कीटनाशक के पैकेटो को अलग-अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तुएं खाद्य पदार्थों भंडारण किये जाने वाले कमरों या जगहों से दूर कीटनाशक के प्रकार व परिणाम के अनुसार ताना चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जहाँ भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि संरक्षित हो जाए, वैसी जगह पर इस सामग्री को स्टोर न करें और न ही वहाँ खाने पीयें। ३. जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बंद हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व आयतन में पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :	
क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल स.त.	०.४०% भार/भार
पोलिएथिलेन एसेटेट	०.४०% भार/भार
जल	०.४०% भार/भार
डोडिसिल हाइड्रॉक्सीपोलि (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फास्फेट	०.४०% भार/भार
कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	१.००% भार/भार
डाइ ब्लू	०.०५% भार/भार
टाल्क पावडर	८.००% भार/भार
बालू	पर्याप्त मात्रा भार/भार
कुल	१००% भार/भार

**चेतावनी :** इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी फसलों के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।



## LIBERATION GR

### Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (Insecticide)

### लिबरेशन जी आर

### क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% ग्रा/ग्रा डी आर (कीटनाशक)

### लिबरेशन जी आर

### क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% भार/भार जी आर (कीटनाशक)

### लिबरेशन जी आर

### क्लोरएंन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% डी आर (कीटनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

## INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों से दूर रखिए।

मनुष्यों से दूर रखिए।



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी फसलों के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी फसलों के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Manufactured & Marketed by

**AMISH CROPS SCIENCES PVT. LTD**

Survey No. : 172, UduMulapadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222

Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451, Email : customercare@amishcroppsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNLU/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-272431/2023-CHLORANTRANILIPROLE (GR) (444)-393

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



चेतावनी: जल/वहल/हस्तपत्रिका में दी फसलों के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

