Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC

(Insecticide)

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20% w/v) is a novel substitute anthranilamide insecticides. It is a board spectrum insecticide and is recommended for controlling pests of Rice, Cabbage, Cotton, Sugarcane, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, pigeon pea (Red gram), Bengal gram, black gram, bittergourd, okra, Maize and Groundnut crop.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (Gram)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (lit)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Bengal gram	Pod Borer (Spodoptera spp. and H.armigera)	25	125	500	11	
Bitter gourd	Fruit Borers & Cater pillars(Diaphania sp. & H.armigera)	20-25	100-125	500	7	
Black Gram	Pod Borer (Maruca spp & S. litura)	20	100	500	20	
Brinjal	Fruit and shoot borer (Leucinoides orbonalis)	40	200	500-750	3	
Cabbage	Diamond Back Moth (Piutella Xylostella)	10	50	500	3	
Chilli	Fruit borer (Helicoverpa armigera) Spotted litura, Spodoptera exigua)	30	150	500	3	
Cotton	American Boll Warm (Earias vitella) Tabacoo caterpillar (Spodoptera itura)	30	150	500	9	
Ground nut	Tobacco caterpillar	30	150	500	28	
Maize	Spotted steam borer, Pink steam borer	40	200	500	10	
Okara	Fruit borer (H. armigera and Eias vittella)	25	125	500	5	
Pigeon pea	Gram pod borer (Helicoverpa armigera) Pod fly (Melanogromyza obtusa)	30	150	500-750	29	
Rice	Stem borer (Schirphophaga incertuals)and Leaf Floder (Cnaphalocrocis medinalis)	30	150	500	47	
Soy bean	Green semiloopers (chrysodexis acuta) stem fly Girdle Beetle	30	150	500-750	22	
Sugar cane	Termite(Odontotermes obesus/Microtermes obesi)	100-125	500-625	1000	208	
	Top borer(Scirpophage excerptalis)	75	375	1000	208	
	Early shoot borer (Chilo infuscatellus)	75	375	1000	208	
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	150	500	3	

Direction of Use : (Method and Time of application) Sugarcane: Sett Drenching/Soil Drenching in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer. The application fro the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of June Other crops(Rice, cotton, cabbage, tomato, chilli, soybean, brinjal, pigeonpea, bengal gram, black gram, bittergourd, okra) use as foliar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer.

Time of Application: -

Precautions : 1. Leaflet carefully, Save the container with the label to the show the physician in case of accidental poisoning. Read and follow all instructions on the label and 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles face mask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4 th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water. 6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over. 7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling. 8. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 9. Call a physician immediately if any poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide.

Symptoms Of Poisoning : Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion.

First Aid : IF inhaled; No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. If on skin: The material is not likely to be hazardous by skin contact, but clearing the skin after use is advisable. If in eyes: The material is not likely to be hazardous to the eyes is, but if contact occurs, flushing the eyes with plenty of water.

Phytotoxicity : No phytotoxic at recommended dosages.

Antidote: No specific antidote available, treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: Container for not reuse. Empty containers should be destroyed and buried in 1/2 meter deep soil away from habitation. Do not contaminate the environment, water or food by storage of disposal. Do not flush to surface water or sanitary sewer system.

Storage Conditions: Do not store and consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only. Tightly closed in a well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contaminations with vapours. The material should be kept under lock and key, away from food, animal fee, other pesticide and fertilizers.

Chemical Composition:

Chlorantraniliprole (a.i.	18.50% w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft co-oplymer	3.00% w/w
Etyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.00%w/w
Attapulgite clay	1.00% w/w
Xanthan gum	0.25%w/w
1,2- benzisothiazolin-3-one	0.10%w/w
Silicone emulsion	0.50%w/w
Propylene glycol	6.80%w/w
Water	QS%w/w
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భా/భా ఎస్ సి

(కీటకనాశిని)

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భా/భా సి ఎస్ (20% భా/ప) అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయ విస్తృతచర్య గల ఆంత్రనిలమైడ్ కీటకనాశిని. ఇది వరి, క్యాబేజీ, ప్రత్తి, చెరకు, టొమాటో, మిరప, సోయాబీన్, కంది, శనగ, మినుము, బీర, బెండ, మొక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ పంటలను ఆశించు కీటకాలను నియంత్రించడానికి సిఫార్సు చేయబడినది.

సిఫారసు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా.)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
శనగ	కాయ తొలుచు పురుగు (లద్దె పురుగు మరియు శనగపచ్చపురుగు)	25	125	500	11	
కాకర	కాయ తొలుచు పురుగులు, క్యాటర్ పిల్లర్లు (డయాఫానియా స్పె. మరియు శనగ పచ్చ పురుగు)	20-25	100-125	500	7	
మినుము	కాయతొలుచు పురుగు (మారుక స్పె.మరియు ఎస్.లిటురా)	20	100	500	20	
వంగ	కాయ తొలుచు మరియు కొమ్మ తొలుచు పురుగు (ల్యూసినోయిడ్స్ ఆర్బొనాలిస్)	40	200	500-750	3	
క్యాబేజీ	డైమండ్ రెక్కల పురుగు (పియుటెల్లా జిలోస్టెల్లా)	10	50 .	500	3	
మిరప	కాయ తొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా అర్మిగెరా) మచ్చలకాయ తొలుచుపురుగు (స్పోడోప్టెరా ఎక్సిగువా)	30	150	500	3	
ప్రత్తి	అమెరికా కాయ తొలుచు పురుగు (ఎరియాస్ విటెల్లా) పొగాకు లద్దె పురుగు (స్పోడోప్టెరా లిటురా)	30	150	500	9	
వేరుశనగ	పొగాకులద్దె పురుగు	30	150	500	28	
	మొక్క మచ్చల పురుగు	40	200	500	10	
జొన్న	కాయతొలుచు పురుగు, గులాబీ కాండం తొలుచు పురుగు					
బెండ	కాయ తొలుచు పురుగు (అర్మిగెరా మరియు ఇయాస్ విట్టెల్లా)	25	125	500	5	
కంది	కాయ తొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిగెరా) పండుఈగ (మెలనోగ్రోమైజా ఒబ్టుసా)	30	150	500-750	29	
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఇన్సర్టువల్స్) మరియు ఆకు తొలుచు పురుగు (క్నాఫలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	30	150	500	47	
సోయా బీన్	పచ్చ దాసరి పురుగులు (క్రిసోడెక్సిస్ అక్యూటా), కాండంఈగ, గిర్డిల్ పెంకు పురుగు	30	150	500-750	22	
చెరకు	చెదపురుగులు (ఒదొంటోఒబెసస్/మైక్రో టర్మ్స్ ఒబెసి)	100-125	500-625	1000	208	
	పీక పురుగు (స్కిర్పోఫేజ్)	75	375	1000	208	
	ప్రారంభ కాండం తొలుచు పురుగు (చిలోఇన్ఫుస్కాటెల్లస్)	75	375	1000	208	
టొమాటో	కాయ తొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా అర్మిగెరా)	30	150	500	3	

ఉపయోగించుటకు సూచన : (విధానం మరియు సమయం) చెరకు: చెరకు పంటలో చెదపురుగులు మరియు తొలిదశలోని కాండం తొలుచు పురుగు మరియు పీక పురుగుల నివారణకు నేలను తడిపివేయండి. చెరకులో 3వ, 4వ మరియు 5వ సంతతి యగు పీక పురుగుల నుండి నియంత్రణకు జూన్ నెలలో ఇతర పంటలు (వరి, పత్తి, క్యాబేజీ, టమోటా, మిరప, సోయాబీన్, కంది, శనగలు) మట్టిని తడిపివేయాలి. మినుము, కాకర, బెండ) నాప్సాక్ స్ప్రేయర్ని ఉపయోగించి కీటకాల సంఖ్య యొక్క ఆర్థిక స్థోమత స్థాయి (ఇటిఎల్) వద్ద ఆకుల పై పిచికారీ గా ఉపయోగించండి.

ఉపయోగించు సమయం :

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా, లేబుల్తో కూడిన కంటైనర్ను ప్రమాదవశాత్తూ విషప్రయోగం జరిగితే వైద్యునికి చూపించడానికి భద్ర పరుచు కోవాలి. లేబుల్పై ఉన్న అన్ని సూచనలను చదివి అనుసరించండి 2. కంటెంట్లను పీల్చవద్దు. ఉపయోగించేటప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్ళ జోడు ,ముఖ కవచం మరియు రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. పురుగుమందును మిగల్చ రాదు.. 3. పిచికారీ చేసేటప్పుడు తమలపాకులను తినకూడదు, త్రాగకూడదు, పొగ త్రాగకూడదు లేదా నమలకూడదు. 4. పిచికారీ ట్యాంక్ దాని సామర్థ్యంలో 3/4 వంతుకు మించి నింపవద్దు. బ్లాక్ ఐన నాజిల్ను సన్నని తీగ లేదా పిన్తో శుభ్రం చేయాలి. 5. శరీరంపై ఏదైనా చిందినట్లయితే, దానిని పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి. 6. పిచికారీ ముగిసిన వెంటనే ఎల్లప్పుడూ దుస్తులు మార్చుకొని స్నానం చేయండి. 7. తినడం, మద్యపానం లేదా ధూమపానం చేసే ముందు మరియు పిచికారీ చేసిన తర్వాత చేతులు మరియు శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాలను కడగాలి. 8. పునర్వినియోగానికి ముందు కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, శుభ్ర పరచాలి.. 9. ఈ క్రిమిసంహారక మందును వాడుతున్న లేదా ఇటీవల వాడిన వ్యక్తిలో ఏదైనా విషప్రయోగం కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుని పిలవండి.

విష లక్షణాలు: అస్పష్టమైన దృష్టితో తేలికపాటి కంటి చికాకు. ఆవిరి పీల్చడం నాసికా స్రావానికి దారితీయవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : పీల్చినట్లయితేబీ పీల్చడం ద్వారా పదార్థం ప్రమాదకరం కానందున నిర్దిష్ట లక్షణం లేదు.. చర్మంపై అంటినచో : పదార్థం చర్మాన్ని తాకడం ద్వారా ప్రమాదకరం కాదు, కానీ ఉపయోగం తర్వాత చర్మాన్ని శుభ్ర పరచడం మంచిది. కళ్లలోపడితే : పదార్థం కళ్లకు ప్రమాదకరం కాదు, , పుష్కలంగా నీటితో కళ్లను ధారగా కడగండి.

విషత్వం : సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులలో ఉపయోగించినచొ హానికరం కాదు.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు అందుబాటులో లేదు, రోగ లక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

వాడిన కంటైనర్ విసర్జన : తిరిగి ఉపయోగించకూడదని కంటైనర్ , ఖాళీ పాత్రలను ధ్వంసం చేసి, జన నివాసానికి దూరంగ్గా మీటరు లోతైన మట్టిలో పాతిపెట్టాలి. పారవేయడం ద్వారా పర్యావరణం, నీరు లేదా ఆహారాన్ని కలుషితం చేయవద్దు. ఉపరితల నీరు లేదా సానిటరీ మురుగునీటి వ్యవస్థను కలుషితం కానీయ రాదు.

ఖాళీ కంటైనర్లను మరల ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం

నిల్వ పరిస్థితులు: ఆహారం, పానీయం లేదా పొగాకు లను ఈ పదార్థంతో కలుషితమైన ప్రదేశాలలో నిల్వ చేయవద్దు, తినవద్దు. పురుగుమందును గట్టిగా మూసివేయబడిన మూతతో అసలు కంటైనర్లో మాత్రమే నిల్వ చేయండి. బాగా నిర్మించిన, చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు కలుషిత ఆవిరిని నివారించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. పదార్థాన్ని ఆహారం, పశుగ్రాసం, ఇతర పురుగుమందులు మరియు ఎరువులకు దూరంగా తాళం వేసి భద్రపరిచి ఉంచాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ (స.ప .)	18.50% భా/భా
మిథైల్ మెథాక్రిలేట్ ఎథాక్సిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కో-ఆప్లిమర్	3.00% భా/భా
ఎటిలీనోక్సైడ్/ప్రొపైలెనోక్సైడ్ బ్లాక్ కో-పాలిమర్ మరియు ఇథోక్సి లేటేడ్ ఆల్కహాల్	2.00% భా/భా
అట్టపుల్గేట్ క్లే	1.00% భా/భా
జాంథన్ గమ్	0.25% భా/భా
1,2- బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	0.10% భా/భా
సిలికాన్ ఎమల్షన్	0.50% భా/భా
ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్	6.80% భా/భా
నీరు	క్యు ఎస్ % భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైతప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% भार/भार एस सी

(कीटनाशक)

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% भा/भा एस सी (२०% भा/भा) एक अनूठे किस्म का एवजी क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल कीटनाशक है। यह एक बहु आयामी असर वाला कीटनाशक है जिसे धान, पत्तागोभी, कपास, गन्ना, मिर्च, बैंगन, अरहर, चना, उडद, करेला, भिन्डी, मक्का और मुंगफली पर लगने वाले विभिन्न कीटों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की सिफाहिश की जाती है ।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा) लिचुरा, स्पोडोप्टेरा एक्सीगुआ) दाल नली छेदक (रेलीकोनवर्ण आर्मिंगेरा) कलगी वाला पतंगा (एक्सेलैस्टिस एटोमोटमस), मरूक्का नएसपीपी फलिया मक्षी (मेलानोग्रोमाइजा एष्टयूसा) बैंगन और अकुंर तना छेदक (ल्यूसीनॉइड्स औबोनलिस) हरे अर्ध छल्ला कीट (काइसोडेक्सिस एयुटा), तना मक्षी नगरडल बीटल	३०	१५०	५००	३	
चना	फली छेदक (स्पोडोप्टेरा या हेलीकोवर्पा आमींगेरा)	२५	१२५	५००	११	
करेला	फल छेदक (डिफेनिआ, हेलीकोवर्पा आर्मिंगेरा)	२०-२५	१००-१२५	५००	७	
उड़द	फली छेदक (मरुका या स्पोटोप्टेरा)	२०	१००	५००	२०	
बैंगन	बैंगन और अंकुर तना छेदक (ल्यूसीनॉइड्स ऑबेनैलिस)	४०	२००	—	—	
पत्ता गोभी	गोभी के चमकीले पंतगे	१०	५०	५००	३	
मिर्च	फल छेदक (हेरलीकोवर्पा आर्मिंगेरा लिचुरा, स्पोडोप्टेरा एक्सीगुआ)	३०	१५०	५००	३	
कपास	अमेरिकी बोल वर्म, धब्बेदार सुंडी, तम्बाकु की इल्ली	३०	१५०	५००	९	
मूंगफली	तम्बाकू सूडी	३०	१५०	५००	२८	
मक्का	धब्बेदार तना छेदक, गुलाबी तना छेदक	४०	२००	५००	१०	
भिन्डी	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिंगेरा, एरिआस वितेला)	२५	१२५	५	५	
अरहर	दाल फली छेदक (होलीकोवर्पा आर्मीगेरा), फलियां मक्खी (मोलानोग्रोमाइजा ऐव्टयूसा)	३०	१५०	५००-७५०	२२	
धान	तना छेदक तथापत्ता मोडक	३०	१५०	५००	४७	
सोयाबीन	हरे अर्ध छल्ला कीट (काइसोकिसस एयूटा) तना मक्खी गरडल बीटल	३०	१५०	५००-७५०	२९	
गन्ना	दीमक	१००-१२५	५००-६२५	१०००	२०८	
	अलीं शुट बोरर	७५	३७५	१०००	२०८	
	टॉप शुट बोरर	७५	३७५	१०००	२०८	

उपयोग के लिए दिशा -निर्देश : (प्रयोग का समय व तरीक) गन्नाः गन्ने के दीमकों, कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए या वृंत - डंठल या मिट्टी को सरोबोर करें, गन्ने के शीर्ष छेदक कीटों के ३ रे ४ थे तथा ५ वें भ्रण अंडजको नियंत्रण करने के लिए जून महीने में मिट्टी को सरोबोर करना चाहिए । अन्य फसल चावल, कपास और पत्तागोभी, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन और अरहर के मामले में कीट की संख्या जब अर्थिक नुकसान की देहरी (ई टी एल) पर हों तो नैप सैक स्पेयर से छिड़काव करें ।

प्रयोग के समय :

प्रयोगकतांओं के लिए सावधानियाः १. लेबल व पत्रक पर छपे सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, दुर्घटना वश विशाक्तता होने पर लेबल सहित कन्टेनर को सुरक्षित रखें, ताकि डॉक्टर को दिखलाया जाए। २. सामग्री को सूघंना नहीं चाहिए प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीने चश्में, चेहरे का नकाब व सुरक्षात्मक कपड़े पहने हवा की बहाव दिशा में छिड़काव करके स्प्रे के छीटों से बचने का प्रयाप्त करें। ३. छिड़काव के समय न तो खायें, पियें धूम्रपान करें, न हीतंबाकू/पान चबायें। ४. स्प्रे टैंक को $^3/_4$ से ज्यादा क्षमता में नही भरेः नोजल में कणों के फँसने पर मुँह से न फूँके बल्कि पतले तार या पिन से साफ करें। ५. शरीर पर छलकन गिरने की हालत में खूब सारे पानी से साफ करें। ६. छिड़काव उपचार पूरा होते ही हमेशा कपडे बदलें और नहायें भी। ७. खाने, पीने धूम्रपान सेपहले तथा प्रयोग के बाद शरीर केखुले हिस्सों व हाथ-पैर को अच्छी तरह धो लें। ८. दुबारा इस्तेमाल करने से पहले दूषित पकड़े निकाल कर धो लें। ९. जिस किसी ने इस कीटनाशक को हाल में इस्तेमाल किया है या कर हरा हैं, उस पर विषाक्तता के लक्षण ही तुरंत डॉक्टर बुलायें।

विष के लक्षण : आंखो में हलकी जलन व धुंधन दिखना, वाष्प सांस में जाने पर नाक से पानी बहता है।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि सांस में गई हो, तो कोई खास प्रतिक्रिया नही होती क्योंकि सामग्री सांस में जाने पर इतनी खतरनाक नही है, त्वचा पर संपर्क सेदूषित होने से भी सामग्री इतनी खतरनाक नही हो सकती, फिर भी, त्वचा को साफ करना अच्छा ही होता है, आँख से संपर्क होने पर भी यह सामग्री इतनी खतरनाक होने की संभावना नही रखती, फिर संपर्क का असर दिखे, तो खूब सारे पानी से आँखों का पक्षालन करें।

पौधविशाक्तता : सिफीरिश मात्रा प्रयोग करने पर पौधों के लिए विषाक्त नही है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : ये कन्टेनर दुबारा इस्तेमाल के लिए नही होते, खाली कन्टेनरों को नष्ट करके, निवास-स्थान से दूर $^1/_2$ मीटर गहरे मिट्टी में गाइ देना चाहिए, निपटान की चीजों से पर्यावरण, पानी या भोजन संदूषित नही होना चाहिए, निपटान के पानी को पानी की सतह यी सफाई-गटर निकास सिस्टम से बचाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तेः इस सामग्री से संदूषित भोजन, पेय सामग्री या तंबाकू का सेवन न करें। ये सब चीजें संदूषित न होने पायें इस तरह से दवा का भण्डारण करना चाहिए। कीटनाशक सामग्री को उनके मूल कन्टेनर में, अच्छी तरह से बंद करके ठंडी, सूखी जगह में ऐसे कमरे यापरिसर में रखना चाहिए, जो कि हवादार हो और जिसे बंद किया जा सके, ताकि वाष्प से संदूषिण न फैले, कीटनाशक सामग्री को भोजन, जानवरों के जारों, अन्य कीटनाशकों और खादों से अलग ताला चाबी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल (स.तत्व)	१८.५०% भार/भार
मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड सह पोलिमर का निरोप	३.००% भार/भार
ईथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड सहपोलिमर	२.०० % भार/भार
पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहलअटपुलगाइट	१.००% भार/भार
जेनथेन गोंद	०.२५% भार/भार
१,२-बेन्ज़ीसो थिटयाज़ोलिन-३-एकल	०.१० % भार/भार
सिलिकॉन इमल्शन	०.५० % भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	६.८० % भार/भार
जल	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	१००% भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

Amish CROP SCIENCES

LIBERATION SC

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC

(Insecticide)

లిబరేషన్ ఎస్‌సి

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భా/భా ఎస్ సి

(కీటకనాశిని)

लिबरेशन एस सी

क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ % भार/भार एस सी

(कीटनाशक)

ಲಿಬರೇಷನ್ ಎಸ್ ಸಿ

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-244719/2023-Chlorantraniliprole (SC) (443)-362

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

क्लोराँट्रानिलिप्रोल 18.5% व/व एस सी

(कीटकनाशक)

क्लोराँट्रानिलिप्रोल 18.5% व/व एस सी (20% व/आ एक नवीन पर्याय अँथ्रा निला माईड कीटकनाशक आहे. हे. ब्रँड क्ट्रम कीटकनाशक आहे आणि तांदूळ, कोबी, कापूस, ऊस, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगी, कबुतराचा वाटाणा (लाल हरभरा), बंगाल हरभरा, काळा हरभरा, तिखट, भेंडी, मका आणि भुईमूग या पिकांच्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते.

शीफारस :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मी.ली.)		
बंगाल	हरभरा पॉड बोरर (स्पोडोप्टेरा एसपीपी. आणि एच. आर्मिगेरा	25	125	500	11
कारले	फळ बोअरर्स आणि केटर पिलर (डायफनिया एसपी.	20–25	100–125	500	7
ब्लॅक ग्रॅम	पॉड बोरर (मारुका एसपीपी आणि एस. लिटुरा)	20	100	500	20
वांगी	फळ आणि अंकुर	40	200	500–750	3
कोबी	डायमंड बॅक मॉथ	10	50	500	3
मिरची	फ्रूट बोरर (हेलिकव्हरपा आर्मीगेरा) स्पॉटेड लिटुरा, स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ)	30	150	500	3
कॉटन	अमेरिकन बॉल वार्म (इरियास विटेला)	30	150	500	9
तंबाखू	तंबाखू सुरवंट	30	150	500	28
मका	स्पॉटेड स्टेम बोअरर, गुलाबी स्टेम बोअरर	40	200	500	10
भेंडी	फ्रूट बोरर (एच. आर्मिगेरा आणि एरियास विटेला)	25	125	500	5
तूर	हरभरा पॉड बोरर (हेलिकव्हरपा आर्मिगेरा) पॉड फ्लाय (मेलानोग्रोमिझा ओब्टुसा)	30	150	500.750	25
तांदूळ	स्टेम बोअरर (शिरफोफागा इनसरटुलस) आणि लीफ फ्लोडर (नफलो क्रोसिस मेडिनॅलिस)	30	150	500	47
सोयाबीन	ग्रीन सेमीलूपर्स (क्रायसोदेक्सिस एकटा) स्टेम फ्लाय गर्डल बीटल	30	150	500–750	22
उस	दीमक(ओडोन्टोटर्म्स ओबेसीस धमिक्रोटेर्म्स ओबेसी)	100	500.625	1000	208
	टॉप बोरर (स्किर्पोफेज एक्स्पर्टलिस)	75	375	1000	208
	अर्ली शूट बोअरर (चिलो इन्फुस्कॅटेलस)	75	375	1000	208
टोमॅटो	फ्रूट बोरर (हेलिकव्हरपा आर्मिगेरा)	30	150	500	3

वापरण्याची पद्धत : (पद्धत आणि अर्जाची वेळ) ऊसरू ऊस पिकामध्ये दीमक आणि लवकर अंकुर आणि टॉप बोरर यांच्या नियंत्रणासाठी ड्रेंचिंगध्माती ड्रेंचिंग सेट करा. ऊसातील टॉप बोअररच्या 3ऱ्या, 4व्या आणि 5व्या ब्रूडच्या नियंत्रणासाठी अर्ज, जून महिन्यात माती भिजवावी म्हणून इतर पिके (तांदूळ, कापूस, कोबी, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगी, तूर, बंगाल हरभरा) , काळा हरभरा, तिखट, भेंडी) नॅपसॅक स्प्रेअर वापरून कीटक लोकसंख्येच्या ई टी एल येथे पर्णासंबंधी स्प्रे म्हणून वापरा. अर्ज **करण्याची वेळ : –**

खबरदारी : 1. पत्रके काळजीपूर्वक, आकस्मिक विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी लेबल असलेले कंटेनर जतन करा. लेबलवरील सर्व सूचना वाचा आणि त्यांचे अनुसरण करा आणि 2. सामग्री इनहेल करू नका. हाताळताना रबरचे हातमोजे, गॉगल फेसमास्क आणि संरक्षक कपडे घाला. वाऱ्यासह कीटकनाशकाचा वापर करून फवारणीच्या प्रवाहात राहणे टाळा. 3. फवारणी करताना खाऊ, पिऊ, धुम्रपान करू नका किंवा सुपारीची पाने चावू नका. 4. फवारणी टाकी क्षमतेच्या 3ध्4 पेक्षा जास्त भरू नका. अवरोधित नोजल पातळ वायर किंवा पिनने कधीही न उडवून स्वच्छ करा. 5. शरीरावर काही गळती झाल्यास ते भरपूर पाण्याने धुवावे. 6. कीटकनाशक उपचार संपल्याबरोबर नेहमी कपडे बदला आणि आंघोळ करा.7. खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी आणि हाताळल्यानंतर हात आणि शरीराचे असुरक्षित भाग धुवा. 8. पुन्हा वापरण्यापूर्वी दूषित कपडे काढा आणि धुवा. 9. हे कीटकनाशक वापरत असलेल्या किंवा अलीकडे वापरलेल्या व्यक्तीमध्ये विषबाधा दिसून आल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा.

विषबाधाची लक्षणे : अस्पष्ट दृष्टीसह डोळ्यांना हलका त्रास होणे. बाष्प इनहेलेशनमुळे अनुनासिक स्राव होऊ शकतो.

प्रथमोपचार : श्वास घेतल्यासय इनहेलेशनद्वारे सामग्री धोकादायक असण्याची शक्यता नसल्यामुळे कोणताही विशिष्ट हस्तक्षेप दर्शविला जात नाही. त्वचेवर असल्यासरू त्वचेच्या संपर्कामुळे सामग्री धोकादायक असण्याची शक्यता नाही, परंतु वापरल्यानंतर त्वचा साफ करण्याचा सल्ला दिला जातो. डोळ्यांमध्ये असल्यासरू सामग्री डोळ्यांसाठी घातक असण्याची शक्यता नाही.

फायटोटॉक्सिसिटी : शिफारस केलेल्या डोसमध्ये कोणतेही फायटोटॉक्सिक नाही.

अँटीडोट : कोणतेही विशिष्ट उतारा उपलब्ध नाही, सिम्प्टोमॅटिक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : पुन्हा वापर न करण्यासाठी कंटेनर. रिकामे डबे नष्ट करून वस्तीपासून दूर 1/2 मीटर खोल जमिनीत गाडावेत. विल्हेवाट लावून पर्यावरण, पाणी किंवा अन्न दूषित करू नका. पृष्ठभागावरील पाणी किंवा सॅनिटरी सीवर सिस्टमवर फ्लश करू नका.

स्ओरेज अटी : अन्न, पेय किंवा तंबाखू या सामग्रीने दूषित झालेल्या ठिकाणी साठवून ठेवू नका. कीटकनाशक फक्त मूळ कंटेनरमध्ये साठवा. विहीर बांधलेल्या, थंड, कोरड्या जागी घट्ट बंद केलेले, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि बाष्पांपासून दूषित होऊ नये म्हणून ते पुरेसे आकारमान असले पाहिजे. सामग्री कुलूप आणि चावीच्या खाली, अन्न, पशुखाद्य, इतर कीटकनाशके आणि खतांपासून दूर ठेवावी.

रासायनिक रचना

क्लोराँट्रानिलिप्रोल (स.घ)	18.50% व/व
मिथाइल मेथाक्रिलेट इथॉक्सिलेटेड ग्राफ्ट को–ऑप्लायमर	3.00% व/व
इथिलीनॉक्साइडध्प्रॉपिलीनॉक्साइड ब्लॉक को–पॉलिमर	2.00% व/व
आणि इथॉक्सिलेटेड अल्कोहोल अट्टापुल्गाइट चिकणमाती	1.00% व/व
जंठान गम	0.25% व/व
1,2– बेंझिसोथियाझोलिन–3–एक	0.10% व/व
सिलिकॉन इमल्शन	0.50% व/व
प्रोपीलीन ग्लायकॉल	6.80% व/व
पाणी	पुरेसे प्रमाण% व/व
एकूण	100% व/व

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ತೂ/ತೂ ಎಸ್ ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ (20%ತೂ/ಪ) ಒಂದು ನವೀನ ಬದಲಿ ಆಂಥ್ರನಿಲಾಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಭತ್ತ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು, ಟೊಮೇಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬದನೆ, ಕೆಂಪು ಹೆಸರು, ಬೆಂಗಾಲ್‌ಗ್ರಾಂ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ			ಕೋನೆಯ
		ಘಟಾಕಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ವಿಯಿಯಚ)	ಶಿಲೀಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ (ಅ)	ನಾಶಕದ ಬೆರೆಸುದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲಕ್ಷ್ಮಿಷಿಥಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಖಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್	ಪಾಡ್ ಬೋರರ್ (ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಆರ್ಮಿಗೇರಾ)	25	125	500	11
ಹಾಗಲಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು (ಡಯಾಫಾನಿಯಾ ಎಸ್ಪಿ. & ಎಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	20–25	100–125	500	7
ಕಪ್ಪು	ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕೊರಕ (ಮಾರುಕಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ & ಎಸ್. ಲಿಟುರಾ)	20	100	500	20
ಬದನೆ	ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಕೊರಕ (ಲ್ಯೂಸಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಬೊನಾಲಿಸ್)	40	200	500–750	3
ಕ್ಯಾಬೇಜ್	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ (ಪ್ಲುಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ಸಿಲೋಸ್ಟೆಲ್ಲಾ)	10	50	500	3
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಲಿಟುರಾ, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಎಕ್ಸಿಗುವಾ)	30	150	500	3
ಹತ್ತಿ	ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವಾರ್ಮ್ (ಎರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ)	30	150	500	9
ಟಬಾಕೊ	ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ (ಸ್ಪೊಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ) ನೆಲಗಡಲೆ ತಂಬಾಕು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್	30	150	500	28
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ	ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಗುಲಾಬಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು	40	200	500	10
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ (ಎಚ್. ಆರ್ಮಿಗೇರಾ ಮತ್ತು ಎರಿಯಾಸ್ ವಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ)	25	125	500	5
ರೆಡ್‌ಗ್ರಾಮ್	ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕೊರಕ ಪಾಡ್‌ಫ್ಲೈ (ಮೆಲನೊಗ್ರೊಮೈಜಾ ಒಬ್ಟುಸಾ)	30	150	500–750	29
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಶಿರ್ಪೋಫಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟುಲಸ್) ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಫ್ಲೋಡರ್ (ಕ್ನಾಫಲೋಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30	150	500	47
ಸೋಯಾ ಬೀನ್	ಗ್ರೀನ್ ಸೆಮಿಲೂಪರ್ಸ್ (ಕ್ರೈಸೋಡೆಕ್ಸಿಸ್ ಅಕ್ಯುಟಾ) ಕಾಂಡ ನೊಣ,. ಗಿರ್ಡಲ್ ಬೀಟಲ್ (ನೇಫಲೋಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30	150	500–750	22
ಕಬ್ಬಿನ ಗೆದ್ದಲು	(ಒಡೊಂಟೊಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಬೆಸಸ್ /ಮಿಕ್ರೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಬೆಸಿ)	100–125	500–625	1000	208
ಟಾಪ್	ಬೋರರ್(ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಟಾಲಿಸ್)	75	375	1000	208
ಆರಂಭಿಕ	ಚಿಗುರು ಕೊರಕ 75 375 1000 208 (ಚಿಲೋ ಇನ್ಫ್ಯುಸ್ಕಾಟೆಲಸ್)				
ಟೊಮೆಟೊ	ಕಾಯ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೇರಾ)	30	150	500	3

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ : (ಅಳವಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ) ಕಬ್ಬು: ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಗುರು ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್/ಮಣ್ಣು ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ 3, 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸಂಸಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು (ಅಕ್ಕಿ, ಹತ್ತಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬದನೆ, ಪಾರಿವಾಳ, ಬೆಂಗಾಲಿ. ಕಾಳು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ) ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ 2. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಬೇಡಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 4. ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 3/4 ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿ ತುಂಬಬೇಡಿ. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೀಸಬೇಡಿ. 5. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟುನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 6. ಕೀಟನಾಶಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. 7. ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 8. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿರಿ. 9. ಈ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಿ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮೂಗಿನ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ; ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ: ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವಸ್ತುವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ: ವಸ್ತುವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿದೀಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಂಟೈನರ್. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ೧ ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ವಿಲೇವಾರಿ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ, ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದ ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶೇಖರಣಾ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ (ಸ. ಘ.)	18.50% ತೂ/ತೂ
ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಹ–ಆಪ್ಲಿಮರ್	3.00% ತೂ/ತೂ
ಎಟಿಲೀನಾಕ್ಸೈಡ್/ಪ್ರೊಪಿಲೀನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋ–ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು	2.00%ತೂ/ತೂ
ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಟ್ಟಪುಲ್ಗೈಟ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು	1.00% ತೂ/ತೂ
ಜಂಥನ್ ಗಮ್	0.25% ತೂ/ತೂ
1,2– ಬೆಂಝಿ ಸೊಥಿಯಾ ಝೋಲಿನ್ –3–ಒಂದು	0.10% ತೂ/ತೂ
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಎಮಲ್ಷನ್	0.50% ತೂ/ತೂ
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	6.80% ತೂ/ತೂ
ನೀರು	ಕ್ಯೂ ಎಸ್ % ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

கூளே ோரான்ட்ரானிலிப்ரே ோல் 18.5% வ்/வ் ஸ்சி

(பூச்சிக்கொல்லி)

கூளே ோரான்ட்ரானிலிப்ரே ோல் 18.5% வ்/வ் ஸ்சி (20% வ்/வ) ஆந்த்ரானிலாமைடு பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு ஒரு புதுமையான மாற்றாகும். இது ஒரு பரோட் ஸ்பெக்ட்ரம் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் நெல், முட்டைக்கோஸ், பருத்தி, கரும்பு, தக்காளி, மிளகாய், சோயாபீன், பிரிஞ்சி, புறா பட்டாணி (சிவப்புப்பயறு), வங்கப்பயறு, உளுந்து, பிட்டர்கோர்ட், ஓக்ரா, சோளம் மற்றும் நிலக்கடலை பயிர்களின் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

ரெகமெண்டேஷன் :

£ºº	@|õ#PÎß ö£õx¨ ö£¬º	öíU@h¸USz @uøÁ¨£k® •»¨ö£õ¸Ò (Sµõ®PÎÀ)	P»øÁ ©¸¢uÎÄ (Qµõ®PÎÀ)	]µÎÄ (¼mhºPÎÀ)	Pøh]öuÎ¨ ¦US® AÖÁ øhUS® Cøh¨£mh Põ»® (|õmPÎÀ
பெங்கால்	பாட் பே ோரர் (ஸ்பே ோடே ோப்டெரா	25	125	500	11
கிராம்	எஸ்பிபி. மற்றும் எச்.ஆர்மிகரோ) கசப்புப் பழங்களைத் துளைப்பவர்கள் மற்றும் உணவளிப்பவர்கள் சுரைக்காய் தூண்கள் (டயபானியா எஸ்பி. மற்றும் எச்.ஆர்மிகரோ)	20-25	100-125	500	7
கரும்பு	ள்ளி துளைப்பான் (மருகா எஸ்பிபி கிராம் மற்றும் எஸ். லிதுரா)	20	100	500	20
பிரிஞ்சி	பழம் மற்றும் தளிர் துளைப்பான் (லூசினாய்டுகள் ஆர்பனாலிஸ்)	40	200	500-750	3
முட்ட	கைக்கே ோஸ் டயமண்ட் பேக் மே ாத் (பியுடெல்லா சலைே ோஸ்டெல்லா)	10	50	500	3
மிளகாய்	காய் துளைப்பான் (ஹெலிகே ோவர்பா ஆர்மிகரொ) புள்ளிகள் கொண்ட லிதுரா, ஸ்பே ோடே ோப்டரொ எக்ஸிகுவா)	30	150	500	3
காட்டன்	அமரிெக்கன் பே ோல் வார்ம் (ஈரியாஸ் விட்டெல்லா) தபாகூ கம்பளிப்பூச்சி (ஸ்பே ோடே ோப்டரொ லிதுரா)	30	150	500	9
தரை	புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி	30	150	500	28
நட்டு	மக்காச்சே ோள புள்ளி நீராவி துளைப்பான், பிங்க் நீராவி துளைப்பான்	40	200	500	10
ஒகாரா	பழம் துளைப்பான் (எச். ஆர்மிகரோ மற்றும் ஈயாஸ் விட்டெல்லா)	25	125	500	5
புறா	பருப்பு நற்றெு துளைப்பான் (ஹெலிகே ோவர்பா	30	150	500-750	29
பட்டாணி	ஆர்மிகரொ) நற்றெு ஈ (மலெனே ோக்ரே ோமசைா ஒப்டுசா)				
நலெ்	தண்டு துளைப்பான் (ஷிர்பே ோபாகா நிச்சயமற்றவர்கள்)மற்றும் இலை மலர்கள் (க்னாபலே ோக்ரே ோசிஸ் மடெினலிஸ்)	30	150	500	47
சே ோயா	கிரீன் சமெிலூப்பர்ஸ் பீன் (கிரிசே ோடெக்சிஸ் அகுடா) தண்டு ஈ கர்டில் வண்டு	30	150	500-750	22
சர்க்கரை	கரையான்(ஓட ோன்டே ோடெர்ம்ஸ் கரும்பு பருமன்/மைக்ரே ோடெர்ம்ஸ் ஒபசேி)	100-125	500-625	1000	208
மலே்	துளைப்பான் (ஸ்கிர்பே ோபஜே் மற்கே ோள்)	75	375	1000	208
ஆரம்ப	கால துவாரப்பான் (சிலே ோ இன்புஸ்கடெல்லஸ்)	75	375	1000	208
தக்காளி	பழம் துளைப்பான் (ஹெலிகே ோவர்பா ஆர்மிகரொ)	30	150	500	3

பயன்படுத்தும் திசை : (பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரம்) கரும்பு: கரையான் மற்றும் ஆரம்ப தளிர் துளைப்பான் மற்றும் மேல் துளைப்பான் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த கரும்பு பயிரில் நனைத்தல்/மண்ணை நனைத்தல். கரும்பில் மேல் துளைப்பான் 3வது, 4வது மற்றும் 5வது குஞ்சுகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து, ஜூன் மாதத்தில் மற்ற பயிர்களான (அரிசி, பருத்தி, முட்டைக்கே ோஸ், தக்காளி, மிளகாய், சே ோயாபீன், பிரிஞ்சி, புறா, வங்கல் பருப்பு) மண்ணை அள்ள வேண்டும். , உளுந்து, பிட்டர்கே ோர்ட், ஓக்ரா) நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயரைப் பயன்படுத்தி பூச்சிகளின் ETL இல் இலைத் தெளிப்பாகப் பயன்படுத்தவும்.

விண்ணப்ப நேரம்: -

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. துண்டுப்பிரசுரம் கவனமாக, தற்செயலான விஷம் ஏற்பட்டால், டாக்டருக்குக் காண்பிப்பதற்கான லேபிளுடன் கொள்கலனை சேமிக்கவும். லேபிளில் உள்ள அனைத்து வழிமுறைகளையும் படித்து பின்பற்றவும் மற்றும் 2. உள்ளடக்கங்களை உள்ளிழுக்க வேண்டாம். கையாளும் போது ரப்பர் கையுறைகள், கண்ணாடி முகமூடி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். காற்றுடன் பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெளிப்பின் சறுக்கலில் தங்குவதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிக்கும் போது வெற்றிலையை உண்ணவோ, குடிக்கவோ, புகைபிடிக்கவோ அல்லது மெல்லவோ கூடாது. 4. தெளிப்பு தொட்டியை அதன் கொள்ளளவில் 3/4 வது பங்கிற்கு மேல் நிரப்ப வேண்டாம். தடுக்கப்பட்ட முனையை ஒரு மெல்லிய கம்பி அல்லது முள் மூலம் சுத்தம் செய்யவும். 5. உடலில் ஏதேனும் கசிவு ஏற்பட்டால், அதை ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். 6. பூச்சிக்கொல்லி சிகிச்சை முடிந்தவுடன் எப்பொழுதும் உடைகளை மாற்றிக் கொண்டு குளிக்க வேண்டும். 7. சாப்பிடுவதற்கும், குடிப்பதற்கும் அல்லது புகைபிடிப்பதற்கும் மற்றும் கையாளுவதற்குப் பிறகும் கைகள் மற்றும் உடலின் பாதுகாப்பற்ற பாகங்களைக் கழுவவும். 8. மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி துவைக்கவும். 9. இந்தப் பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தும் அல்லது சமீபத்தில் பயன்படுத்திய ஒருவருக்கு ஏதேனும் விஷம் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: மங்கலான பார்வையுடன் லேசான கண் எரிச்சல். நீராவி உள்ளிழுக்கும் நாசி சுரப்பு ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: உள்ளிழுத்தால்; உள்ளிழுப்பதன் மூலம் பொருள் அபாயகரமானதாக இருக்காது என்பதால் குறிப்பிட்ட தலையீடு எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. தோலில் இருந்தால்: தோல் தொடர்பு மூலம் பொருள் அபாயகரமானதாக இருக்காது, ஆனால் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தோலை சுத்தம் செய்வது நல்லது. கண்களில் இருந்தால்: பொருள் கண்களுக்கு ஆபத்தாக இருக்க வாய்ப்பில்லை, ஆனால் தொடர்பு ஏற்பட்டால், கண்களை ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும்.

பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் பைட்டோடாக்ஸிக் இல்லை.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை, அறிகுறியாக சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுதல்: மீண்டும் பயன்படுத்தாததற்காக கொள்கலன். வெற்றுப் பாத்திரங்களை அழித்து 1/2 மீட்டர் ஆழமான மண்ணில் மக்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து புதைக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழலையோ, தண்ணீரையோ அல்லது உணவையோ அப்புறப்படுத்துவதன் மூலம் மாசுபடுத்தாதீர்கள். மேற்பரப்பு நீர் அல்லது சுகாதார கழிவுநீர் அமைப்புக்கு சுத்தப்படுத்த வேண்டாம்.

வெற்றுக் கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது

சேமிப்பு நிலைமைகள்: உணவு, பானம் அல்லது புகையிலை இந்த பொருளால் மாசுபட்ட இடங்களில் சேமித்து உட்கொள்ள வேண்டாம். பூச்சிக்கொல்லியை அசல் கொள்கலனில் மட்டுமே சேமிக்கவும். நன்கு கட்டப்பட்ட, குளிர்ந்த, வறண்ட இடத்தில் இறுக்கமாக மூடப்பட்டு, நன்கு வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவிகளால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும். உணவு, கால்நடை கட்டணம், பிற பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உரங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி, பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் பொருள் வைக்கப்பட வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

கூளே ோரான்ட்ரானிலிப்ரே ோல் (a.i.)	18.50% வ்/வ
மெத்தில் மெதெக்ரிலேட் எத்தாக்சிலேட்டட் கிராஃப்ட் கே ோ-ஆப்லிமர்	3.00% வ்/வ
எட்டிலினாக்சைடு/புரே ோப்பிலீனாக்சைடு தொகுதி	2.00%வ்/வ
இணை பாலிமர் மற்றும் எத்தாக்சிலேட்டட் ஆல்கஹால்	
அட்டாபுல்கிட் களிமண்	1.00% வ்/வ
சாந்தன் கம்	0.25% வ்/வ
1,2- பென்சிசே ோதியாசே ோலின்-3-ஒன்று	0.10%வ்/வ்
சிலிகான் குழம்பு	0.50% வ்/வ
ப்ரே ோபிலீன் கிளைகே ோல்	6.80% வ்/வ
நீர்	யூ எஸ் %வ்/வ
மொத்தம்	100% வ்/வ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/ துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROPSCIENCES

LIBERATION SC

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC

(Insecticide)

లిబరేషన్ ఎస్‌సి

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భా/భా ఎస్ సి

(కీటకనాశిని)

लिबरेशन एस सी

क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ % भार/भार एस सी

(कीटनाशक)

ಲೆಬರೇಷನ್ ಎಸ್ ಸಿ

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-244719/2023-Chlorantraniliprole (SC) (443)-362

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE