Hexaconazole 5% SC
(Systemic Fungicide)

Hexconazole 5% SC is a systemic fungicide used for the control of powdery mildew of mango & Sheath blight of rice.

Recommendation :

Crop	Common Name of the Diseases	Dosage/H.A A.I. (gm/%)	Formulation (ml%)	Dillution in (Ltrs)	Waiting Period between last spray to Harvest (days)
Mango	Powdery Mildew	0.01% or 10 g/100 lit Water	0.2% or 200 ml/ 100 lit. water	As required depending on size of tree and plant protection equipment used	27
Rice	Sheath blight	50gm	1000ml	500	40

Direction of use :

a) Preparation of spray mixture : Take the required quantity of Hexaconazole 5% SC dilute with a little as per spray plume required and mix well again string.

b) Plant Protection Equipment : The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Rocking sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer and ASPEE HTP Power sprayer.

Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible with the commonly used insecticide and fungicides.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the tody after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Limitations and Cautions for use : Do not use in those situation in there is possibility of harming bees and fish. Live stock, game, wild bird and animals.

Phytotoxicity : Hexaconazole 5% SC is not phytoxic when used as per recommendations. Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible commonly used insecticides and fungicides.

Symptoms of Poisoning : Nervousness, Anxiety, tremors, convulsions, allergic manifestions may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated skin with copious amount of soap and water. 3, If eyes are containinated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used Container : 1. Used packages or surplus materials and washings of the fungicides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages Shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate admirals under lock key depending upon the quantity and the nature of the fungicide. 2. The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition :

Hexaconazole technical (Min.purity 92%)	5.430% w/w
Propylene glycol	5.000% w/w
Emulsifiers A (Blend of polyoxyethlene polyoxypropylene ethers and calcium salt of alkyl)	3.000% w/w
Emulsifiers B (Amine salt of polyalkyl aryl ether phoshate)	3.000% w/w
Emulsifiers C	2.500% w/w
Potassium Phosphite	10.000% w/w
Polysaccharide	0.200% w/w
Defoamer	0.250% w/w
Distilled /D.M. Water	68.120% w/w
Wetting and dispersing Agent (Sodium salt of Fatty alcohol)	2.500% w/w
Total	100.000% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्बन सान्द्रण
(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी एक अंततवाही फफूंदनाशक है। यह आम पर होने वाले चूर्णी आसिता एवं धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

उपयोगः

फसल	रोग के सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर स.तत्व. ग्राम/प्रतिशत	संरचना प्रतिशत/मि.ली.	पानीकी मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव व कटाई के बीच के अंतराल (दिन)
आम	चूणी आसिता रोग	०.०१ प्रतिशत या १० ग्राम/१०० ली	०.०२प्रतिशत या २०० मि.ली/ १०० ली पानी	पेड़ के आकार और स्प्रेयर के प्रयोग के अनुसार	२७
धान	पर्णच्छद अंगमारी	५० ग्राम	१००० ली	५००	४०

उपयोग के लिये निर्देश –

अ) छिड़काव घोल की तैयारी : हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी की निर्धरित मात्रा को पहले थोड़ा पानी पानी में अच्छी प्रकार मिलायें इसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी है मिलायें और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलायें। ब) पौध सुरक्षा यंत्र-हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत वि एस सी का छिड़काव जो सरलता से उपलब्ध छिड़काव यंत्र जैसे-पीठ पर लटकाने वाला, पाँव चालित तथा दबावदार पीठ पर लंकाने वाला छिड़काव यंत्र व दवावदार शक्ति चालित छिड़काव यंत्र पस्पी एच टी पी छिड़काव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

अनुरूपताः हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी आमतौर पर प्रयोग मे आने वाले सभी फफूँदनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है।

प्रयोग की सीमाएं एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जानवरों, खेल, जंगली नावरों को हानि की सम्भावना हो, ऐसे स्थान पर छिड़काव न करें।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खा।द्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाप्प को सांस व्दारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

प्रयोग की सीमाएँ एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जामवरों खेल, जंगली चिड़िया एवं जानवरों के हानि की सम्भावना हो, ऐसी रथान पर छिड़काव न करें।

पौध विशाक्तता : निदेर्शों के अनुसार प्रयोग करने पर हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी जहरीला नहीं है।

विष के लछणः घबराहट होना, उतेजना, केंपकंपी, झटके (मिर्गी), एलर्जी की शिकायत हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तव तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दैं आर दें और दूषित त्वचा त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइल/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक नही है, लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को तोड़कर इन्हें आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए। २. खाली डिब्बों का पुना प्रयोग रोकने के लिए इन्हें बाहर मत फेंकें। ३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान, मशीन की धोवन का निपटारा सावधानी पुवर्क करें जिससे जल या वायु प्रदुषण नहों।

संग्रहण की शते : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग रथान या कमरे में उस स्थान या कमरे से दूर संग्रहित करें जहाँ अन्य वस्तुओं खासतौर पर खाद्य पदार्थो या पशु चारे का संग्रहण किया गया हो। अन्यथा इन की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इनका संग्रहण अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें। २. संग्रहण का स्थान या कमरा रोशनी से पूर्ण, मजबूत बनावट का, शुष्क,ठंडा तथा हवादार हो। कमरा पर्याप्त लम्बाई-जौझाई का होना चाहिए जिससे वायु द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	५.४३०% भार/भार
प्रोपाईर्लीन ग्लाइकोल	५.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस ए : पोलीओक्सीजाइर्थिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइर्लिन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट का मिश्रण	३.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काइर्ल एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	३.०००% भार/भार
एमल्सिफायर्स सी	२.५००% भार/भार
घोलने और फैलाने वाले तत्व (फैटी एल्कोहोल का सोडियम साल्ट)	२.५००% भार/भार
पोटाशियम फोसफाइट	१०.०००% भार/भार
पोलीसैचाराइड	०.२००% भार/भार
डीफोमर	०.२५०% भार/भार
पानी	६८.१२०% भार/भार
कुल	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

హెక్సాకొనాజోల్ 5% ఎస్‌సి
(అంతర్వాహక శిలీంధ్రనాశిని)

హెక్సాకొనాజోల్ 5% ఎస్‌సి మామిడి మరియు ద్రాక్ష పైర్లనాశించు బూడిదతెగులు మరియు వరిపైరునాశించు పొడతెగులును అరికట్టుటకు ఉపయోగించబడు అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని.

సిఫారసులు :

పైరు	తెగుళ్ళ సాధారణ నామం	హెక్టారుకు మోతాదు స.ప. (గ్రా%)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీరు పరిమాణము	చివరి పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వ్యవధి రోజులలో
మామిడి	బూడిద తెగులు	0.01% లేక 10గ్రా/100లీ. నీటిలో	0.2%లేక 200మి.లీ/100లీ నీటిలో	మొక్క ఎత్తు మరియు ఉపయోగించు యంత్ర పరికరమును	27
వరి	పొడతెగులు	50గ్రా	1000 మి.లీ.	500	40

మందు ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఎ) మందు మిశ్రమము తయారు చేయు విధానము : హెక్సాకొనాజోల్ 5% యస్.సి. ని అవసరమైన పరిమాణములో తీసికొని కొద్ది నీటి పరిమాణములో కరిగించి బాగుగా కలపవలెను. తరువాత మిగిలిన నీటిపరిమాణమును కలిపి బాగుగా కలియత్రిప్పవలెను. బి) సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరములు : సాధారణముగా ఉపయోగించు బక్కెట్టు స్ప్రేపంపు, రాక్ స్ప్రేపంపు, తొక్కుడు స్ప్రేపంపు, వీల్‌బ్యారో స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు బ్యాటరీ నాప్‌సాక్ స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రే పంపు మరియు ఆస్పీ హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేపంపులను ఉపయోగించవచ్చును.

మందు కలిసే గుణము : హెక్సాకొనాజోల్ 5% యస్.సి. సాధారణముగా ఉపయోగించు అన్ని కీటకనాశినులు మరియు శిలీంధ్రనాశినులతో కలపి ఉపయోగించవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్ధములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములను దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు మందు ద్రావణమును తగుల నీయరాదు. 3. మందు ద్రావణము పీల్చరాదు, గాలి వాటముగనే పిచికారి చేయవలెను. 4. పిచికారి తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు పొగపీల్చుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

మందు ఉపయోగించుటకు పరిమితులు మరియు హెచ్చరిక : తేనెటీగలు, చేపల పెంపకము, పశువులు, పక్షులు, ఆటస్థలములుకు హాని చేయు పరిస్థితులలో మందును ఉపయోగించరాదు.

విషతుల్యత : దీనిని సిఫారసు చేసిన మోతాదులలో ఉపయోగించినచో విషతుల్యము కాదు.

విషలక్షణములు : నరములు స్వాధీనములో లేకపోవుట, ఉత్సుకత, వణుకు కండరములు స్వాధీనములో లేకుండుట మరియు దద్దుర్లు వంటివి కనబడవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో - గొంతు వెనుకభాగమును ప్రేరేపించి మింగిన ద్రావణం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు మరల మరల వాంతులు చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న రోగికి వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో - కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుచు కొనవలెను. 3. కళ్ళలో పడినచో - సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 - 15 ని॥ల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో - రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగ లక్షణములను బట్టి చికిత్సను అందించండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల విసర్జన : 1. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన ద్రవం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు కలుషితం కానీ రీతిలో విసర్జించాలి.

మందు నిల్వ : 1. శిలీంధ్రనాశినులను వేర్వేరు గదులలో ప్రత్యేకముగా ఆహారపదార్థాలకు దూరంగా తాళం వేసి భద్రపరచవలెను. 2.శిలీంధ్రనాశినులను నిల్వ ఉంచు గదులు, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో చల్లని, పొడిగా మరియు కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

హెక్సాకొనాజోల్ టెక్ని (92% స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	5.430% భా/భా
ప్రొపిలిన్ గ్లైకొల్	5.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ ఎ (బ్లెండ్ ఆఫ్ పాలి ఆక్సిఇథిలిన్ ఈథర్స్ పాలిఅక్సిప్రోపాఇథిలిన్ ఈథర్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ అల్కిల్ బెంజిన్ గ్లైఫోనెట్)	3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ బి (అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ పాలి అల్కిల్ అరిల్ ఈథర్ ఫాస్ఫేట్,	3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ సి	2.500% భా/భా
పొటాషియం ఫాస్ఫైట్	10.000% భా/భా
పాలీ సాకరైడ్	0.200% భా/భా
డిఫోమర్	0.250% భా/భా
డిస్టిల్డ్/డి.యం.వాటర్	68.120% భా/భా
వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫాని అల్కహాల్)	2.500% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

ONEHEX
Hexaconazole 5% SC
(Systemic Fungicide)

వన్‌హెక్స్
హెక్సాకొనాజోల్ 5% ఎస్‌సి
(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

वनहेक्स
हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्वन सान्द्रण
(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಒನ್‌ಹೆಕ್ಸ್
ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ.
(ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा అపాయము
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR - 130769/2015 - Hexaconazole (SC) (354)-492

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

हेक्झाकोनाझोल ५% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक)

हेक्झाकोनाझोल ५% एस.सी. हे एक अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक असून त्याचा प्रयोग आंबे आणि द्राक्षाच्या पीकांवरील पिष्टमय बुरशी आणि तांदळाच्या पीकावरील कवच विनाशी (शिथ ब्लाईट)यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो.

शिफारसी :

पीक	रोगाचे सर्व सामान्य नांव	प्रति हेक्टेयर ए.आय. ग्राम%	सुत्रीकरण मि.ली.%	प्रमाण सौम्यीकरण पाण्यांत (लिटर)	प्रतिक्षा अंवधि शेवटची फवारणी बकटई स्तंत (दिवस)
आंबा	पिष्टमय बुरशी	०.०१ किंवा १० ग्रा/१०० लिटर पाणी	०.२% कींवा २००मि.ली./१०० लिटर पाणी	झाडाचे आकारमान आणि झाड संरक्षक म्हणूरन वापरलेले साधन यावरअवलंबून	२७
तांदुळ	कवच विनाशी (शिथ ब्लाईट)	५० ग्रा	१००० मि.ली.	५००	४०

प्रयोग करण्या संबंधी सुचना :

अ) फवारणी साठी मिश्रण तयार करणेः शिफारसीनुसार आवश्य त्या प्रमाणात हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. घेवून त्यांत अगदी थोडे पाणी मिसळा ते एकजीव करा व नंतर त्यांत शिफारस केलेल्या पाण्याच्या प्रमाणातूनं ऊरलेले पाणी मिसळा व चांगल्या तऱ्हेने ढवळून योग्य असे फवारणी मिश्रण तयार करा. ब) रोप संरक्षक साधने : सर्व सामान्यः वापरली जाणारी साधने आहेत-बकेट (बादली) पंप फवारक, ऊसळणारा पंप फवारक, रॉकींग पंप फवारक, पायाव्दारे चालविण्यांचा फवारक, हाथगाडीचा फवारक, दबावाचा नॅपसॅक (पाठी वर लादण्याचा फवारक) दबावाचा नॅपसॅक बॅटरी संचालीत फवारक आणि ॲस्पी एचटीपी शक्ती संचालित फवारक.

अनुकुलता : सर्वसाधारणतः वापरल्या जाणाऱ्या कीटनाशक व बुरशीनाशका बरो बर वापसण्यास हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. हे अनुकुल आहे.

सावधगिरी : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थांचे रिकामे डबे तसेच पशुखाद्य यां पासून दुर ठेवा. २. मुखडोळे व त्वचा यांच्याशी संसर्ग टाळावा. श्वसनाव्दारे आत जाणार नाही याची काळजी ध्या. वाऱ्याच्या दिशेनेच फवारणी करा. ३. फवारणीचे धुके/तुषार. ४. फवारणी केल्यानं तर दुषित झालेले कपडे तसेच शरीराची विविध अंगे चांगल्या रीतीने स्वच्छ धुवुन टाका. ५. फवारणी करतांना खाणे पिणे चावणे/चधळणे अथवा धुम्रपान करण्या सक्त मनाई आहे. ६. फवारणीचे मिश्रण तयार करतांना आणि फवारणी करतांना संपूर्णपणे सुरक्षित असा पोषाक धारण करावा.

प्रयोगाच्या मर्यादा आणि बाळगावयाची खबरदारी : फवारणी करतेवेळी जर मधमाशा मासे, पशुधन जंगली जनावरे व पक्षी यांना हानी पोहोचणार असेल तर अशावेळी फवारणी करू नये.

वनस्पती विषक्तता : दिलेल्या शिफारसीनुसार जर हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. चा प्रयोग करण्यात आला तर तो वनस्पती विषबाधाकरक होत नाही.

विषबाधेची लक्षणेः जीव घाबरा होणे चिंता, आंचके येणे, स्नायुंची निरंकुश हालचाल, तसेच प्रत्युर्जतेचे प्रकार ऊदभवण्याची शक्यता असते.

प्रथमोपचार : १.जर गिळले गेले असेल तर घशाच्या मागील भागास गुदगुल्या करून रोग्यास ऊलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. ऊलटीव्दारा निघणारे द्रव निवळेपर्यंत ही क्रीया वारंवार करीत रहावी रोगी बेशुध्दावस्थेत असेल तर त्याला ऊलटी करण्यास प्रवृत करूनये. २. जर कपडे आणि त्वचा दुषित झाली असले तर दुषित कपडे काढून टाकावेत. संदुषित त्वचा भरपुर पाणी व साबणाने स्वच्छ धुवुन टाकावी. ३. जर डोळे दुषित झालें असतील तर त्यांना भरपूर खाऱ्या/स्वच्छ पाण्याने १० ते १५ मिनीटे पर्यंत धुवावे. ४. जर श्वसनाव्दारे आंत ओढले गेले असेल तर रोग्यास लगेच ताज्या हवेत धेवुन जावे.

निवारक प्रतिऊपचार : कोणताहि विशिष्ट निवारक प्रतिऊपचार माहीत नाही. लक्षणांवर आधारित ऊपाययोजना करावी.

वापरुनझालेल्या डब्बयांची विल्हेवाट : १. वापरून झालेले रिकासे डब्बे, वापरून ऊरलेले अतिरिक्त पदार्थ आणि बुरशीनाशकाचे मिश्रण बनविण्यासाठी तसेच फवारण्यासाठी वापरलेली साधने यांना धुवुन मिळालेले धोवण यांची विल्हेवाट सुरक्षित पध्दतीने करावी जेणेकरून पर्यावरण आणि पाणी यांच्या प्रदुषणास प्रतिबंध होवु शकेल. २. वापरून झालेल्या रिकाम्या पाकीटांची तोडफोड करून त्यांना रहीवासी वस्ती पासून दुर जमीनीत गाडुन टाकावे.

संग्रहण व्यवस्था : १. बुरशीनाशकाने भरलेली पाकीटे स्वतंत्र अशा वेगळया खोल्यात अगर रतीत, अन्य पदार्थ संग्रहण विशेशतः खाद्यपदार्य संग्रहण स्थानापासूसन दुर असेल अशा ठीकाणी संग्रहित करावीत ही पाकीटे स्वतंत्र अशा वेगळया कपाटांत देखील संग्रहीत केलीजावु शकतात पण अशी व्यावस्था बुरशीनाशकाचा प्रकार आणि त्याचे आकारमान यावर अबलंबून राहील. २. संग्रहणासाठी निवडलेले स्थान हे थंड, शुष्क मजबूत बांधणीचे, भरपुर प्रकाशमय व खेळती हवा असलेले व पुरेशा आकारमानाचे असावे.

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	५.४३०% व/व
प्रोपाइर्लीन ग्लाइकोल	५.०००% व/व
एमल्सिफायरस ए :पोलीओक्सीजाइर्थिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइर्लिन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट चे मिश्रण	३.०००% व/व
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काईल एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	३.०००% व/व
एमल्सिफायर्स सी	२.५००% व/व
पोटाशियम फोसफाइट	१०.०००% व/व
पोलीसैचाराइड	०.२००% व/व
डीफोमर	०.२५०% व/व
डिस्टिल्ड/डि.आम.वाटर	६८.१२०% व/व
वेट्टिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट :(सोडियम साल्ट आफ फानि अल्कहाल)	२.५००% व/व
एटकूल	१००.०००% व/व

खबरदारी : हया लेबल /हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ. ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಶೀಲಿಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹರಡುವ ಬೂದಿರೋಗ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹರಡುವ ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆರೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

¹¥sÁgÀ¸ï

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎ.ಐ. ಅಥವಾ %	ಗ್ರಾಂ. (ಲೀಟರ್)	ಕರಗುವಿಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಮಾವು	ಬೂದಿ ರೋಗ	0.01% ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ/100 ಲೀ ನೀರಿಗೆ	0.2% ಅಥವಾ 200 ಎಂ.ಎಲ್/ 100 ಲೀ ನೀರಿಗೆ	ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಆಧರಿಸಿ	27
ಭತ್ತ	ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ	50 ಗ್ರಾಂ	1000 ಎಂ.ಎಲ್	500	40

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5%ಎಸ್.ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಸುವಿಕೆ : ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ, ಸ್ಪೆಯರ್‌ಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೈ ಪಂಪು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್, ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪಂಪ್, ಪವರ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಆಸ್ಪೆ ಪಂಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಾಜಲ್‌ನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಿಪ್‌ಪಂಪ್‌ಗೆ ಫ್ಲಡ್‌ಜೆಟ್‌ನಾಜಲ್, ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಬೇರೆ ನಾಜಲನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಬಿಳುವ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಔಷಧಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ :- ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪಾನಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನಾದರೂ ಅಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.ಔಷಧಿ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿ ತಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಿಚಕಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಸಬಾರದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗವಿಕೆ:ಇದನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬೆವರು ಸೂಸುವಿಕೆ, ಮಂಕಾಗುವಿಕೆ, ಕೆಮ್ಮು ಶೀನು, ತಲೆನೋವು, ವಿಕಾರತೆ, ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1.ರೋಗಿಗೆ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ವಾಂತಿ ಬರುವಂತೆ ಕಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 3.ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಜೊತೆ ಬಳಸುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು.

ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರ : ಅಂತಹದೇ ಔಷಧಿಯಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1. ಸ್ಪ್ರೆಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಪಂಪು, ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಗೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬದಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ : 1. ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಣಬೇಕು. 2. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. 3.ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳೆದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಬೀಳದಿರುವ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. 2. ಅಪ್ಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ

ಹೆಕ್ಸಾಕೇನಜೋಲ್ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ (92% ಸ್ವಚ್ಛತ್ ಆಧಾರಗ್)	5.430% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪ್ರೋಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	5.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಎ (ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿಇಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಪ್ರೋಪಾಇಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಗ್ಲೈಫೋನೆಟ್)	3.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಬಿ (ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಲಿ ಅಲ್ಕಿಲ್ ಅರಿಲ್ ಈಥರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್)	3.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಸಿ	2.500% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೆಟ್	10.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪೋಲೀಸೈಚಾರೈಡ್	0.200% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಫೋಮರ್	0.250% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್/ಡಿ.ಯಂ.ವಾಟರ್	68.120% ತೂಕ/ತೂಕ
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾನಿ ಅಲ್ಕಹಾಲ್)	2.500% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೊತ್ತಂ	100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ஹெக்சகோனசோல் 5%எஸ்.சி.

(சிஸ்டமிக் பூஞ்சை கொல்லி)

ஹெக்சகோனசோல் 5% எஸ்.சி. ஏரு சிஸ்டமிக் பூனுசை கொல்லி மாங்காய், தீராட்டையிவ் ஏற்டும் சாம்பல் நோய் மற்றும் நெவ்லை தாக்கும் இலையுறைக்கருகவ் நோயை கட்டுப்படுத்துதிறது.

பரிந்துரை :

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	ஊட்டுஅளவு/ஹெ ஏ.ஐ. (கி/%)	சூத்திர மாக்கல்	நீர்த்தல் (லி)	கால இடைவெளி கடைசி செளிப்பிலிருந்து அநுவடை வரை
மாங்காய்	சாம்பவ் நோய்	0.01%(அ) 10கி/100லி-நீரில்	0.2%(அ) 200 மி.லி/ 100லி-நீரில்	மர அளவு, பயன்படுத்தும் தாவரப்பா துகாப்பும் சாதனத்தை பொருத்து	27
நெல்	இலையுறை நோய்	50கி	1000 மி.லி	500	40

பயன்டடுத்தும் முறை :

1. கலவை தயாரிக்கும் முறை : தேவையான அளவு ஹெக்ச கோனசோல் 5% எஸ்.சி. எடுத்து குறைந்த நீரிவ் கரைத்து, மிகமுள்ள நீரினை கலந்து மற்றும் கபினமாக கலக்கவும். நீரிவ் கரைக்து, மிதமுள்ள நீரினை கலந்து மற்றும் கபினமாக கலக்கவும். 2. காவரப் பாதுகாப்பிச் சாதனம் : பக்கெட் பம்பு தெளிப்பான், ஏவு தெளிப்பான், கால்மித் தெளிப்பான், கைவண்டி தெளிப்பான், அமுத்த நாப்சாக் தெளிப்பான், மின்கல அமுத்த நாப்சாக் தெளிப்பான் மற்றும் ஏஎஸ்பிஈஈ-எச்டிபி மின்சார தெளிப்பான்.

ஏத்தியில்பூ : ஹெக்சகோன சோவ் 5% எஸ்சி. அனைத்து பூஞ்சை கொல்லி மற்றும் பூச்சிக் கொல்லியுடன் லுத்தியில்பு உனடயது.

முனாச்□ரிக்கை : 1. மணித மற்றும் விலங்குகளின் உணவுப் பொருட்களுக்கு அப்பாவ் வைக்கவும். 2. வாய், கண் மற்றும் கோலில் படுதுலை கவிர்க்க. 3. தெளிக்கும் போது மருந்தின் துளிகளை சுவாச்த்தலை தவிர்க்க காற்று தினசயிவ் தெளிக்கவும். 4. மாசுபட்ட துணிகள் மற்றும் உடமைகளை நன்றாக கமுவ வேண்டும். 5. புகைக்கவோ, குபிக்கவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது மருந்து தெளிக்கும் போது. 6. பாதுகாப்பான உடைகளை பயன்படுத்தவும் தெளிக்கும் மற்றும் கலக்கும் போது.

முன்எச்சரிக்கை மற்றும் பயன்படுத்தும் வறிமுறை : தேன்க்கள், மின்கள், கால்நடைகள், காட்டு விலங்டுகள் மற்றும் பறவைகள் உள்ளப் பகுதியில் பயன்படுத்தலை தவர்க்கவும்.

பைட்ஃடா டாக்ஸிட்டி(தாவர விஷத் தன்னம) : நெக்சகோன சோல் 5% எஸ்.சி. விஷத் தன்னமயற்றது, பிரந்துரையின் பபி.

விஷ அரிகுறிகள் : நரம்புதளர்ச்சி, கலக்க மனநிலை, நடுக்கம், அலர்சி.

முதலுதவி : 1. விமுங்கப்பட்பியிருந்தவ் வாந்த் ஏற்படுதலை துண்டவும், மருந்து, எவளியேறும் வரை. சுயநினவுயற்ற நோயாளியை வாந்து ஏற்பமுதலை துண்ட கூடாது. 2. மாசுபட்ட துணிமற்றும் தோலினை நன்நாது கமுவ கமுவ வேண்டும்.

பாதுகாக்கும் முறை: 1. கனியறையில், உணவுப் பொருட்களுரக்குப் அப்பால், பூட்டி திறக்டும் வகையிவ் மருந்தினை பாதுகாக்க வேண்டும். 2. இதற்கென தனியாக நன்றாக கட்டப்பட்ட அறை, வறட்சி காற்றோட்டம் மற்றும் தேவையான இட்மும் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

அழிக்கும் முறை : 1. பயன்படுக்கிய காலி டப்பாவை நசுக்கி, ஏகக்கப்பிட்ட இடத்தில் புதைக்க வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய காலி டப்பாவை வெளியே ஏறிகல் கூடாது. 3. நீர் மாசினை கட்டுப்படுக்க மீதமுள்ள மருந்து மற்றும் தெளிக்கும் இயந்விம் குழுவிய நீரினை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்டுத்த வேண்டும்.

முலக்கூறு :

ஹெக்சகோனசோல் டெக் (92% எ/எ குறைந்தது கூய்மை)	5.430% எ/எ
குழம்பாக்கி : புரேப்டைலன் கிளைக்கால்	5.000% எ/எ
குட்ம்பாக்கி ஏ(பிளன்ட் ஆப் பாலிஆக்ஸி எத்திலின்) ஈத்தர்ஸ் ஆண்ட் காவ்சியவ் சால்ட் ஆப் அல்கைல்	3.000% எ/எ
குழம்பாக்கி பி (அமைன் சால்ட் ஆப் பாலிஅவ்கைல் அரைல் ஈத்தர் பாஸ்பேட்)	3.000% எ/எ
குடிம்பாக்கி சி)	2.500% எ/எ
பெட்டாசியம் பாஸ்னபட்	10.000% எ/எ
நுரைதடுச்பான்	0.200% எ/எ
ஆவிநீர்	0.250% எ/எ
நனை மற்றும் சிதறச் செய்யும் பொருள்	68.120% எ/எ
செயலி (சோடியம் சாலிட் ஆப் பேனி ஆலிகஹால்)	2.500% எ/எ
மொத்தம்	100.0% எ/எ

எச்ரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிர"ரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுஃம இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

ONEHEX

Hexaconazole 5% SC

(Systemic Fungicide)

వన్ హెక్స్

హెక్సాకొనాజోల్ 5% ఎస్‌సి

(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని)

वनहेक्स

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्वन सान्द्रण

(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

ಒನ್‌ಹೆಕ್ಸ್

ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR - 130769/2015 - Hexaconazole (SC) (354)-492

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE