फिप्रोनिल ५% एस. सि.

(कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ५% एस. सि.है कीटकनाशक आहे ज्याचा उपयोग स्टेम बोअरर, ब्राऊन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, राईस लीफ फोल्डर, राइस गॅल मिडज, व्हाईट बॅक प्लांट हॉपर, व्हॉर्ल यांसारख्या कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. मॅन्गोटिन तांदूळ. कोबीमध्ये डीबीएम, थ्रीप्स, ऍफिड्स आणि मिरचीमधील फळे, उसामध्ये लवकर अंकुर आणि रूट बोअरर आणि कपाशीमध्ये ऍफिड्स, जॅसिड्स, थ्रीप्स, पांढरी माशी आणि बोंड अळी.

शिफारस:

पीक	कीट काचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्रा.)	प्रतिक्षा सौम्यकरण पारान (लिटर)	अवधिशेवटच्या फवारणी ते कापणी
तांदूळ	स्टेम बोअरर ३२ दिवस	५०-७५	१०००-१५००		५००
	ब्राऊन प्लांट हॉपर				
	ग्रीन लीफ हॉपर				
	राइस लीफ फोल्डर				
	राइस गॅल मिज				
	व्हाईट बॅक्ड प्लांट हॉपर				
कोबी	डायमंड बॅकमॉथ	४०-५०	८००-१०००	५००	७ दिवस
	थ्रिप्स	४०-५०	८००-१०००	५००	
चिली	थ्रिप्स, ऍफिड फळ बोअरर	४०-५०	८००-१०००	५००	७ दिवस
ऊस	लवकर शूट बोरर रूट बोरर	७५-१००	१५००-२०००	५००	९ महिने

अर्ज करण्याची वेळ : तांदूळ : फिप्रोनिल अर्ज लावणीनंतर २५ ते ३० दिवसांच्या दरम्यान द्यावा. कोबी : पहिली फवारणी लावणीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी किंवा किडीचा प्रादुर्भाव दिसल्यावर द्यावी. ७ ते १० दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या कराव्यात. मिरची:- पहिली फवारणी लावणीनंतर ४० ते ५० दिवसांनी किंवा कडीचा प्रादुर्भाव दिसल्यावर द्यावी. १ ते १० दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ फवारण्या करा. ऊस:- लागवडीनंतर ३५ दिवसांनी पूर्वीच्या अंकूर बोअरर पर्णास लावण्यासाठी (डीएपी) आणि लागवडीच्या वेळी माती भिजवण्यासाठी रूट बोअरर.

वापराची दिशा:

वनस्पती संरक्षण उपकरणे: स्प्रेअरमध्ये नॅपसॅक, एअर प्रेशर फूट पंप, हाई रॉकर किंवा पॉवर ऑपरेटेड फवारणी मशीन यांसारख्या फवारणीसाठी लावलेले उच्च आवाजाचे नोझल वापरले जाऊ शकते.

खबरदारी: १. अझ्पदार्थ, रिकामे अझ्पदार्थ आणि प्राण्यांच्या अझ्पापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. ४ . फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे : चिडचिड, आळस, स्नायूंचा थरकाप, आकुंचन होऊ शकते.

प्रथमोपचार: १. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कापड काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवा. ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

फायटोटॉक्सिसिटी: फील्ड शिफारशीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा. वापरलेल्या कंटेनरची

विल्हेवाट लावणे: १ पर्यावरण आणि जलप्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनरमधील वॉशिंगची विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक फॉर्म्युलेटर आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य असेल. २ वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३ संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा कीटकनाशकाच्या स्वरूपावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अल्मिरात ठेवाव्यात. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे प्रकाशित, चांगले बांधलेले, कोरडे, थंड, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना:

फिप्रोनिल ए.आइ. (किमान शुद्धता १०%)	५.००० % व/व
सूर्यफूल तेल	५.००० % व/व
ओले करणारे एजंट नॅप्थालीन सल्फोनेट	३.००० % व/व
सस्पेंडिंग एजंट सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	८.००० % व/व
स्टिकिंग/ स्टेबिलायझिंग एजंट	४.००० % व/व
डिस्युलॉज/ डिस्ल बॉक्स एजंट (डायनाफ्थिल मिथेनॉल सल्फोनिक ऍसिडचे सोडियम मीठ)	३.००० % व/व
इमल्सीफायरचे मिश्रण (अल्काइल फिनॉल इथॉक्सिलेटचे स्वामित्व मिश्रण), ट्रायग्लिसराइड इथॉक्सिलेट, कॅल्शियम अल्काइलबेन्झिल सल्फोनेट)	८.००० % व/व
पाणी	८३%
एकूण:	१००.००० % व/व

चेतावणी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ফিপ্রোনিল 5% এস্‌সি

(কীটনাশক)

ফিপ্রোনিল 5% এস্‌সি একটি কীটনাশক যা কাণ্ড ছিদ্রকারী, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, গ্রিন লিফ হপার, রাইস লিফ ফোল্ডার, রাইস গল মিডজ, হোয়াইট বাক প্ল্যান্ট হপার, হোয়ার্ল ইয়েলো ড্রাগন, ডায়মন্ড ব্যাক মথ, থ্রিপস, ফ্রুট বোরার, ফ্লিয়া বিটল, জাসিড

Fipronil 5% SC

(Systemic and Contact Insecticide)

Fipronil 5% SC is an insecticide which is used to control insects like stem borer, brown plant hopper, green leaf hopper, rice leaf folder, rice gall midge, white backed plant hopper, whorl maggot in rice. DBM in cabbage, thrips, aphids &fruit borer in chillis, early shoot borer & root borer in sugarcane and Aphids, Jassids, Thrips, White fly and Bollwrm in Cotton.

Recommendation

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips, Whitefly	75-100	1500-2000	500	6
	Bollworm	100	2000	500	6
Sugar-cane	Root borer	75-100	1500-2000	500	9 months
	Early shoot borer				
Rice	Stem borer Brown plant hopper Green leaf hopper Leaf folder, Rice Gall midge Whorl maggot, White backed Plant hopper	50-75	1000-1500	500	32
Cabb-age	Diamond backmoth	40-50	800-1000	500	7
Chilli	Thrips, Aphid Fruit borer	40-50	800-1000	500	7

Direction of Use :

Plant Protection Equipment: high volume nozzle fitted to sprayers like knapsack, Air pressure Foot Pump, Hard rocker or power operated spraying machine may be used.

Time of Application:

Rice: The Fipronil application must be given between 25 to 30 days after transplanting.

Cabbage: The first spray is to be given at 30 to 35 days after transplanting or when pest incidence is noticed, which-ever is earlier. Repeat 2 to 3 sprays at 7 to 10 days interval.

Chilli: First spray is to be given at 40 to 50 days after transplanting or when pest incidence is noticed whichever is earlier repeat 2 to 3 spray at 1 to 10 days interval.

Sugarcane: For earlier shoot borer foiled application at 35 days after planting (DAP) and root borer drenching of salts and soil at planting.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while spraying.

Warning : Fipronil is toxic to aquatic animals & honey bee hence avoid the use near aquatic environment & during to foraging period of honey bee.

Symptoms of Poisoning : Irritability, lethargy, muscle tremors, convulsion may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is know. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container : 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operation to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit, well built, dry cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Fipronil, a.i.(Minimum Purity 90%)	5.00 % w/w
Suflower Oil	5.00 % w/w
Wetting agent : Napthalene Sulfonate	3.00 % w/w
Suspending agent : Sodium Ligno sulphonate	8.00 % w/w
Sticking/Stabilizing agent- Carboxy Methyl Cellulose	4.00 % w/w
Despersing agent (Sodium salt of Dinaphthyl methanol Sulphonic Acid)	3.00 % w/w
Blend of emulsifiers (Proprictory blend of alkyl phenol ethoxylate) triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate)	8.00% w/w
Water	Q.S%
Total	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सि.

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी. एक उदरीय, स्पर्शीय एवं अन्तरप्रवाही असरवाला कीटनाशक है। इसकी सिफारिश धान में लगने वाले कीटों जैसे तना छेदक, भूरा पौध का फूदका, हरी पत्ती का फूदका, धान का पत्ता लपेटक. बन्द गोभी के हीरा पीठ पतंगा कीट एवं मिर्ची के पुरदा, गाहू और फल छेदक तथा गन्न के पूर्व तना छेदक व गड़ छेदक के नियंत्रण के लिये की गयी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना मि.लि)	पानी की मात्रा (लि)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	चुरदा, तेला, माहू सफेद मक्खी	७५-१००	१५००-२०००	५००	६	-
	डोड की सुडी	१००	२०००	५००	६	-
गन्ना	ज़ड छेदक	७५-१००	२५०-	-	९ महिने	-
	अग्रिम तना छेदक	३३.३०				
धान	तना छेदक,भूरा फुदका, हरी पत्ति का भूरा फुदका पर्णमोडक, गाल मिज गोभ की मक्खी, सफेद पीठ का पौध फुदका	५०-७५	१६.६७-२५.००	-	३२ दिन	-
बंदगोभी	हीरा पीठ पतंगा	४०-५०	८००-१०००	५००	७	-
मिर्ची	चुरदा, माहू, फल छेदक	४०-५०	८००-१०००	५००	७	-

उपयोग के लिये निर्देश:

कृषि रक्ष सम्बन्धी यंत्र: कीटों का सफलता पूर्वक नियंत्रण के लिये उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे की नैपसेक, दाययुक्त हवा, पांव से चलने का पंप यंत्र शक्ति से चलने वाले छिड़काव यंत्र जूड़े हो।

प्र योह का समय:

धान : फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी का छिड़काव धान रोपाई के बाद २५ से ३० दिन के अन्दर करना चाहिये।बंद गोभी : पहला छिड़काव रोपाई के ३० से ३५ दिन बाद करें या फसल मे पीड़ा लगने के बाद, दोनों में जो भी पहले हो। पुनः २ से ३ बार छिड़काव ७ से १० दिनों के अंतराल पर करें। मिर्ची :पहला छिड़काव रोपाई के ४० से ५० दिन बाद करें या फसल में कीड़ा लगने के बाद, दोनों में जो भी पहले हो। पनः २ से ३ बार छिड़काव ७ से १० दिनों के अंतराल पर करें। गन्ना : पूर्व तना छेदक पर फसल उदने के ३५ दिन बाद और जड़ छेदक का गिट्टी में गिलाकर रोपण करें

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस व्दारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो ओर शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

चेतावनी : मधुमखियों एवं जलीय के लिए विषाक्त है अतः इसका उपयोग जीवों एवं परागण के समय न करें।

विष के लक्षण : चिडचिडापन, आलस्य, मांसपेशियों में कंपन, झटके (मिरगी) हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी व्दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे ओर त्वचा दूषित हो जाए तो कपडें उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विष-नाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा उपयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक तथा यंत्रों के धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की आबादी व पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक डिब्बों की अन्य कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विषेषकर खाध्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए या कीटनाशक की मात्रा ओर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। २. संग्रहण का कमरा लम्बा चौडा मजबूत, साफ खुला तथा हवादार होना चाहिए। कमरे मरोशनी का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिए। कमरा शुद्ध तथा ठंडा होना चाहिए जिससे वाष्प द्वारा वायु प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संरचना:

फिप्रोनिल ए.अई	५.००% भार/भार
सूरजमूखी तेल	५.००% भार/भार
वेटिंग एजेन्ट (नेप्थालीन सल्फोनेट)	३.००% भार/भार
सस्पेंडिंग एजेन्ट (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	८.००% भार/भार
स्टिकिंग/स्टेबिलाइजिंग एजेन्ट (कारबोक्सी मिथाइल सेल्युलोज)	४.००% भार/भार
डिसपर्सिंग एजेन्ट – सोडियम साल्ट ऑफ डाईनेप्थाईल मेथानोल सल्फोनिक अम्ल)	३.००% भार/भार
ब्लेन्ड ऑफ एमल्सीफायर्स (प्रोपराईटरी ब्लेन्ड ऑफ एल्किईल फीनोल एथ्रोक्सीलेट ट्राईग्लीसाराइड एथोक्सीलेट, कैल्सियम एल्काईल बैन्जाईल सल्फोनेट)	८.००% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भा
योग	१००.०००%भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్‌సి

(కీటకనాశిని)

ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్‌సి వరి పైరును ఆశించు కాండము తొలుచుపురుగు, సుడిదోమ, పచ్చదోమలు లేక ఆకుచుట్టుపురుగు, ఉల్లికోడు, తెల్లవీవ్ము గల సుడిదోమ, వరినల్లి, క్యాబేజీను ఆశించు డైమండ్ రెక్కలపురుగులను ప్రభావవంతంగా అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది.

సిఫారసు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామము	స.వ. (గ్రా)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం
వరి	కాండం తొలుచుపురుగు సుడిదోమ, పచ్చదోమ ఆకుచుట్టు పురుగు, ఉల్లికోడు తెల్లవీవ్ము గల సుడిదోమ, వరినల్లి	50-75	1000-1500	500	32 రోజులు
క్యాబేజి	డైమండ్ రెక్కలపురుగు	40-50	800-1000	500	7 రోజులు
మిరప	తామరపురుగులు,పేనుబంక కాయతొలుచుపురుగు	40-50	800-1000	500	7 రోజులు
చెఱకు	వేరు పురుగు ముందుగా పచ్చు కాండం తొలుచు పురుగులు	75-100	1500-2000	500	9 నెలలు

ఉపయోగించు సమయం :

వరి: వరి నాటిన 25-30 రోజులలో ఫిప్రోనిల్‌ను ఉపయోగించాలి.

క్యాబేజి: మొదటి పిచికారి నాటిన 30-35 రోజులలో లేదా కీటకాలు కనబడిన వెంటనే, ఏది ముందుగా కనబడితే అది చేయాలి. 7 నుండి 10 రోజుల విరామంతో మరల 2-3 పిచికారీలు చేయాలి.

మిరప: మొదటి పిచికారీ నాటిన 40-50 రోజులలో చేయాలి. లేదా కీటకాలు కనబడిన వెంటనే, ఏది ముందుగా కనబడితే అది చేయాలి. 1 నుండి 10 రోజుల విరామంతో మరల 2-3 పిచికారీలు చేయాలి.

చెఱకు: ముందుగా పచ్చు కాండం తొలుచు పురుగును అరికట్టుటకు పంట నాటిన 35 రోజుల తదుపరి ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి మరియు వేరుపురుగును అరికట్టుటకు పంట నాటు సమయంలో సాయిల్ డ్రెంచింగ్ చేయాలి.

ఉపయోగించుటకు సూచన :

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరము : అధిక నీటి పరిమాణముగల నాజిల్ బిగించిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు ఫుట్‌పంపు, హార్డ్ రాకర్ లేదా మోటరుతో పనిచేయు పిచికారీ యంత్రం వంటివి ఉపయోగకరము.

ముందు జాగ్రత్త : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులనీయవద్దు. 3. పీల్చవద్దు, గాలి వాలుగా పిచికారి చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగత్రాగడం, త్రాగడం, తినడం మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు పూర్తి సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను.

విషతుల్యత : సిఫారసు చేసిన మోతాదులో పంటపై ఉపయోగించిన యెడల హానికరం కాదు.

విషలక్షణములు : చిరాకు, బద్ధకం, వణుకుట, మూర్ఛలు వంటివి కనబడవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో - రోగి గొంతు వెనుకభాగమును ప్రేరేపించి మింగిన ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు వాంతి చేయించాలి. అపస్మారక స్థితిలోని రోగికి వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మమునకు అంటినచో- కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో - సైలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10-15 నిమిషములు పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో - రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగ లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

వాడిన కంటైనర్ల విసర్జన : 1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. కీటకనాశిని నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. కీటకనాశిని నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము:

ఫిప్రోనిల్ స.వ. (కనీస స్వచ్ఛత 90%)	5.000% భా/భా
ప్రొద్దుతిరుగుడు నూనె	5.000% భా/భా
వెట్టింగ్ ఏజెంట్ (నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్)	3.000% భా/భా
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	8.000% భా/భా
స్టికింగ్/స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ కార్బోక్సీమిథైల్ సెల్యులోజ్	4.000% భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ డైనాఫ్థైల్ మిథనాల్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం)	3.000% భా/భా
బ్లెండ్ ఆఫ్ ఎమల్సిఫయర్స్ (ప్రొపైటరి బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆల్కిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్, ట్రైగ్లిసరైడ్ ఇథాక్సిలేట్, కాల్షియం ఆల్కిల్ బెంజిల్ సల్ఫోనేట్)	8.000% భా/భా
నీరు	క్యూఎస్.%
మొత్తం	100.000%భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన లేబుల్/కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, ఇతర పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish®
CROPSCIENCES
Innovation starts with Amish

PROMINAL
Fipronil 5% SC
(Insecticide)
ప్రొమినల్
ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్.సి.
(కీటకనాశిని)
प्रमिनल
फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी.
(कीटनाशक)
ಪ್ರೊಮಿನಲ್
ಫ್ರಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by:

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :

अमीश काप साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नंब : १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), धोन (मंडल),
नंध्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855, Email:** customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House**, 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-130774/2015-Fipronil (SC) (354)-630

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE