

Ref Size : Tricom | Inspector
 Brand : **RIFFIN-40** (Tech : Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG)
 Open Size : W : 280 mm x H : 195 mm (250 g)

280.00 mm

195.00 mm

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగమును ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்க(கு)முள்ள திடுமுறிட்டை. துயர(கு)செய்து படிக்கவும்.


रैफिन ४० - फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी (अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : फिप्रोनिल, राफिय तत्व ...४०.००% भार/भार, इमिडाक्लोप्रिड, राफिय तत्व ...४०.००% भार/भार, सोडियम पोलिकारबोक्सिलेट ...३.००% भार/भार, सोडियम डायोसिल्ट सल्फोसुक्सिनेट ८५% ...२.००% भार/भार, नॉन आयनिक एक्जुअस इमलसन (३०%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन...०.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटेड ...पर्याव मात्रा, कुल...१००.००% भार/भार ।
उपयोग के लिये दिशा-निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** उपरोक्त लिये गये लक्षणों और औरोनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ बिलम्बित रोग संक्रमित व विभागी इंडिया जैसे अंतर हो सकते हैं। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण :** ऐंठन, कंपकपी, घबराहट, बेचैनी। **उपयोग :** फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी का उपयोग गन्ना और मूंगफली में लागे वाले सफेद त्रव की रोकथाम के लिए किया जाता है। **निर्गमन :** अंग्रेजी में लिखे अनुसार। **आयात कर्ता का उत्पादन परिसर :** अंग्रेजी में लिखे अनुसार। **सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों**

RIFFIN-40 - Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG (Systemic and Contact Insecticide)

Chemical Composition : Fipronil a.i... 40.00% w/w, Imidacloprid a.i. 40.00% w/w, Sodium poly carboxylate...3.00% w/w, Sodium Diocetyl sulfosuccinate 85%...2.00% w/w, Non ionic aqueous emulsion of (30%) Polydimethylsiloxane...0.30% w/w, Sodium lignosulfonate sulfomethylated... Q.S. %, Total...100.00% w/w. **Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema. **Antidote :** Specific antidote not known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms :** Convulsions, tremors, anxiety, restlessness. **Recommendations :** Fipronil 40%+ Imidacloprid 40% WG is recommended for control of white grubs in Sugarcane. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label / Leaflet."**

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
 Survey No. : 172, Udumulapadu (VII),
 Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
 Andhra Pradesh, INDIA.
 उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश क्राप साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
 सर्व नं. : १७२, उदुमुलापडु (७आ), धोण (मंडल),
 नन्दयाल (जिला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत
 For Cash or any Correspondence Contact
 "Manager-Customer Care" Cell No. : +91 7076 8865,
 Email: customercare@amishcropsciences.com Office: Agud Huse,
 631812, Arava-Gunta Road, Madhya Hyderabad-500016, Telangana
 कृषि विभाग-सिंधी & हिं. भाषा में भी लिखे हैं।
 +91 7076 8865, ईमेल: customercare@amishcropsciences.com



రైఫిన్ 40 - ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి
(అంతర్ప్రవాహక మరియు స్పర్శపర్యవం కీటకనాశిని)
రసాయన మిశ్రమము: ఫిప్రోనిల్ స.మ. ... 40.00% భా/భా, ఇమిడాక్లోప్రిడ్ స.మ. 40.00% భా/భా, సోడియం పాలికార్బాక్సైలేట్ ... 3.00% భా/భా, సోడియం డయోసెల్ సల్ఫోసక్సినేట్ 85% ... 2.00% భా/భా, నాన్ ఆయోనిక్ అక్వయస్ ఎమల్షన్ ఆఫ్ (30%) పాలిడైమెథిల్ సైలొక్సేన్ ... 0.30% భా/భా, సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ సల్ఫోమెథిలేటెడ్ ... క్యు.ఎస్.%, మొత్తం ... 100.00% భా/భా. ఉపయోగించుటకు ముందు చదవండి. అపేక్షించిన కరపత్రం చదవండి. ముందు జాగ్రత్తలు: ప్రైవేట్ సెల్ ఫోన్, అక్షరాలు అభ్యుదయిస్తానని మూలంపై పత్రం వదిలి ఉంచండి. కాపీస్ అయోమయం చెందవద్దు. మెడలిలో నీరు చేరుట వంటి సూచన సంబంధిత ప్రధానాలు అనుసరించి ఉంచండి. **విషవర్ణనలు:** నిస్పృహ, మోటు, అంధత్వం, విశ్రాంతి లేకపోవడం వంటివి కనబడతాయి. **నిషాధాలు:** ఉపయోగించుటకు ముందు చదవండి. అపేక్షించిన కరపత్రమును చదవండి. **విషవర్ణనలు:** మూర్ఛలు, మోటు, అంధత్వం, విశ్రాంతి లేకపోవడం వంటివి కనబడతాయి. **నిషాధాలు:** ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి రెండూ మరియు వేరువేరుగా తోటలను అశుభం చేసేవనవలసిన (డ్రైట్ గ్రబ్స్) సమస్తవంటిగా అరికట్టుటకు ఉపయోగించు అంతర్ప్రవాహక, స్పర్శపర్యవం కీటకనాశిని. **నిషాధిత :** అపేక్షించిన కరపత్రములో పేర్కొన్న ప్రకృతి ఉపయోగించవలసి. మిగతా ప్రకృతి ఉపయోగించరాదు.

రిఫైన్ 40 - ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి (వ్యవస్థిత మరియు స్పర్శ సంపర్క కీటకనాశక)

రాసాయనిక సంయోగణ: ఫిప్రోనిల్ స.భా...40.00% తూ/తూ, ఇమిడాక్లోప్రిడ్ స.భా...40.00% తూ/తూ, సోడియం పాలికార్బాక్సైలేట్...3.00% తూ/తూ, సోడియం డయోసెల్ సల్ఫోసక్సినేట్...85% ...2.00% తూ/తూ, (30%) పాలిడిమెథిల్ సైలొక్సేన్...0.30% తూ/తూ, సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ సల్ఫోమెథిలేటెడ్ ...క్యూ.ఎస్.%, మొత్తం...100.00% తూ/తూ. **బళకలియ నిర్దేశనలు :** చయవిట్టు బళసువ మోదలు సుత్తువరద కరపత్రవన్ను ఓ.డి. **మున్నోట్రోఫింగులు :** మోలిన రోగలక్షణాలను అగణనోభావనా సంయుక్తంగా గుండలంబలంబరచు. మదుళన విడిమూ శేలందంత తడవడం నరవ్యజ్ఞానిక పంజామగులు ఇరలమదు. **ప్రతివిష :** నిద్రాశ్చ ప్రతివిష తిళిదిట్ట, రోగలక్షణాల చికిత్స, **ప్రథమ చికిత్స :** చయవిట్టు బళసువ మోదలు సుత్తువరద కరపత్రవన్ను ఓ.డి. **అక్షరాలు :** శోభిత, నదుక, ఆతంక, జడవడిక, **తిఫారసుగులు :** కబ్బు మరియు నేలగడలేయల్లి బిళ గ్రుదగళ నియంత్రణకాగ్ని ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి అన్ను తిఫారసు మూడలాగి. **విజ్ఞప్తిక :** ఈ లేబుల్ / వివరణా పత్రవల్లి నిద్రాశ్చ పడినవరద మోదలవ చికిత్స మోదల బళసువరచు.



RIFFIN-40
Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG

Systemic and Contact Insecticide



Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.

Net Weight:
250 g

140.00 mm

Ref Size : Tricom | Inspector
 Brand : **RIFFIN-40** (Tech : Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG)
 Open Size : **10 X 7 inches** (100 g)

10.00 inches

7.00 inches

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగమును ముందు అభివృద్ధి కరమైన వనరును చదివండి. **పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు. పాఠశాల విద్యార్థులకు, ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులకు, పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు.**

రైఫిన్ ౪౦ - ఫిప్రోనిల్ ౪౦% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్
౪౦% ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (సాస్పెన్షన్) మరియు ఫిప్రోనిల్ ౪౦% (సిస్టెమిక్ మరియు కంటాక్ట్ ఇన్సెక్టివ్)

RIFFIN-40 - Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG (Systemic and Contact Insecticide)

रासायनिक संरचना : फिप्रोनिल, सक्रिय तत्व ...४०.००% भार/भाग, इमिडाक्लोप्रिड, सक्रिय तत्व ...४०.००% भार/भाग, सोडियम पोलिसिलसिलेट ...३.००% भार/भाग, सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसुकोनेट ८% ...३.००% भार/भाग, नॉन आयनिक एक्जुअर इमलशन (३०%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन...३.०% भार/भाग, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड ..पर्याप्त मात्रा%, कुल...१००.००% भार/भाग। **उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** उपरोक्त दिये गये लक्षणों और औपचारिकताओं को ध्यानपूर्वक से ध्यान देकर करना चाहिए। कुछ विषमत्व न्यूनतम सम्भवित व विषमता जैसे असर हो सकते हैं। **विषय-सूची:** कोई विशिष्ट विषय-सूची नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **सावधान :** एंटी-कॉन्वल्सन्ट, घबराहट, बेचैनी। **उपयोग :** फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग गन्ना और मूंगफली में लागू करने पर की रोकथाम के लिए किया जाता है। **निर्गत :** अंग्रेजी में लिखे अनुसार। **आवत फर्त का उत्पादन परियोजना :** अंग्रेजी में लिखे अनुसार। **सावधानी :** लेख / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग करना नगरे।

రైఫిన్ 40 - ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్
40% దబ్బణి (అంతర్దాహక మరియు స్పృశ్యచర్మక కీటకహారి)

ఉపయోగ మార్గదర్శి : ఫిప్రోనిల్ స.వ. ... 40.00% భా./భా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ స.వ. 40.00% భా./భా. సోడియం పాలిసైలొసైలొసైట్ ... 3.00% భా./భా. సోడియం డయాక్టైల్ సల్ఫోసూకోనేట్ 8% ... 2.00% భా./భా. నాన్ అయోనిక్ ఎక్జుఅర్షన్ (30%) పాలిడాక్టిమిథైల్ సైలొక్సేన్ ... 0.30% భా./భా. సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ సల్ఫోమిథైలేట్ ... కచ్చితం.%, మొత్తం ... 100.00% భా./భా. ఉపయోగమును ముందు అభివృద్ధి కరమైన వనరును చదివండి. **పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు. పాఠశాల విద్యార్థులకు, ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు.**

ఉపయోగమును ముందు అభివృద్ధి కరమైన వనరును చదివండి. పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు. పాఠశాల విద్యార్థులకు, ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు.

Manufactured & Marketed by AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
 Survey No. : 172, Udamalupadu (Vill), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222 Andhra Pradesh, INDIA.
 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, నంద్యాల జిల్లా, ఉదామలపాడు గ్రామం
 అనుబంధం నెంబెర్: 172
 అధికారిక వాణిజ్య అనుమతి పత్రం నెంబెర్: 172
 అధికారిక వాణిజ్య అనుమతి పత్రం నెంబెర్: 172
 అధికారిక వాణిజ్య అనుమతి పత్రం నెంబెర్: 172

తగ్గరి 40
విషము గానియం
POISON

Mfg.Lic.No / డబ్బణి తయారీ : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
 ముద్రాపత్రం నెంబెర్: CIR-167664/2019-Fipronil + Imidacloprid (WG) (408)-2954
 Regn.No / రిజిస్ట్రేషన్ నెంబెర్: : 100g
 Net Weight : 100g
 కుల భార: 100 గ్రాములు
 Batch No. :
 బేచ్ నెంబెర్: :
 Mfg. Date :
 తయారీ తేదీ: :
 Exp. Date :
 నిష్కారణ తేదీ: :
 ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% దబ్బణి (అంతర్దాహక మరియు స్పృశ్యచర్మక కీటకహారి) (సాస్పెన్షన్) (ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% + ఫిప్రోనిల్ 40% దబ్బణి)
 ఉపయోగమును ముందు అభివృద్ధి కరమైన వనరును చదివండి.
 పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు. పాఠశాల విద్యార్థులకు, ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉపయోగం చేయరాదు.

For Agricultural Use Only
 Only for Agricultural Use Only
 Only for Agricultural Use Only

RIFFIN-40
Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG

Systemic and Contact Insecticide

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.
 Net Weight: **100 g**

5.00"

