Spinosad 45% SC
(Insecticide)

The product is effective against American Bollworm infesting Cotton, Fruit Borer and Thrips on Chillies and Pod Borer on red gram.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (gm)	Dosage/Ha. Formula-tion (ml)	Waiting Dilution in water (Litre)	Period between last spray to harvest (In days)
Chillies	Fruit borer, Thrips	73	160	500	3
Cotton	American bollworm	75-100	165-220	500	10
Red gram	Pod borer	56-73	125-162	800-1000	47

Direction of Use : Knapsack sprayer/Tractor mounted sprayer / Low volume sprayer is to be used while applying the insecticide.

Time of Application : Apply as directed spray when the incidence of Helicoverpa larvae is observed

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Lactrimination, Saliva, Red colour, Secretions, incorrdination may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by ticking the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : The empty containers souldnever be reused and should destroyedand burried in safe place. Dispose off package or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Condition : Store in the original containers awayfrom food and animal feed in a separate room kept under lock andkey. Store in cool dry, well built and well lit, Place of sufficent dimensions with good ventilation.

Chemical Composition:

Spinosad a.i.	45.00% w/w
Non Tonic/aninoic Surfactant blend (A blend of ethonylated and sulphonated hydrocarbons)	5.00% w/w
Polyalkyl Siloxane	1.00% w/w
Propylene Glycol	4.00% w/w
Hydrated magnesium aluminium Silicate	0.43% w/w
Water	QS %
Total	100% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

स्पैनोसाड ४५% एस.सी.
(कीटनाशक)

यह उत्पादन कपास पर हमला करने वाले अमरीकी डोंडे की सुंडी (हेलीकोवर्ण अर्मिजेरा) मिर्च पर फल चेदक वा चुरदा तथा अरहर पर फली छेदक की रोकथाम के लिए हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	स.तत्व. (ग्रा.)	मात्रा हेक्टर संयोजन की मात्रा (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच का अंतराल (दिनों में)
मिर्च	फल छेदक, चुरदा	७३	१६०	५००	३
कपास	अमरीकी डोंडे की सुंडी	७५-१००	१६५-२२०	५००	१०
अरहर	फली छेदक	५६-७३	१२५-१६२	८००-१०००	४७

छिडकाव का समय : जब हेलिकोवर्पा के लार्वा दिखाई दे, तभी निर्देश के अनुसार इसका छिडकाव करे।

उपयोग के लिये निर्देश : कीटनाशक के छिडकाव करने के लिए नैपसेक स्प्रेयर/ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर/ निम्न वाल्यूम स्पेयर का जरूरत के अनुसार उपयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह. त्वचा और आंखें के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४ छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को वबाना नहीं चाहिए। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ वबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षत्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण :आँसू आना, लार टपका, लाल पानी का रिसाब, असंतुलन हो सकते है।

पाधमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहै जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बैहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादीसे दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या आलमायीं से जिनमें अन्य दस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशू आहार संगहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग - अलग कमरों में या आलमारियें में ताला चाबी में बंद रखें। २. जिन कमरे अधवा आलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिये ताकि कीटनाशक की भाप से वातावारण प्रदूषण होने का डर न हों।

संरचना :

स्पैनोसाड स.त.	४५.००% भार/भार
गैर आयोनिक /ॲनिओनिक पृछ सक्रियन मिश्रण (एथोक्सीलेटेड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण)	५.००% भार/भार
पॉलीअल्काइल सिलोज़न	१.००% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लायकोल	४.००% भार/भार
हाइड्रेटेड-मैगनेशियम ॲल्यूमिनियम सिलिकेट	०.४३% भार/भार
जल	पर्याप्तमात्रा %
कुल	१००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

స్పైనోసాడ్ 45% ఎస్.సి.
(కీటకనాశిని)

ప్రత్తి పంటను ఆశించు అమెరికా కాయతొలుచు పురుగు మరియు మిరప పంటను ఆశించు కాయతొలుచు పురుగు, తామర పురుగులు మరియు కంది పైరులోని కాయ తొలుచు పురుగును ప్రభావవంతంగా అరికట్టును.

సిఫార్సు

పంట	కీటకం పేరు	మోతాదు / హెక్టారుకు స.తత్వం (గ్రా.)	సంరచన (మి.లి.)	నీటి మోతాదు (లిటర్లలో)	ఆఖరి పిచికారి, పంట కోయుటకు మధ్య కాలం (రోజుల్లో)
మిరప	కాయ తొలుచుపురుగు, తామర పురుగులు	73	160	500	3
ప్రత్తి	అమెరికా కాయ తొలుచు పురుగు	75-100	165-220	500	10
కంది	కాయ తొలుచు పురుగు	56-73	125-162	800-1000	47

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు/ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్/ తక్కువ ఒత్తిడిగల స్ప్రేయర్లతో కీటకనాశినిని ఉపయోగించవచ్చు.

ఉపయోగించు సమయం : హెలీకోవర్పా లార్వా దశలో ఉన్నపుడు దీనిని ప్రత్యక్షంగా పిచికారీ చేయవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. మందును ఉపయోగించునప్పుడు పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

విష లక్షణాలు : తలనొప్పి, వాంతి, వమనం, బేది, గుండె మరియు శ్వాస నాళాలలో దురద, శ్వాస తీసుకోవటంలో కఠినత, నీరసం, తారుమారు, క్రియాశీలతలో బలహీనం, ఆకలిలేమి కలుగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలించండి.

విషతుల్యత :

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ విసర్జన : ఖాళీ కంటైనర్లను మరల ఉపయోగించుటకు వీలులేని విధంగా నాశనం చేసి మరియు తగులబెట్టి సురక్షితంగా విసర్జించాలి. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడగగా వచ్చిన ద్రవంను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

నిల్వ షరతులు : కీటకనాశినిని వాటి ఒరిజినల్ కంటైన్లలో ఆహారపదార్థాలకు మరియు పశుగ్రాసాలను దూరంగా ప్రత్యేక గదులలో తాళం వేసి భద్రపరచాలి. చల్లని, పొడి ప్రదేశాలలో బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా, కలుషిత ఆవిరిని నిర్మూలించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం

స్పైనోసాడ్ స.ప.	45.00% భా/భా
నాన్ ఆయానిక్-ఆయా-అయానిక్ సర్ఫక్టెంట్ బ్లెండ్ (ఎ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఇథోక్సిలేటెడ్ మరియు సల్ఫోనేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్)	5.00%భా/భా
పాలీఅల్కిల్ సైలోక్సిన్	1.00%భా/భా
ప్రొపిలిన్ గ్లైకోల్	4.00% భా/భా
హైడ్రాటెడ్ మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్	0.43%భా/భా
నీరు	క్యు.ఎస్.%
మొత్తం	100%భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

SIRI SPINO
Spinosad 45% SC
(Insecticide)
సిరి స్పినో
స్పినోసాడ్ 45% ఎస్ సి
(కీటకనాశిని)
सिरि स्पिनो
स्पिनोसैड ४५ प्रतिशत एस.सी.
(कीटनाशक)
ಸಿರಿ ಸ್ಪಿನೋ
ಸ್ಪೈನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ప్రమాదకరం అపాయము
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-210646/2022-Spinosad (SC) (440)-124

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಸ್ಪೈನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಉತ್ತನ್ನವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗಿರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಫಸಲು	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಸ.ತತ್ವ (ಗ್ರಾಂ/%)	ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂರಚನೆ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ (ಲೀ.)	ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಫಸಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ಮಧ್ಯೆಯ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೆಣಸಿನ-ಕಾಯಿ	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್	73	160	500	3
ಹತ್ತಿ	ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್	75-100	165-220	500	10
ತೊಗಿರೆ ಜೆಳೆ	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು	56–73	125–162	800–1000	47

ಉಪಯೋಗದ ನಿರ್ದೆಶನಗಳು : ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಹಸ್ತ ಜಾತಿತ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಳ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಹಾಲೋ ಕೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾಸಲ್ ನೊಂದಿಗೆ-ಇವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಪಧಾತಗಳು : 1. ಖಾದ್ಯಸಾಮಗ್ರಿ, ಖಾದ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಖಾಲೀ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಗೆಗೆ ದೂರವಿಡಿಸಿ. 2. ಮುಖ, ತ್ವಚಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿಡಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪರಣಿಯ ಭಾಷ್ಪ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಸಿಂಪರಣಯ ನಂತರ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಆಂಗಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮ್ರಪಾನ, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ವಾಡುವಾಗ, ಬೆರೆಯುವ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣ : ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ವಮನ, ಬೇಧಿ, ಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುರದೆ, ಶ್ವಾಸದ ಕಠಿನತೆ, ನೀರಸ, ನಿರ್ವೀರ್ಯತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಇದನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿತ-ಕಿತ ಮಾಡಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಈ ಕ್ರಿಮೆಯನ್ನು ವಾಂತಿಯ ದ್ರಾವಣ ಶುಭ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ರೋಗಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 2. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚಿ ದೂಷಿತವಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ದೂಷಿತ ಶರೀರವನ್ನು ಅಧಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ದೂಷಿತವಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ನೀರಿನಿಂದ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೆನ್/ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಹೋಗಿರಿ.

ವಿಷ ನಾಶಕ : ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆಗಳ ವಿಟರ್ಜನೆ : 1. ಕೀಟನಾಶ ನಿರ್ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕರ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯ ವೇನೆಂದರೆ ಡಿಬ್ಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದ್ದು ಜನ ಸಂಪಣಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ ಹೂತುಬಿಡಿರಿ. 2. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ಹೊರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. 3. ಡಬ್ಬೆಗಳು ಅಲ್ಲವೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಲ್ಲದೆ ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಾತಾವಕರಣ ಅಲ್ಲವೆ ನೀರು ಕಾರಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಶರತ್ತುಗಳು : 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿ ಅಲ್ಲವ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಾತಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶಷವಾಗಿ ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ದೂರ ಆನ್ಯ ಕೋಠಡಿಗಳಿಗ ದೂರವಾಗಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಬಂದು ಮಾಡಿರಿ. 2. ಯಾವ ಕೋಠಡಿಣಥವಾ ಆಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಖೂಡುತ್ತೀರೋ ಆವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಒಣಗಿದ, ತಣ್ಣನೆಯ, ಪ್ರಕಾಶವಂ, ವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯಾತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ ಭಾಷ ದಿಂದ ವಾತಾವರಣ ದೂಷಿತವಾಗಬಾರದು.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

ಸ್ಪೈನೋಸೈಡ್ ಎ.ಐ.	45.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ನಾನ್-ಆಯಾನಿಕ್-ಅಯಾ-ಅಯಾನಿಕ್ (ಎಥಾಕ್ಸಿಲೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಲೋನೆಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್)	5.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಅಲ್ಕಿಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸನ್	1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	4.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬಡ್ ಮಾಗ್ನಿಷಯಂ ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಾಮ್ ಸಿಲಿಕೆಟ್	0.43% ತೂಕ/ತೂಕ
ನೀರು	ಕ್ಯೂ ಎಸ್%
ಮೊತ್ತ	100% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

स्पिनोसॅड ४५ % एस सी

(किटनाशक)

अमेरिकन बोंडअळीचा प्रादुर्भाव करणाऱ्या कापूस पिकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे उत्पादन प्रभावी आहे, मरची पिकावरील फ्रूट बोरर आणि थ्रिप्सचे नियंत्रण तुवर डाळ वरील पॉड बोरर चे नियंत्रण

शिफारसः

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	स.त. (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टर द्रावण (ग्रॅम)	विद्रावणाचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
मिरची	फ्रुट बोअरर, थ्रिप्स	73	160	500	3
कापूस	अमेरिकन बोंडअळी	75.100	165.220	500	10
तुवर डाळशेंगा	बोअरर	56.73	125.162	800.1000	47

वापरण्याची वेळः हेलिकोवेर्पा अळी आढळून आल्यानंतर निर्देशांनुसार फवारणी करावी.

वापरण्यासाठी निर्देशः हे किटनाशक फवारणीसाठी नॅपसॅक स्प्रेयर/ट्रॅक्टरवर बसविलेला स्प्रेयर/कमी क्षमतेचा स्प्रेयर वापरावा.

खबरदारीः १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थांचे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारणीचे धुके हुंगणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणी करताना काहीही खाऊ, पिऊ आणि चघळू नका. धूम्रपान करु नका. ५. मिसळताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, मळमळ, उलटी, फुफ्फुसात जळजळ, अनोरेक्सिया, अटाक्सिया, हालचाल मंदावणे, अतिसार, श्वास घेण्यास अवघड जाणे उद्भवू शकते.

प्रथमोपचारः १. पोटात गेल्यास घशाच्या मागील बाजूस बोटाने दाबून उलटी करवा. उलटीचे पाणी स्वच्छ येईपर्यंत ही क्रिया करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करवू नका. २. कपडे आणि त्वचा प्रदूषित असल्यास कपडे काढा आणि प्रदूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाणी वापरुन धुवा. ३. डोळे प्रदूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिटे भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाण्याने धुवा. ४. हुंगल्यास रुग्णाला ताज्या हवेत न्या.

प्रतिउपायः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः १. निर्मिती, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य आहे की पॅकेजेस किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनरमधील धुवणाचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांना पुनर्वापर होणार नाही. ३. पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनर धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन, पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

साठवणः १. हे बुरशीनाशक असलेले पाकिटे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर अन्य खोल्या किंवा इमारतींमध्ये साठवावे किंवा बुरशीनाशकाच्या प्रमाणानुसार कुलूपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. २. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमय आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचनाः

स्पिनोसॅड स.त.	४५.००% व/व
नॉन-आयनिक/अनआयनिक सरफॅक्टंट मिश्रण (इथोनिलेटेड आणि सल्फोनेटड हायड्रोकार्बन्सचे एक मिश्रण)	५.०० % व/व
पॉलिअल्किल सिलोक्सेन	१.०० % व/व
प्रोपिलिन ग्लायकॉल	४.०० % व/व
हायड्रेटेड मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट	०.४३ % व/व
पाणी	आवश्यकतेनुसार%
एकूण	१०० % व/व

इशाराः हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

ஸ்பினோசாட் 45% எஸ்சி

(பூச்சிக்கொல்லி)

மிளகாயில் பருத்தி, பழம் துளைப்பான் மற்றும் த்ரிப்ஸ் மற்றும் செம்பருத்தியில் காய் துளைப்பான் ஆகியவற்றை தாக்கும் அமெரிக்க காய்ப்புழுக்கு எதிராக இந்த தயாரிப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்கள்	அளவு / ஹெக்டேர் A.I.	அளவு / ஹெக்டேர் சிப்பாக்குகேஜுகள்	தண்ணீரில் கரைப்பு	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரையிலான இடைவெளி (நாட்களில்)
		(கி)	(கி)	லுரைந்தகம் (கி)	
மிளகாய்	காய் துளைப்பான், த்ரிப்ஸ்	73	160	500	3
பருத்தி	அமெரிக்கன் காய்ப்புழு	75-100	165-220	500	10
செம்பருத்தி	காய் துளைப்பான்	56-73	125-162	800-1000	47

பயன்படுத்தும் திசை: பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தும்போது நாப்சாக் தெளிப்பான்/டிராக்டரில் பொருத்தப்பட்ட தெளிப்பான்/குறைந்த அளவு தெளிப்பான் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் : ஹெலிகோவர்பா லார்வாக்களின் தாக்கம் காணப்பட்டால், தெளிக்கப்பட்ட தெளிப்பைப் பயன்படுத்தவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்தபின் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: பாலூட்டுதல், உமிழ்நீர், சிவப்பு நிறம், சுரப்பு, ஒழுங்கற்ற தன்மை ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்பகுதியில் குத்துவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி சுயநினைவின்றி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி:

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: காலியான கொள்கலன்களை ஒருபோதும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது, அழிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடத்தில் புதைக்க வேண்டும். சுற்றுசூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில், பொட்டலம் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் சலவைகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

சேமிப்பு நிலை: பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தனி அறையில் உணவு மற்றும் கால்நடை தீவனத்திலிருந்து அசல் கொள்கலன்களில் சேமிக்கவும். குளிர்ந்த உலர்ந்த, நன்கு கட்டப்பட்ட மற்றும் நன்கு வெளிச்சம், நல்ல காற்றோட்டம் போதுமான அளவுகள் இடத்தில் சேமிக்கவும்.

வேதியியல் கலவை:

ஸ்பினோசாட் ஏ.ஐ.	45.00% வ/வ
டோனிக் அல்லாத/அனினோயிக் சர்பாக்டாண்ட் கலவை (எத்தோனைலேட்டட் மற்றும் சல்போனேட்டட் ஆகியவற்றின் கலவை ஹைட்ரோகார்பன்கள்)	5.00% வ/வ
பாலில்கைல் சிலோக்ஸேன்	1.00% வ/வ
ப்ரோபிலீன் கிளைகோல்	4.00% வ/வ
நீரேற்றப்பட்ட மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கேட்	0.43% வ/வ
தண்ணீர்	செய்ய வேண்டும்
மொத்தம்	100% வ/வ

எச்சரிக்கை: "மற்ற பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை விட".

Amish
CROP SCIENCES

SIRI SPINO

Spinosad 45% SC

(Insecticide)

ಸಿರಿ ಸ್ಪಿನೋ

ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್ ಸಿ

(ಕೀಟಕನಾಶಿನಿ)

सिरि स्पिनो

स्पिनोसैड ४५ प्रतिशत एस.सी.

(कीटनाशक)

சிரி ஸ்பினோ

ஸ்பினோசாட் 45% எஸ்.சி.

(கீடநாசினி)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகதம்தே தூரவிடி.

ಶಾಶ್ವತ ಅಪಾಯ
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಚುವುದು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚದುವವಲಯುನು.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-210646/2022-Spinosad (SC) (440)-124

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE