

थायोफेनेट मिथाइल ७०% डब्ल्यू.पि. (अंतर्वाही बुरशीनाशक)

आ एक अंतर्वाही बुरशीनाशक आहे. ज्या मधे भार प्रमाणे ७०% स.घ. थायोफेनेट मिथाइल आणि इतर सहायक पदार्थ आहे.

वापर :

पीक	रोमावर सामान्या नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण (कि.ग्राम.)	संवेग (लिटर)	पाण्याचे प्रमाण (मि.ली.)	शेवटी फवारणी व काँवर्गीतील अन्तर (दिवस)
पपीता	बुची फर्कंद	५००	७१५	७५०-१०००	४-८
वाटणीगोड	अँब्रिकोन	१०००	१४३०	७५०-१०००	१
एँगल	स्कॅव	५००	७१५	७५०-१०००	३

शिंपडणचे थंत्र :
नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्पेन्शन नेपसेक स्प्रेयर, एस.पी-एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

विषयवाढी लक्षणे : कंपन, वमि, पोटात दरद, डायरिआचे लक्षणे दिसून येतील.

प्रथमोपचाराचे उपाय : १. गिळले गेल्यास घशात बोटे घालून उलटी काढा. २. जर शरीरावर पडल्यास खूप घुवा. त्वचेवर इमोलिएट क्रीम वापर करा. **औषधोपचार :** लक्षणे पारखून करावेत व ते फक्त आहारसारखे आहेत. **सांदवण :** १. बुरशीनाशक पॅकेजिज, इतर माल विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत, किंवा ती त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकलपात ठेवावीत. २. बुरशीनाशकच्या साठवणी करता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेंड्याच्या. चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असावायत.

डेव्हेलॉपिंग विल्हेवट : १. रिकामी पॅकेजिज फाडून-तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. २. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिज पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत. ३. पॅकेजिज किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डेव्हेलॉपिंग विल्हेवट सुरुक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी. **वापरणाऱ्याची ध्यावयाची काळजी :** खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि आहारच्या दूर ठेवावे. शिडकाव करत वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालवे. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे घुवा व स्नान करा. रिकाम्या डब्या नष्ट करून, मासळीस इजा पोचत असल्यास त्या टिकाणी वापरू नका. पाण वनस्पतींवर वापरतांना स्थिर जलाशयाच्या अर्धाभागात ओषध टाका. या मुळे पाण्यातील मासळीस हजा पोचणावी शक्यता कमी होईल व या ओषधी पाण्यापासून गुठलींवर दूर ठेवा.

रासायनिक मिश्रण :

थायोफेनेट मिथाइल टॅक.	७४.४६% व/व (१४% व/व स.घ. चे आघारित)
रिटिकिंग एजेण्ट (पवू)	२.००% व/व
वेटिंग एजेण्ट (अल्काइल एराइल)	२.००% व/व
प्रेसीपिटेटेड सिलिका	१७.५४% व/व
सस्पेंडिंग एजेण्ट (सी.एम.सी.)	२.००% व/व
डिस्पर्सिंग एजेण्ट (अल्काइल नेपथाइल सल्फोनेट)	२.००% व/व
टायमोल-डी एम सल्फोनेट आई.डी.ई.टी-१०)	१.००% व/व
एएण	१.००% व/व
खबरदारी : हया लेवल आणि हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांचेरीन अन्य कुठल्याही पीकांवर याचा उपयोग करू नये.	

ढियोरोफोनेल् मीथिल 70% डब्ल्यू.पि. (विश्वेक्षणात्कृ शिंपडणकारक)

ಇದು ಒಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಢಿಯೋಫೋನಲ್ ಮಿಥೈಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ಸಸ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನ : ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸೈಲಿಯರ್, ಫ್ಲಾಕ್‌ಸೈಲಿಯರ್, ಸೈಲಿ ಬ್ಯಾರೊ ಸೈಲಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್‌ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್‌ಡಿಸ್ಕಾ ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪರ್‌ಪ್‌ಸೈಲಿಯರ್.

ವಿಷ್ಣುಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸೊಬಿಯಾ, ಮೆಟಿಂಗ್, ಎಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಷ್ಣುಸುವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದವರ ಗಂಟಿನ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚುಗಳಿಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸುರ್ ಮಾಡಿ. 2. ಚರ್ಪಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದವರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಸೋಕಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷನಿರೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕವನುಗೂಮಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಡಬಹುದು.

ಖಾಳಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಯಂತ್ರ ಸರಿಕರಣ ಮೂಲಕ ತೊಳೆದ ಔಷಧ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಸಕ್ತ ದೂರವಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಗೋಳಿಸದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬರದಂತೆ ರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲುವ ಇಡಬೇಕು. 3. ಖಾಳಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅಳವಾಗಿ, ಅಗಲುವ ಇಡಬೇಕು. **ಔಷಧಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಭದ್ರಪಡಿಸುವಿಕೆ :** 1. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಳಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಔಷಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಪ್ರತೀಕ ಕೋಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. **ಮುಂಜಾಗುತಗಳು :** ಡಸ್ಪೆಮಾನ್ಸ್ ಆಫ್‌ವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಂದಮುಖವಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಡುಗು ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲಡುಗು ಹುಡ್ ಆಫ್‌ವಾ ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಖಾಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಆಫ್‌ವಾಮಿಕ್ಸಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪದಾರ್ಥನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ನಿಂಪರಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಂದಾಕು ಜರಿಯಾವುದು, ಉಡುಗು ಮಾಡುವುದು ಆಫ್‌ವಾ ಬೀಡಿ ಸಿಗರಟು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ :

ಢಿಯೋಫೋನಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಟೆ.	74.46% ತೂಕ/ತೂಕ (ಭಾರಸುಸಾರ 94% ಎ.ಐ. ಆಧಾರಿತ)
ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಗ್ಲೂ)	2.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ವೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಸಿಎಮ್‌ಸಿ)	2.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆಲ್ಡ್ ಲೀನೇಪ್ಲೆಲ್)	2.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೆಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	17.54% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಲ್ಪೆಟೇಟ್ ಟಾಮೆಟ್-ಡಿ ಎಮ್	
ಸಲ್ಪೆಟೇಟ್ ಟಡಿ.ಐ.ಟಿ-10	2.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೊತ್ತ	100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ವಿಚಿತ್ರಿಕೆ: ಲಗತ್ತಿಟವಾದ ಕರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಥಿಯೋಫಾನೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್ 70% ಕರಾಯು ಮತ್ತು ಬಬ್ಲರ್ (ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಕರಾಯು ಮತ್ತು ಬಬ್ಲರ್)

ಇದು ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

Amish
CROP SCIENCES
Innovation Starts with Amish

SIRONA
Thiophanate Methyl 70% WP
(Systemic Fungicide)
ಸಿರೊನಾ
ಥಿಯೋಫೇನೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ

(ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಕರಾಯು ಮತ್ತು ಬಬ್ಲರ್)
ಇದು ಉತ್ತಮ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ 70% ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಶಿಪಾರಸುಗಳು :

ಪದಾರ್ಥ	ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಹಸರು ಹಸರು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 4-8
ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 1000 1430 750-1000 1
ಫಲಾಂಗಿ ಹಣ್ಣು	ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ದನೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಪದುವೆ ಇದುವ ಸಮಯದ 500 715 750-1000 3

ಫಯೋಫೋನೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ (ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಕರಾಯು ಮತ್ತು ಬಬ್ಲರ್)
Caution: "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

ಕಾಷ್ಠಾಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಪಿರಿಸಿ.
CAUTION
Green
READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ಕುವೆಂಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕೆಲವು ಮರುಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಮರುಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಾಗಿ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟಿ
ಸಾರಿ ಪರ್ವಿ ಪುರಿ ಪಟ್ಟಿ

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumalpadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.
उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमीश क्रॉप साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
सर्व नं: १७२, उदुमलपाडु (ग्राम), धोण (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) - ५१८ २२२ आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No. +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsur.com Office : Agrisul House,
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
ಇಮೋಶಿ ಸಿಪೋನೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಗ್ರಾ.ಮ್. ಮತ್ತು 30% ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-133705/2016-Thiophanate Methyl (WP) (356)-174
FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

