VIBRANZ

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC (Insecticide)

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC is a Suspension Concentration containing Novaluron 5.25% (a.i) and Emamectin Benzoate 0.9% (a.i) in the formulation. It is used for the control of Diamond back moth (DBM) & Tobacco caterpillar on Cabbage, Gram pod borer & Tobacco caterpillar in Chilli, Gram pod borer in Redgram, stem borer in Rice, Shoot & Fruit borer in Brinjal and Pod borer in Chickpea.

Recommendations :

Crop	Pest		Dosage / ha			Waiting period between last spray to harvest (days)
	Common name	Scientific name	a.i (grms)	Formulation (ml)	Dilution (litres)	
Cabbage	Diamond back moth (DBM), Tobacco caterpillar	*Plutella xylostella, Spodoptera litura*	45.94 + 7.87	875	500	3
Chilli	Gram pod borer, Tobacco caterpillar	*Helicoverpa armigera, Spodoptera litura*	45.94 + 7.87	875	500	3
Red-gram	Gram pod borer	*Helicoverpa armigera*	45.94 + 7.87	875	500	25
Rice	Stem borer	*Scirpophaga incertulas*	78.75 + 13.50	1500	500	32
Brinjal	Shoot & Fruit borer	*Leucinodes orbonalis*	78.75 + 13.50	1500	500	5
Chickpea	Pod borer	*Helicoverpa armigera*	45.94+ 7.88	875	500	11

Direction for use: Take the measured quantity of insecticide Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water. Stir well to form final spray solution.
Equipment used in the application: Knapsack Sprayer fitted with hollow cone nozzle.
Time of application: Spray to be initiated, when pest's population reaches economic threshold level (ETL).
Usage of Pesticides in confined area: Not allowed.
Application Techniques : Foliar application
Frequency Including Maximum Number of Sprays: 3 sprays are required at an interval of 10 days depending upon the pest infestation.
Stages during which pesticide should not be applied for on any crop: Refer to the above recommendation.
Precautions to be taken to avoid harm to beneficial : Do not use in those situation if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.
Instruction for mixing : Thoroughly mix the recommended quantity of pesticide into the water volume recommended for unit area.
Stage for application: Vegetative stage and at the time of incidence of the pests above economic threshold level (ETL)
Nozzle Type : Hollow cone nozzle.
Dosage: Please refer the above table.
Pre-Harvest Interval: Please refer the above table.
Re-entry period : 24 hours.
Weather conditions: Do not spray during windy conditions.
Soil and Water : Light to heavy soil. Clean water to be used for spray.
Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.
Symptoms of Poisoning: Inhalation may cause coughing, shortness of breath, chemical pneumonitis, lung oedema, bronchospasm. Ingestion may cause vomiting, diarrhoea. In case of skin contact, redness, oedema or dermatitis may occur. Eye contact may result in tears or redness. Early symptoms of poisoning may be a combination of Dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia and muscle tremors.
First Aid Measures: 1. If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glasses of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. **3.In case of skin contact:** Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4.In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.
Antidote : Treat symptomatically and give supportive therapy.
Safety Precautions: 1.Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3.Avoid Inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5.Do not eat, drink and smoke during spraying. 6.Wear full protective clothing while mixing and spraying.
Storage Conditions: 1. The package containing pesticide shall be stored in separate rooms or premises away from storing other articles or shall be in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the pesticide. 2. The rooms or premises means for storing pesticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of pesticides.
Disposal of used container: 1.It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS.

Chemical Composition:

Novaluron a.i.	5.25%w/w
Emamectin Benzoate a.i.	0.90%w/w
Ammonium Salt of Polyarylphenyl ether sulphate	2.00%w/w
Tristearyl phenol ethylene oxide	7.00%w/w
Propylene glycol	10.00%w/w
Dimethyl sulfoxide	7.85%w/w
Ethylene oxide propylene oxide block copolymer	4.39%w/w
1,2 Benzisothiazoline-3-one	0.05%w/w
Polysiloxane	1.00%w/w
Xanthan gum	0.30%w/w
Water	q.s
Total	100.00%w/w

Cautionary Statement : 1. Not to be used on crops other than mentioned on label & leaflets. 2. The product is reported to be very toxic to aquatic organisms and thus its use in and around the water bodies should be avoided.

వైబ్రంజ్

నొవల్యురాన్ 5.25% + ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% బ/బ ఎస్‌సి (కీటకనాశని)

నొవల్యురాన్5.25% + ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% బ/బ ఎస్‌సి అనేది ఫార్ములేషన్‌లో నోవాలురాన్ 5.25% (ఎ.ఐ) మరియు ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% (ఎ.ఐ)ని కలిగి వున్న సస్పెన్షన్ కాన్‌సన్‌ట్రేట్. క్యాబేజిలో డైమండ్ బ్యాక్ మోత్ (డిబిఎం) మరియు పొగాకు గొంగళిపురుగులు, మిరపలో కాయ తొలుచు పురుగు మరియు పొగాకు గొంగళిపురుగు, కందిలో కాయ తొలుచు పురుగు, వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు, వంగలో కాండం మరియు కాయ తొలుచు పురుగు మరియు శనగలో కాయ తొలుచు పురుగును నియంత్రించేందుకు దీనిని ఉపయోగించాలి.

సిఫారసులు:

పంట	కీటకం		మోతాదు/ఒక్కో హెక్టారుకు			చివరి పిచికారి నుంచి పంట కోసేంత వరకు వేచివుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
	మామూలు పేరు	శాస్త్రీయ పేరు	ఎ.ఐ (గ్రాములు)	సూత్రీకరణ (మి.లీ)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	
క్యాబేజి	డైమండ్ బ్యాక్ మోత్ (డిబిఎం), పొగాకు గొంగళి పురుగు	ప్లూటెల్లా జైలోస్టెల్లా, స్పోడోప్టెరా లిటురా	45.94 + 7.87	875	500	3
మిరప	కాయ తొలుచు పురుగులు, పొగాకు గొంగళి పురుగు	హెలికోవెర్పా అర్మిజెరా, స్పోడోప్టెరా లిటురా	45.94 + 7.87	875	500	3
కంది	కంది కాయ తొలుచు పురుగు,	హెలికోవెర్పా అర్మిజెరా,	45.94 + 7.87	875	500	25
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు	స్కిరోఫేజ్ ఇన్‌సెర్టులాస్	78.75 + 13.50	1500	500	32
వంగ	కాండం మరియు కాయ తొలుచు పురుగు	ల్యూసినోడెస్ ఓర్బోనాలిస్	78.75 + 13.50	1500	500	5
శనగ	కాయ తొలుచు పురుగు	హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా	45.94+ 7.88	875	500	11

ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: నొవల్యురాన్ 5.25% + ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% బ/బ ఎస్‌సి కీటకనాశినిని కొలత ప్రకారం తీసుకోండి మరియు దీనికి కొద్ది మొత్తంలో నీరు కలపండి. కర్ర లేదా రాడ్‌ని ఉపయోగించి బాగా కలియబెట్టండి మరియు మిగతా పరిమాణంలో నీటిని కలపండి. తుది పిచికారి ద్రావకం ఏర్పరిచేందుకు బాగా కలియబెట్టండి.
అప్లికేషన్‌లో ఉపయోగించవలసిన పరికరం: హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్.
వినియోగించవలసిన సమయం: కీటకాల సంఖ్య ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్‌ని (ఇటిఎల్) చేరుకున్నప్పుడు పిచికారి ప్రారంభించాలి.
పరిమిత ప్రాంతంలో పురుగుమందుల వాడకం: అనుమతించబడదు.
వినియోగించవలసిన టెక్నిక్‌లు: ఆకులపై పిచికారి చేయాలి.
గరిష్ట పిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: తెగులు ఉధృతినిబట్టి 10 రోజుల వ్యవధిలో 3 స్ప్రేలు అవసరం.
ఏ పంటపై కూడా పురుగుమందులను ఉపయోగించకూడని దశలు: పైన చేసిన సిఫారసు చదవండి.
మిత్ర కీటకాలకు హాని కలగడాన్ని నివారించేందుకు తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు: తేనెటీగలకు మరియు చేపలకు, లైవ్‌స్టాక్‌కి, వన్య పక్షులకు మరియు జంతువులకు హాని కలిగించే పరిస్థితిలో ఉపయోగించకండి.
మిశ్రమం చేసేందుకు సూచన: ప్రతి యూనిట్ ఏరియాకు సిఫారసు చేసిన నీటి పరిమాణంలోకి, సిఫారసు చేసిన పరిమాణంలో పురుగుమందును బాగా మిశ్రమం చేయండి.
వినియోగించవలసిన దశ: పైరు దశ మరియు కీటకాలు ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్‌ని (ఇటిఎల్) చేరుకున్న సమయంలో
నాజిల్ రకం: హాలో కోన్ నాజిల్.
మోతాదు: దయచేసి పై పట్టిక చదవండి
పంట కోత ముందరి విరామం: దయచేసి పై పట్టిక చదవండి
పునర్‌ప్రవేశం: 24 గంటలు
వాతావరణ పరిస్థితులు: గాలి వీస్తున్న పరిస్థితుల్లో పిచికారి చేయకండి.
నేల మరియు నీరు: చవుడు నేలల నుంచి నల్లరేగడి నేలలు. పిచికారి చేసేందుకు పరిశుభ్రమైన నీటిని ఉపయోగించాలి.
మొక్కకు విషతుల్యత: సిఫారసు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు మొక్కను ఉత్పాదన విషతుల్యం చేయదు.
విషపు లక్షణాలు: పీల్చడం వల్ల దగ్గు, శ్వాస తీసుకోలేకపోవడం, రసాయనిక న్యుమోనైటిస్, ఊపిరితిత్తుల వాపు, బ్రోంకోస్పాజమ్ కలగవచ్చు. మింగడం వల్ల వాంతులు, అతిసారం కలగవచ్చు. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే, ఎర్రబడటం, వాపు లేదా చర్మవ్యాధి కలగవచ్చు. కళ్ళకు తగిలితే కన్నీరుకారడం లేదా ఎర్రబడటం కలగవచ్చు. విషం యొక్క ప్రారంభ లక్షణాల్లో కనుపాపలు పెద్దవి కావడం, కండరాల అసమన్వయం, అటాక్సియా మరియు కండరాల వణుకుడు సమ్మేళనం ఉండొచ్చు.
ప్రాథమిక చికిత్స చర్యలు: 1. మింగితే: వ్యక్తి కనుక స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడగండి మరియు త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారకస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వకండి. డాక్టరును పిలిపించండి. హాజరవుతున్న ఫిజీషియన్ కోరుకుంటే తప్ప వాంతులు తెప్పించవద్దు. **2. పీల్చితే:** రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. రోగికి ఊపిరాడకపోతుంటే లేదా ఊపిరితీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి, నోటితో శ్వాస అందించడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. **3. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే:** సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగండి. నొప్పి, ఎరుపుదనం లేదా చికాకు ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినపడిన దుస్తులన్నిటినీ విప్పేసి ఉపయోగించడానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో వేరుగా బాగా కడగండి. **4. ఒకవేళ కంటికి తగిలితే:** ఎక్కువ నీటితో కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కడగండి. నొప్పి, చికాకు ఎరుపుదనం లేదా ఫోటోఫోబియా ఉంటే, కంటి స్పెషలిస్టును సంప్రదించండి.
విరుగుడు: లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి మరియు సపోర్టివ్ థెరపిని ఇవ్వవచ్చు.
ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాలకు, మేతకు దూరంగా దీన్ని వుంచండి. 2. దీన్ని నోటికి, చర్మానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. 3. స్ప్రే ద్రావకపు పొగమంచును పీల్చరాదు. పిచికారిని గాలివాటం చూసుకొని పిచికారి చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టల్ని, శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. దీన్ని పిచికారి చేసుకొనేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, పొగ పీల్చడం, పొగాకు నమలడం లాంటి పనులేమీ చేయరాదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు మరియు పిచికారి చేసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి.
నిల్వ పరిస్థితులు: 1. ఈ శిలీంద్రనాశినిగల ప్యాకేజీలను వాటి యొక్క ఒరిజినల్ ప్యాకెట్లలోనే వుంచి, ఇతర పదార్థములు అంటే మరిముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములు, పశువుల దాణాలను నిల్వ చేసే గదులలో గాకుండా వేరువేరుగా వాటి యొక్క సైజము మరియు పరిమాణాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలోపెట్టి తాళంవేసి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. కీటకనాశని ఆవిరితో పర్యావరణం కలుషితమవ్వడాన్ని నిరోధించేందుకు వీలుగా కీటకనాశనులను నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించినవై, పొడిగా ఉన్నవై, బాగా వెలుతురు మరియు గాలి వచ్చేవై మరియు తగినంత చుట్టుకొలతలతో నిర్మించినవై ఉండాలి.
ఖాళీ డబ్బాలను పారేయుట: 1. ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిపోయిన మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం లేని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలసిన బాధ్యత కీటకనాశిని తయారీదారులది, రూపకర్తలది మరియు ఆపరేటర్‌లది. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట పడేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

రసాయనిక మిశ్రమం:

నొవలురాన్ ఎ.ఐ.	5.25% బ/బ
ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ ఎ.ఐ.	0.90% బ/బ
పాలిఅరైల్‌ఫెనాయిల్ ఇథర్ సల్ఫేట్ యొక్క అమ్మోనియం సాల్ట్	2.00% బ/బ
ట్రైస్టెరైల్ ఫెనాయిల్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్	7.00% బ/బ
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	10.00% బ/బ
డైమిథైల్ సల్ఫోక్సైడ్	7.85% బ/బ
ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ ప్రొపిలీన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్	4.39% బ/బ
1, 2 బెంజిసాథియాజోలైన్-3-ఓన్	0.05% బ/బ
పాలిసిలోక్సేన్	1.00% బ/బ
జాంథమ్ గమ్	0.30% బ/బ
నీళ్ళు	కావలసినన్ని
మొత్తం	100.00% బ/బ

హెచ్చరిక స్టేట్‌మెంట్ : 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రాల్లో పేర్కొన్న వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. 2. ఉత్పాదన జలచరాలకు చాలా విషపూరితంగా రిపోర్టు చేయబడింది, కాబట్టి నీటి మడుగుల్లో మరియు దరిదాపుల్లో ఉపయోగించకూడదు.

ବିବ୍ରଣଜ଼

ନୋଭାଲୁରନ୍ ୫.୨୫% + ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୦.୯% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍‌ସି (କୀଟନାଶକ)

ନୋଭାଲ୍ୟୁରନ୍ ୫.୨୫% ଏ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୦.୯% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍‌ସି ହେଉଛି ଏକ ସସ୍‌ପେନ୍‌ଶନ୍ କନ୍‌ସେଣ୍ଟ୍ରେଶନ୍ । ଏହି ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ରେ ଅଛି ନୋଭାଲ୍ୟୁରନ୍ ୫.୨୫% (ସ.ଉ.) ଏବଂ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୦.୯% (ସ.ଉ.) । ଏହାକୁ ବନ୍ଧାକୋବି'ର ଠିକିରିଆ ପୋକ (ଡିବିଏମ୍) ଓ ଟବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲାର, ଲଙ୍କାମରିଚ ଫସଲରେ ଚଣା କୋଷା ବେଧକ ଓ ଟବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲାର, ମସୁର ଡାଲିରେ ଚଣା କୋଷା ବେଧକ, ଧାନରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ବାଇଗଣରେ ପ୍ରରୋହ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଏବଂ ଚଣା/ବୁଟ କୋଷା ବେଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ସୁପାରିଶ :

ଫସଲ	ପୋକଙ୍କ		ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର			ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ପରଠୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
	ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନାମ	ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ମିଶେଇବା ପାଣି (ଲିଟର)	
ବନ୍ଧାକୋବି	ଠିକିରିଆ ପୋକ (ଡିବିଏମ୍), ଟୋବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲାର୍	ପ୍ଲୁଟେଲା କ୍ସାଇଲୋଷ୍ଟେଲା, ସ୍ପୋଡୋପ୍ଟେରା ଲିଟୁରା	୪୫.୯୪ + ୭.୮୭	୮୭୫	୫୦୦	୩
ଲଙ୍କାମରିଚ	ଚଣା କୋଷା ବିନ୍ଧା ପୋକ, ଟୋବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲାର୍	ହେଲିକୋଭର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା, ସ୍ପୋଡୋପ୍ଟେରା ଲିଟୁରା	୪୫.୯୪ + ୭.୮୭	୮୭୫	୫୦୦	୩
ମସୁର	ଚଣା କୋଷା ବିନ୍ଧା	ହେଲିକୋଭର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା	୪୫.୯୪ + ୭.୮୭	୮୭୫	୫୦୦	୨୫
ଧାନ	କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା	ସିର୍ପୋଫାଗା ଇନ୍‌ସର୍ଟୁଲାସ୍	୭୮.୭୫ + ୧୩.୫୦	୧୫୦୦	୫୦୦	୩୨
ବାଇଗଣ	ପ୍ରରୋହ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ	ଲ୍ୟୁସିନୋଡ୍‌ସ ଅର୍ବୋନାଲିସ୍	୭୮.୭୫+ ୧୩.୫୦	୧୫୦୦	୫୦୦	୫
ଚଣା/ବୁଟ	କୋଷା ବେଧକ	ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆମଜେରା	୪୫.୯୪+ ୭.୮୮	୮୭୫	୫୦୦	୧୧

ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ମପାଚୁପା ମାତ୍ରାର କୀଟନାଶକ ନୋଭାଲ୍ୟୁରନ୍ ୫.୨୫% + ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୦.୯% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ୍‌ସି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଖଣ୍ଡେ ଛଡ଼ ବା କାଠିରେ ଭଲଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣ ପାଇବା ସକାଶେ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ।
ଉପଯୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ : ହଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗା ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ।
ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ସ୍ତର (ଇଟିଏଲ୍) ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଞ୍ଚନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଦରକାର ।
ଆବଦ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର : ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି : ପତ୍ରାବଳୀ ସିଞ୍ଚନ
ସିଞ୍ଚନର ସମୟ ଅନ୍ତର ଓ ସର୍ବାଧିକ ଥର : ୩ ଥର ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ, ଯାହା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଅବଧିରେ କୀଟନାଶକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଫସଲ: ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏହିସବୁ କ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସାବଧାନତା: ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ଓ ମାଛ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ୟୁନିଟ ଏରିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର କୀଟନାଶକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାତ୍ରାର ପାଣି ସହିତ ଭଲଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ ।
ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ଉଦ୍ଭିଦ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ସ୍ତର (ଇଟିଏଲ୍)ରୁ ଅଧିକ ହେଲାବେଳେ ।
ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : ହଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍
ମାତ୍ରା: ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଅମଳ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବଧାନ: ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ପୁନଃପ୍ରୟୋଗ: ୨୪ ଘଣ୍ଟା
ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି : ଜୋର୍ ପବନ ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ: ହାଲୁକାରୁ ନିଦା ମାଟି। ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ।
ପାଦପ ବିଷାକ୍ତତା: ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ଉତ୍ପାଦଟି ପାଦପ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ।
ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ କାଶିବା, ଖର ଶ୍ୱାସ, ରାସାୟନିକ ନ୍ୟୁମୋନାଇଟିସ୍, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଓଡେମା, ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍ପାଜମ୍ କରାଇପାରେ । ପେଟକୁ ଗଲେ, ବାନ୍ତି, ଅତିସାର କରାଇପାରେ । ଦେହରେ ଲାଗିଲେ, ନାଲି ପଡ଼ିବା, ଓଡେମା କିମ୍ବା ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହୋଇପାରେ । ଆଖିରେ ଲାଗିଲେ/ପଡ଼ିଲେ ଲୁହ ଗଡ଼ିପାରେ ବା ଆଖି ନାଲି ହୋଇପାରେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଆଖି ଡୋଳା ବିସ୍ଫାରିତ ହେବା, ମାଂସପେଶୀ ଅସଂଯମ ହେବା, ଆଟାକ୍‌ସିଆ ଓ ମାଂସପେଶୀ ଧକ୍ ଧକ୍ ।ହବା ଭଳି ମିଶିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇ ପାରେ ।
ପ୍ରଥମୋପଚାର : ୧. ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ: ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତ ଆଉ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ପାଣିରେ ତୁଣ୍ଡ ଧୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ୧-୨ ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡ ବାଟେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । **୨. ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ:** ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ ବା କଷ୍ଟରେ ନେଉଥିଲେ, କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । **୩. ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ:** ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ, ନାଲିପଣ କି ଜଳାପୋଡ଼ା ଜାରି ରହିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟାଙ୍କୁ ଅଲଗାକରି ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ । **୪. ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ:** ଆଖିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣିରେ ଭଲକରି ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ, ଜଳାପୋଡ଼ା, ନାଲିଆପଣ ଅଥବା ଫୋଟୋଫୋବିଆ ଜାରି ରହିଲେ, ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ।
ବିଷଘ୍ନ : ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଓ ସହାୟକ ଉପଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା : ୧. ଖାଦ୍ୟ-ଦ୍ରବ୍ୟ, ରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରାଣୀଚାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ୨. ତୁଣ୍ଡ, ଆଖି ଓ ଦେହରେ ଲାଗିବା/ପଡ଼ବା ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ୩. ସିଞ୍ଚନକଣ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବାଠୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପବନ ବୋହିବା ପଟରୁ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ୪. ସିଞ୍ଚିସାରିବା ପରେ, ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା, ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫାକରି ଧୁଅନ୍ତୁ । ୫. ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଖାନ-ପାନ ଓ ଧୂମ୍ରପାନ ମନା । ୬. ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପୂରା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ।
ମହଜୁଦକରଣ ଅବସ୍ଥା : ୧. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ୨. ଫିମ୍ପିନାଶକ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀଟି ସୁଦୃଢ଼, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ ଓ ବାୟବୀୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଫିମ୍ପିନାଶକର ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ।
ଖାଲି ପାତ୍ରର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ: ୧. ଏହା ନିର୍ମାତା, କୀନନାଶକ ଫର୍ମୁଲେଟର୍ ଏବଂ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଏହା ଦାୟୀତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ବଳକା ପଦାର୍ଥର ନିଷ୍କାସନ ଓ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ କରିବେ ଯେପରି ତାହା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବ । ୨. ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନକରିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

ନୋଭାଲୁରନ୍ ସ.ଉ.	୫.୨୫%ଓଜନ/ଓଜନ
ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ସ.ଉ.	୦.୯୦%ଓଜନ/ଓଜନ
ଆମୋନିଅମ ସଲ୍‌ଟ ଅଫ୍ ପଲିଏରିଲ୍‌ଫେନିଲ୍ ଇଥର୍ ସଲ୍‌ଫେଟ୍	୨.୦୦%ଓଜନ/ଓଜନ
ଟ୍ରାଇଷ୍ଟିଅରିଲ୍ ଫେନଲ୍ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍	୭.୦୦%ଓଜନ/ଓଜନ
ପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୧୦.୦୦%ଓଜନ/ଓଜନ
ଡାଇମେଥିଲ୍ ସଲ୍‌ଫୋକ୍‌ସାଇଡ୍	୭.୮୫%ଓଜନ/ଓଜନ
ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍ ପ୍ରପିଲିନ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କୋପଲିମର୍	୪.୩୯%ଓଜନ/ଓଜନ
୧,୨ ବେଞ୍ଜସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ୱାନ୍	୦.୦୫%ଓଜନ/ଓଜନ
ପଲିସିଲୋକ୍‌ସେନ୍	୧.୦୦%ଓଜନ/ଓଜନ
କ୍ସାନ୍ଥନ୍ ଗମ୍	୦.୩୦%ଓଜନ/ଓଜନ
ପାଣି	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
ମୋଟ	୧୦୦.୦୦%ଓଜନ/ଓଜନ

ସତର୍କତାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ : ୧. ଲେବଲ୍ ଓ ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ମନା । ୨. ଜଳଜାତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଅତି ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି, ସୁତରାଂ ପାଣି ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଆଖପାଖରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ।

Amish CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

VIBRANZ

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC (Insecticide)

వైబ్రంజ్

నొవల్యురాన్ 5.25% + ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% బ/బ ఎస్‌సి (కీటకనాశని)

वैब्रंज

नोवाल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेन्जोंएट 0.9% भार/भार एस सी (कीटनाशक)

ವೈಬ್ರೆಂಜ್

ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% + ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

INSTRUCTIONS FOR USE

Read enclosed leaflet before use.
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े ।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल: customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : **KNL/49/COMM/PM/2018/5281**
Reg. No. : CIR-222417/2022-NOVALURAN + EMAMECTIN BENZOATE (SC) (442)-160

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

वैब्रंज

नोवाल्युरॉन ५.२५% +
इमामेक्टीन बेन्जोंएट ०.९% भार/भार एस सी
(कीटनाशक)

नोवालुरॉन ५.२५% + इमामेक्टिन बेंजोएट ०.९% डब्ल्यू /डब्ल्यू एससी एक सस्पेंशन कॉन्सन्ट्रेशन है जिसमें नोवालुरॉन ५.२५% (स.त.) तथा इमामेक्टिन बेंजोएट ०.९% फॉम्यूलेशन में है. इसका इस्तेमाल पत्ता गोभी में हीरकपृष्ठ शलभ (डीबीएम) तथा तम्बाकू की इल्ली; मिर्च में चने की फली छेदक व तम्बाकू की इल्ली; अरहर में चने की फली छेदक ; धान में तना छेदक, बैंगन पर प्ररोह छेदक और फल छेदक और चना पर फली छेदक की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट		मात्रा/हैक्टेयर			अंतिम छिडकाव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि. लि.)	पानी की मात्रा (लिटर)	
बन्दगोभी	हीरकपृष्ठ शलभ (डीबीएम), तम्बाकुवाली इल्ली	प्ल्युटेला झायलोस्टेला स्पोडोप्टेरा लिट्युरा	४५.९४ + ७.८७	८७५	५००	३
मिर्च	चने की फली छेदक, तम्बाकुवाली इल्ली	हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा स्पोडोप्टेरा लिट्युरा	४५.९४ + ७.८७	८७५	५००	३
अरहर	चने की फली छेदक	हेलीकोवर्पा आर्मीगेरा	४५.९४ + ७.८७	८७५	५००	२५
धान	तना छेदक	स्सिर्पोफागा इन्सर्तुलास	७८.७५ + १३.५०	१५००	५००	३२
बैंगन	प्ररोह छेदक और फल छेदक	ल्यूसीनोड्स ऑर्बोनालिस	७८.७५ + १३.५०	१५००	५००	५
चना	फली छेदक	हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा	४५.९४+ ७.८८	८७५	५००	११

प्रयोग के लिए निर्देश: नोवाल्युरॉन ५.२५% + इमामेक्टीन बेन्जोंएट ०.९% भार/भार एस सी उत्पादन की प्रमाणित मात्रा लिजिए और उसमें थोडासा पानी मिलाइए। छडी या रॉड से अच्छी तरह से हिलाइए और बाद में पानी की शेष मात्रा मिलाइए। छिडकाव घोल बनाने के लिए अच्छे से हिलाइए।
प्रयोग में आने वाले यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर जिसपर खोखले शंकु नोजल लगे हुए यंत्र का प्रयोग करें।
अनुप्रयोग का समय: स्प्रे तब शुरू करना चाहिए, जब कीटों की आबादी इकॉनामिक थ्रेशोल्ड लेवल (ईटीएल) तक पहुँचे।
कीटनाशक का समिति जगह पर ही उपयोग करें : लागू नहीं।
इस्तेमाल की तकनीक : पत्तो पर उपयोग।
आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम मात्रा: ३ स्प्रे की प्रकोप के आधार पर १० दिनो के अंतराल पर अवश्यक है।
परिस्थिति जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगे, नहीं दी जाएगी: उपर दिए गए पत्रभाग को पढें।
सावधानियां और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को उपलब्ध कराना : उन स्थितियों में उपयोग न करें यदि मधुमक्खियों और मछली, पशुधन, जंगली पक्षियों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है।
मिश्रण के लिए निर्देश : इकाई क्षेत्र के लिए कीटनाशक की सिफारिश की गई मात्रा को अच्छी तरह से पानी की मात्रा में मिलाएं।
इस्तेमाल के लिए चरण : वनस्पति चरण और आर्थिक दहलीज स्तर से ऊपर (ईटीएल) कीट होने के समय।
नोज़ल प्रकार: खोखले कोन का नोज़ल।
मात्रा : उपर दिए गए पत्रभाग को पढें।
संभावित पूर्ण– फसल अन्तराल : उपर दिए गए पत्रभाग को पढें।
पुन:प्रविष्टि: २४ घंटे।
मौसम की स्थिति : तेज हवा की स्थिति के दौरान छीडकाव न करें।
मृदा और जल: हल्की से भारी मिट्टी तक के लिए। छिड़काव के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें।
पौध विषाक्तता :सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।
विषाक्तीकरन के लक्षण: सांस द्वारा अंदर जाने से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, रसायन न्यूमोनीटस, फेफड़े में ओडिमा, ब्रोकोस्पासम, उल्टी आना, मितली व दस्त आना, त्वचा लाल, खुजली, आंसू आना, आंखे लाल होना, पुतली फैलना, असन्तुलन, एटाक्सिया, लड़खड़ाना और मांस पेशियो में ऐंठन।
प्राथमिक उपचार: १. अगर निगल लिया हो: यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह धुलवाएं और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कभी भी कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलावाएं. जब तक मरीज की परिचर्या चिकित्सक न करने लगे तब तक उल्टी न करवाएं। **२. अगर साँस से ले लिया हो:** मरीज को ताजा हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। अगर मरीज साँस नहीं ले रहा या साँस ले ने में मुश्किल आ रही है, तो विशेषतः मुंह से कृत्रिम श्वसन दें. चिकित्सक से परामर्श करें। **३.त्वचा से संपर्क के मामले में:** साबुन और ढेर सारे पानी से धोएं. अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से अलग कर साबुन और पानी से धोने चाहिए। **४. आँख से संपर्क के मामले में:** कम से कम १५ मिनट तक आहिस्ता से धोएं। अगर दर्द, जलन, लाली या असहनीयता बनी रहती है, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।
प्रतिकारक : लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक उपचार दीजिए।
सुरक्षा पूर्वाधानियाँ: १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खास कर खादय पदार्थ संग्रहीत किए हुए कमरे या जगह से दूर, अलग कमरे मे या अलग जगपर या स्वतंत्र अलमारी मे ताला चाबी मे बंद रखे। २. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा, हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहियें। जिससे भाप प्रदूषण होने का भय न हों।
खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्म्यूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का कर्तव्य होगा कि डिब्बों या बची हुई सामग्रियों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो. २. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। ३. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।
खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।
रासायनिक संरचना:

नोवाल्युरॉन स.त.	५.२५% भार/भार
इमामेक्टीन बेन्जोंएट स.त.	०.९०% भार/भार
अमोनियम सॉल्ट ऑफ पोलिअरायलफिनायल इथर सल्फेट	२.००% भार/भार
ट्रायस्टेरायल फिनोल एथिलीन ऑक्साइड	७.००% भार/भार
प्रोपीलेन ग्लायकोल	१०.००% भार/भार
डायमिथाइल सल्फोक्साइड	७.८५% भार/भार
एथिलीन ऑक्साइडप्रोपीलेन ऑक्साइडब्लॉक कोपोलिमर	४.३९% भार/भार
१,२ बेन्जिसोथायझोलीन–३–वन	०.०५% भार/भार
पोलीसिलोज़ेन	१.००% भार/भार
ज़ेन्थन गम	०.३०% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्र% भार/भार
कुल	१००.००% भार/भार

सावधानियाँ कथन : १. पत्रिका व लेबल मे दिये हुये फसलो के अलावा अन्य के लिये उपयोगित नही है। २. उत्पाद को जलीय जीवों के लिए बहुत जहरीला बताया गया है और इस प्रकार जल निकायों में और उसके आसपास इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए।

ವೈಬ್ರೆಂಜ್

ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% +
ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% + ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ್ 0.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ, ಇದು ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% (ಸ.ಘ.) ಮತ್ತು ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ್ 0.9% (ಸ.ಘ.) ಸೇರಿರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೆಳೆಯ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ಚಿಟ್ಟೆ (DBM) ಮತ್ತು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳಿಹುಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕಾಳು ಬೀಜ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳಿಹುಳ, ತೊಗರಿಯ ಕಾಳು ಬೀಜ ಕೊರಕ, ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಯಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಬದನೆಯ ಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯ ಬೀಜ ಕೊರಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟ		ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ			ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು	ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ತೆಳು ಮಾಡುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	
ಎಲೆಕೋಸು	ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ನೊಣ (DBM), ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ	ಫ್ಲುಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ಸೈಲೊಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ	45.94 + 7.87	875	500	3
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ	ಹೆಲಿಕೊವೆರ್ಪಾ ಅರ್ಮಿಜೆರಾ, ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ	45.94 + 7.87	875	500	3
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ	ಹೆಲಿಕೊವೆರ್ಪಾ ಅರ್ಮಿಜೆರಾ,	45.94 + 7.87	875	500	25
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	ಸಿರ್ಫೊಫಾಗಾ ಇನ್‌ಸೆರ್ಟುಲಾಸ್	78.75 + 13.50	1500	500	32
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ	ಲೆಯುಸಿನೋಡ್ಸ್ ಒರ್ಬೊನಾಲಿಸ್	78.75 + 13.50	1500	500	5
ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ	ಹೆಲಿಕೊವೆರ್ಪಾ ಅರ್ಮಿಜೆರಾ	45.94+ 7.88	875	500	11

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕ ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% + ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ್ 0.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಒಂದು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತ ಬಾಕಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತ ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಿ.
ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ: ಹೊಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.
ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಷ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ETL) ತಲುಪಿದಾಗ **ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.**
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಬಳಕೆ: ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ.
ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಬಾರದು ಬೆಳೆ: ಮೇಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ.
ಉಪಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಜೇನು ನೊಣ, ಮೀನು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡು ಪಶು-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಯುನಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರಿ.
ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹಂತ: ವನಸ್ಪತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಷ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ETL) ತಲುಪಿದಾಗ.
ನಾಝಲ್‌ನ ಮಾದರಿ: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್.
ಪ್ರಮಾಣ: ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಕಟಾವು ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡಿ.
ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ: 24 ಗಂಟೆಗಳು.
ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಡಿ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಹಗುರದಿಂದ ಬಾರವಾದ ಮಣ್ಣು. ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸ್ ಅನುಸಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ಉತ್ಪಾದನವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.
ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರು ಕಿರಿದಾಗುವುದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂಮೋನೈಟಿಸ್, ಲಂಗ್ ಒಡೆಮಾ, ಬ್ರೊಂಕೊಸ್ಪಾಸ್ಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದರೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಭೇದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಿದರೆ, ತ್ವಚೆ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಒಡೆಮಾ ಅಥವಾ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಯ ಡೈಲೇಶನ್, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಕಂಪನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಷ ತಗಲಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬರಬಹುದು.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಾಯಗಳು: 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ, ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ: ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 3. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ: ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಗಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉರಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಿರಿ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆರೆತ ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ : ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಿರಿ
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ, ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪರಣೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.
ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2) ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಬೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೇಕು.
ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆದುಬಿಡಬಾರದು. 3. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ ಸ. ಘ.	5.25% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಸ.ಘ.	0.90% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪೊಲಿಅರೈಲ್‌ಫೆನಿಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಟ್ರೈಸ್ಟೈರಿಲ್ ಫೆನಾಲ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್	7.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋಕ್ಸೈಡ	7.85% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಥೈಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪೊಲಿಮರ್	4.39% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
1, 2 ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಝೊಲಿನ್-3-ವನ್	0.05% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪೊಲಿಸಿಲೊಕ್ಸೇನ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	0.30% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಈ ಉತ್ಪಾದನವು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು.

விப்ரன்ஸ்

நோவாலுரோன் 5.25% +
எமாமெக்டின் பென்ஜோயேட் 0.9% w/w SC
(பூச்சிக்கொல்லி)

நோவாலுரோன் 5.25% + எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 0.9 டபிள்யு/டபிள்யு எஸ்சி என்பது நோவாலுரோன் 5.25% (ஏ.ஐ.) மற்றும் எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 0.9% (ஏ.ஐ.) ஆகியவை அடங்கிய கரையும் அடர்வு ஆகும். இது முட்டைகோஸில் வைரமுதுகு அந்துப் பூச்சி (டிபிஎம்) மற்றும் புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி, மிளகாயில் பச்சைக்காய்ப்புழு மற்றும் புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி, துவரை பயிரில் பருப்பு பச்சைக்காய்ப்புழு, நெல்லில் தண்டு துளைப்பான், கத்தரிக்காய் பயிரில் குருத்து மற்றும் காய் துளைப்பான் மற்றும் கொண்டைக்கடலையில் பச்சைக்காய்ப்புழு போன்ற பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தபடுகிறது.
பரிந்துரைகள்:

பயிர்	பூச்சி		அளவு/ஹெக்			கடைசித் தெளிப்பில் இருந்து அறுவடைக்கு இடையில் காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
	பொதுவானப் பெயர்	விஞ்ஞானப் பெயர்	தீ.மூ. (கிராம்)	மருந்து (மிலி)	கரைப்பு நீர் லிட்டர்	
முட்டை-கோஸ்	வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி புகையிலைப்புழு	ப்ளுடெல்லா ஸைலோஸ்டெல்லா, ஸ்போடோப்டெரா லிட்டுரா	45.94 + 7.87	875	500	3
மிள-காய்	பச்சைக்காய்ப்புழு புகையிலைப்புழு	ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா, ஸ்போடோப்டெரா லிட்டுரா	45.94 + 7.87	875	500	3
துவரை	பச்சைக்காய்ப்புழு	ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா,	45.94 + 7.87	875	500	25
நெல்	குருத்துப்பூச்சி	ஸ்கிர்போபாகா இன்செர்டுலாஸ்	78.75 + 13.50	1500	500	32
கத்தரிக் காய்	குருத்து மற்றும் காய் துளைப்பான்	லியூசினோடுகள் ஓர்பேசனாலிஸ்	78.75 + 13.50	1500	500	5
கொண்டைக் கடலை	பச்சைக்காய்ப்புழு	ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா	45.94+ 7.88	875	500	11

பயன்படுத்த வழிமுறைகள்: நோவலுரோன் 5.25% + எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 0.9% டபிள்யு/டபிள்யு எஸ்சி பூச்சிக்கொல்லியை தேவையான அளவு எடுத்து அதனுடன் சிறிது தண்ணீர் சேருங்கள். ஒரு குச்சி அல்லது கம்பியை பயன்படுத்தி நன்கு கலக்கி, பின்பு மீதி தண்ணீரைச் சேருங்கள். இறுதி தெளிப்பு கரைசலாக உருவாக்க நன்கு கலக்குங்கள்.
தெளிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்: வெற்றிட கூம்பு முனை பொருத்தப்பட்டுள்ள நாப்சாக் தெளிப்பான்.
பயன்படுத்துவதற்கான நேரம்: பொருளாதாரரீதியாக நஷ்ட வரம்பு (இடிஎல்) ஏற்படுத்தும் விதத்தில் பூச்சிகள் எண்ணிக்கை பெருகும்போது, தெளிக்கப்பட வேண்டும்.
அடைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைப் பயன்படுத்துதல்: செய்யக் கூடாது.
தெளிப்பு முறை: இலைகள் மீது தெளிப்பு
தெளிப்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை உட்பட்ட தெளிப்பு: பூச்சிகள் தாக்குதலைப் பொறுத்து 10 நாட்கள் இடைவெளியில் 3 முறைகள் தெளிக்க வேண்டும்.
பயிர்கள் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டங்கள்: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.
நன்மை பயக்கும் பூச்சிகளுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க முன்னெச்சரிக்கைகள்: தேனீக்கள், மீன்கள், கால்நடைகள், காட்டு பறவைகள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்குத் தீங்கு ஏற்படலாம் என்று கருதும் கட்டங்களில் இந்த மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.
கலப்பதற்கான குறிப்பு: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு பூச்சிக் கொல்லி மருந்தை ஒரு யூனிட் பகுதிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவு சேர்த்து நன்கு கலக்குங்கள்.
பயன்படுத்துவதற்கான நேரம்: செழித்து வளரும் நிலை மற்றும் பொருளாதாரரீதியாக நஷ்ட வரம்பு (இடிஎல்) ஏற்படுத்தும் விதத்தில் பூச்சிகள் எண்ணிக்கை பெருகும்போது, தெளிக்கப்பட வேண்டும்.
நாசில் வகை: கூம்பு வடிவ நாசில்
மருந்தளவு: மேலேயுள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.
அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி: மேலேயுள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.
மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: 24 மணி நேரம்
வானிலை நிலைமைகள்: அதிக காற்று வீசும் போது தெளிக்காதீர்கள்.
நிலம் மற்றும் நீர்: இளக்க மண் மற்றும் கடின மண். தெளிப்பு கரைசலுக்கு சுத்தமான நீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
பயிருக்கு நச்சுத்தன்மை: பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தும்போது தயாரிப்பு பயிருக்கு நச்சுத்தன்மை ஏற்படுத்தாது.
விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: உட்சுவாசித்தால் இருமல், மூச்சுத் திணறல், இரசாயன நுரையீரல் அழற்சி, நுரையீரலில் வீக்கம், மூச்சுக் குழாய் அழற்சி ஏற்படலாம். உடலினுள் சென்றிருந்தால் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம். சருமத்தில் பட்டால் சருமம் சிவத்தல், எடிமா அல்லது சரும அழற்சி ஏற்படலாம். கண்ணில் பட்டால் கண் சிவத்தல் அல்லது கண்ணீர் வடிதல் போன்றவை ஏற்படலாம். விஷப் பாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் ஆக கண்மணிகள் விரிதல், தசைகள் ஒத்துழைப்பின்மை, மற்றும் கை, கால்களில் தசைகள் இணக்கமின்மை, தசை நடுக்கம் ஆகியவை ஏற்படலாம்.
முதல் உதவி முறைகள்: 1. உட்கொள்ளப்பட்டிருப்பின்: நபர் சுய நினைவோடு விழித்திருந்தால் தண்ணீர் கொடுத்து வாய் கொப்பளிக்கச் செய்யவும் மற்றும் 1 அல்லது 2 டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்கச் சொல்லவும். மயக்க நிலையில் இருக்கும்போது. வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மருத்துவர் விருப்பம் தெரிவிக்கும் வரை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. **2. சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால்:** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை என்றால் அல்லது சுவாசிப்பதற்கு சிரமப்பட்டால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும், கூடுமானவரை வாய்வழியாக சுவாசம். ஒரு மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். 3. **சருமம் மாசு பட்டிருந்தால்:** மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். வலி, சிவந்து இருத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும். மாசுபட்ட ஆடைகள் அனைத்தும் களைந்து மறு உபயோகத்திற்கு முன்பாக சோப்பு போட்டு தண்ணீரில் நன்றாக துவைக்கப்பட வேண்டும். **4. கண்களில் பட்டிருந்தால்:** சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும். வலி, சிவந்து இருத்தல், எரிச்சல் அல்லது ஒளி அச்சம் தொடர்ந்தால் ஒரு கண் மருத்துவரின் உதவியை நாடவும்.
விஷமுறிவு மருந்து: அறிகுறிகளுக்கேற்ப, ஆதரவான சிகிச்சை அளியுங்கள்.
முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறலை உட்சுவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருந்தடிக்கும்போது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.
சேமிப்பு முறைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து குறிப்பாக உணவு பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அறைகளில் அல்லது தனி அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை பத்திரப்படுத்தும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல கட்டுமானம், உலர்வு, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன் பூச்சிக்கொல்லி ஆவியாகி சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்ததாத விதத்தில் போதிய பரப்புடனும் இருக்க வேண்டும்.
உபயோகித்த கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: 1. காலி டப்பாக்களையும், மீதி பூச்சிமருந்தையும், கழுவிய நீரையும் சுற்றுச்சூழலும், தண்ணீரும் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பயன்படுத்துவோரின் கடமையாகும். 2. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும்.
காலியான டப்பாக்கள் மறுஉபயோகம் அபாயம் என்பதால் அழித்து விடவும்.
இரசாயனச் சேர்க்கை:

நோவாலுரோன் தீ.மூ.	5.25% எ/எ
எமாமெக்டின் பென்ஜோயேட் தீ.ம/.	0.90% எ/எ
அம்மோனியம் சால்ட் ஆஃப் பாலி ரில்பெனைல் ஈதர் சல்பேட்	2.00% எ/எ
ட்ரைஸ்டசரில் பெனோல் எதிலீன் ஆக்ஸைடு	7.00% எ/எ
ப்ரொபைலின் க்ளைகோல்	10.00% எ/எ
டைமெதைல் சல்ஃபாக்ஸைடு	7.85% எ/எ
எதிலீன் ஆக்ஸைடு ப்ரொபைலின் ஆக்சைடு ப்ளாக் கோபாலிமர்	4.39% எ/எ
1,2 பென்ஜிசோதியாஜோலைன்-3-ஒன்	0.05% எ/எ
பாலிசிலோக்ஜேன்	1.00% எ/எ
ஷான்தான் கம்	0.30% எ/எ
தண்ணீர்	தேவைக்கேற்ப
மொத்தம்	100.00% எ/எ

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு இதர எந்த பயிர்கள் மீதும் தெளிக்கக் கூடாது. 2. இந்த தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் விஷத்தன்மை உடையது. எனவே நீர்நிலைகள் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இதை பயன்படுத்துவதை தவிருங்கள்.

Amish
CROP SCIENCES
Innovation starts with Amish

VIBRANZ

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% w/w SC
(Insecticide)

వైబ్రంజ్

నొవల్యురాన్ 5.25% +
ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.9% బ/బ ఎస్‌సి
(కీటకనాశని)

वैब्रंज

नोवाल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेन्जोंएट 0.9% भार/भार एस सी
(कीटनाशक)

ವೈಬ್ರೆಂಜ್

ನೊವಾಲ್ಯುರಾನ್ 5.25% +
ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.9% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

INSTRUCTIONS FOR USE



Read enclosed leaflet before use.
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े।

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udumulapadu (VIII),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist.)-518 222,
Andhra Pradesh, INDIA.

उत्पादक और विपणनकर्ता :
अमिश क्राप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड,
सर्वे नंबरः १७२, उडुमुलापाडु (ग्राम), डोन (मंडल),
नंद्याल (जिल्ला) ५१८ २२२, आन्ध्रप्रदेश, भारत

In Case of any Consumer Complaints Contact : **"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,** Email: customercare@amishcropsciences.com **Office : Agrisol House,** 8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500049, Telangana.
उपभोक्ता शिकायतो-फीडबैक के लिए कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है। **+९१ ७०७५० ६८८५५, ई-मेइल:** customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. : KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No. : CIR-222417/2022-NOVALURAN + EMAMECTIN BENZOATE (SC) (442)-160

For Agricultural Use Only
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE