

PENOXSULAM 2.67% w/w OD (Herbicide)

Penoxsulam 2.67% w/w OD is a board spectrum post emergence herbicide containing 25 g/l of the active ingredient of Penoxsulam. it provides effective control of weeds Transplanted rice as detailed in recommendation for use.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution	Waiting Period	Re-entry	
		A.I.	Formulation	between last	after each	
		(gm)	(ml)	spray to	Application	
			(ltr)	harvest (days)	(In Hours)	
Transplanted Rice)	Grasses (Echinochloa colona Echinochloa Crusgalli)	22.5-25	900-1000 ml/ha	300-500	60	-
	Sedges (Cyperus Difformis)	22.5-25	900-1000 ml/ha	300-500	60	-
	Broad leaved Weeds (Caesulia Axillaris)	22.5-25	900-1000 ml/ha	300-500	60	-

Direction of Use : Methods of Application: a) Method of Application: Apply Penoxsulam 2.67% w/w OD as post emergence @ 22.5-25 g ai/ha at 15-20 days after transplanting. Use 300 -500L of water per ha. b) Plant Protection Equipments: Knapsack sprayer fitted with flood jet/flat fan nozzle is recommended. Toxicity of Penoxsulam active ingredient: Acute oral LD50 (Rat)> 5000mg/kg Acute Dermal LD50 (Rat)> 5000mg/kg. NOT TO BE USED ON THE CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET “Product not to be applied in the newly leveled ground soil having pH> 7.8 or high salt content as it may cause rice injury with a pre-flood condition”

Time of Application -

Precaution : Avoid contact with skin, eyes and mouth. wear protection clothing like apron, gloves, face shield and boots. wash the effected areas before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water. Keep out of reach of children. Do not swallow . Avoid breathing vapor or mist.

Symptoms Of Poisoning : Slightly eye irritant, may cause nausea vomiting and headache .

First Aid : If skin contaminated, take of contaminated clothing and rinse skin with plenty of water. If eyes are contaminated , hold eyes open and rinse slowly with water for 15-20 minutes. If inhaled, move person to fresh air. Call a physician. If ingested, call a physician. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told by the physician. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific antidote available. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : Do not wash into sewers or into any body of water. The empty containers should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : The package containing formulated grade herbicides, should be stored in original container in a separate room or almiraH under lock and key away from the reach of children, food stuff, animal feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premise for storage should we well built, will lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:

Penoxsulam a.i.	2.67 % w/w
Polidimethylloxane	0.03 % w/w
Propylene glycol	0.2 % w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.00002 % w/w
Sodium alkylphenathlenesulfonate,	
Formaldehyde condensate	0.2 % w/w
Tensiofix N9811HfC (alkyl aryl sulfonatepolymer blend)	12 % w/w
Tensiofix N9824HF (alkyl aryl sulfonate polymer blend)	4 % w/w
Citric acid	0.01 % w/w
Silica dimethyl silylate	3.3 % w/w
Avicel CL 611 (mixture of microcrystalline and Stadium carboxymethyl celluloses)	0.03 % w/w
Xanthan gum	0.0001 % w/w
Block polymer of methyloxirane	0.05 % w/w
Water	2.2 % w/w
Methyl soyate	Q.S. %
Total	100.000% w/w

Caution:“Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet”.

पेनॉक्ससुलम 2.67% भार/भार OD (खरपतवारनासक)

पेनॉक्ससुलम २.६७% भार/भार OD एक बोर्ड स्पेक्ट्रम है जो उमरने के बाद का शाकनाशी है जिसमें पेनॉक्ससुलम के सक्रिय संघटक के २५ ग्राम/लीटर होते हैं। यह खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है उपयोग के लिए सिफारिश में दिए गए विवरण के अनुसार सेमित चावल।

उर्ध्वरा:	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा	अंतिम	पुनः प्रवेश	
फसल	कीट का नाम	क्रियकाल तथा	की अवधि फसल काटने के प्रत्येक	विवरण के बाद	(घंटे)
प्रत्यारोपित चावल)	घास (इपिचोक्लोआ कोलोना सॉल क्रूसगली) रेज (साइरस डिफोर्मिस) चौकी पत्ती खरबूजे (कैसुलिया अक्सिलरिस)	२२.५-२५ १००-१००० मिली/हेक्टेयर	३००-१००० ३००-१०० १०	३००-१०० १०	-
स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	२२.५-२५ १००-१००० मिली/हे	३००-१००० ३००-१०० १०	३००-१०० १०	-
२२.५-२५	१००-१०००	३००-१०००	३००-१०० १०	३००-१०० १०	-

उपयोग की दिशा: आवेदन के तरीके: ए) आवेदन की विधि: पेनॉक्ससुलम २.६७% % भार/भार जऊको उमरने के बाद २२.५-२५ स रळ/हर की दर से रोपाई के १५-२0 दिनों बाद लगाएं। प्रति हेक्टेयर ३00-५00 लीटर पानी का प्रयोग करें। खा) या उच्च नमक सामग्री वाली नई समतल मिट्टी में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व-बाढ़ की स्थिति के साथ चावल की चोट हो सकती है।

पेनॉक्ससुलम सक्रिय संघटक की विषाक्तता:

लीवर मीलिक ड्रअ० (बुहा) ५000एस/ब्रस एक्यूट त्वचीय ड्रअ० (बुहा) ५000एस/ब्रस

इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए " उत्पाद को पीछे ७.८ या उच्च नमक सामग्री वाली नई समतल मिट्टी में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व-बाढ़ की स्थिति के साथ चावल की चोट हो सकती है"

आवेदन का समय -

सावधानियां : त्वचा, आंख और मुंह के अनुबंध से बचें। एएन, दस्ताने, फेस शील्ड और जूते जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। खाने, पीने या धूम्रपान करने से पहले प्रभावित क्षेत्रों को धो लें। पर्यावरण और पानी के दूषित होने से बचें। बच्चों के पहुंच से दूर रखें। निगलना मत। वाष्प या धुंध में सांस लेने से बचें।

जहर के लक्षण: आंखों में हल्का सा जलन, जी मिचलाना, उल्टी और सिरदर्द हो सकता है।

प्राथमिक उपचार: यदि त्वचा दूषित है, तो दूषित कपड़े लें और त्वचा को खूब पानी से धोएं। यदि आंखें दूषित हैं, तो आंखें खुली रखें और १५-२0 मिनट के लिए पानी से धीरे-धीरे कुछा करें। यदि सांस ली जाती है, तो व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएं। एक चिकित्सक को बुलाओ। अगर निगल लिया, एक चिकित्सक को बुलाओ। निगलने में सक्षम होने पर व्यक्ति को एक गिलास पानी की चुस्की लें। जब तक चिकित्सक द्वारा न बताया जाए तब तक उल्टी को प्रेरित न करें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछभी कभी नहीं दें। फाइटोटोक्सिसिटी:

मारक: कोई विशिष्ट मारक उत्पाद नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें।

प्रयुक्त कंटेनर का निपटारा: सोवर या पानी के किसी भी शरीर में न छोएं। खाली कंटेनरों का पुन: उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए और सुरक्षित तरीके से दफनाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोक जा सके। भंडारण की स्थिति: तैयार ग्रेड जडी-बूटियों वाले पैकेज को मूल कंटेनर में एक अलग कमरे या अलमारी में बच्चों, खाद्य सामग्री, पशु चारा और अन्य वस्तुओं की पहुंच से दूर ताला और चाबी के नीचे रखा जाना चाहिए और ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। भंडारण के लिए आधार अच्छे तरह से बनाया जाना चाहिए, जलाया जाएगा, आयाम में पर्याप्त और अच्छे तरह हवादार होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

पेनॉक्ससुलम ए आई	२.६७% भार/भार
पोलीडिमिथिलोक्सेन	0.0३% भार/भार
प्रोपलीन ग्लाइकोल	0.२% भार/भार
१,२-बेंजिसोथियाजोलिन-३-एक	0.0000२% भार/भार
सोडियम एफ्कोल्पाथेनेनेयुसुफोनेट,	
फॉर्मलहाइड्रज घनीभूत	0.२% भार/भार
ड्वाफोथेथल ड्र ८११ कम्प (एल्काइल एरिल सल्फोनेट पॉलिमर मिश्रण)	१२% भार/भार
ड्वाफोथेथल ड्र ८१४कम् (एल्काइल एरिल सल्फोनेट पॉलिमर मिश्रण)	४% भार/भार
साइट्रिक एसिड	0.०१% भार/भार
सिलिका डाइमिथाइल सिलीएट	३.३% भार/भार
एक्विले सील ६११ (माइक्रोक्रिटलइन का मिश्रण)	
और स्टेडियम कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज)	0.०३% भार/भार
जिक गम	0.000१% भार/भार
मिथाइलॉक्सिरेन	0.0४% भार/भार
का बटुलक ब्लॉक करें पानी	२.२% भार/भार
मिथाइल सोयाट	क्यू एस. %
कुल	१00.00% भार/भार

सावधानी: इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

పెనాక్సులం 2.67% భా/భా ఓడి (కలుపునాశని)

పెనాక్సులం 2.67% భా/భా ఓడి అనేది బోర్డ్ స్పెక్ట్రమ్ పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశని. ఇది పెనాక్సులం యొక్క క్రియాశీల పదార్థం యొక్క 25 గ్రా/లి.సి కలిగి ఉంటుంది. ఇది కలుపు మొక్కల సమర్థవంతమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది మార్పిడి చేసిన బియ్యం ఉపయోగం కోసం సిఫార్సులో వివరించబడింది.

సిఫార్సు:

పంట	కలుపుల సాధారణ	స.మ.	సూత్రికరణ	నీరు	విరామం	పంటకల మధ్య	మరల ప్రకారం గంటలు
మార్పిడి చేసిన బియ్యం)	గడ్డి (పెద్దవోనా కోల్ నా ఎపిరోస్ నా క్రస్టి) ఘనకలుపులు (నైవరన్ డిఫార్మస్)	22.5-25 900-1000	మి.లి/హె	లిటరు	రోజులు	60	-
	పెద్దమార్క కలుపుమొక్కలు (కేమరియా అక్సీలారిస్)	22.5-25 900-1000	మి.లి/హె	300-500	60	-	

ఉపయోగ సూచనలు:

ఉపయోగించు పద్ధతులు: ఎ) దరభాస్ విధానం: నాశన 15-20 రోజులలో పెనాక్సులం 2.67% భా/భా ఓడి ని పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ @ 22.5-25 గ్రా స.మ/హె. హక్యారుకు 300-500లిటర్ల నీటిని నాడండి. బి) మొక్కల రక్షణ పరికరాలు: ప్లడ్ జెట్/ప్లడ్ ఫ్లైస్ నాజల్తో అమర్చిన నావీజెట్ స్ప్రేయర్ ని సాఫ్టు చేయబడింది. పెనాక్సులం క్రియాశీల పదార్థం యొక్క విషపూరితం: తీవ్రమైన నోటి ఎర్రడి

50 (ఎలకు) > 5000 మిల్గ్రా/కిగ్రా. అశుభ్రత డెగ్రీలో ఎర్రడి 50 (ఎలకు) > 5000మిల్గ్రా/కిగ్రా. ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు పేహాచి 7.8 లేదా అధిక ఉష్ణు కలిగిన కొత్తగా సముం చేసిన నేల మట్టిలో ఉత్పత్తి చేయారూ ఎందుకంటే ఇది వరకకు ముందు పరిస్థితులో పరి గాయానికి కారణం కావచ్చు.

ఉపయోగించు సమయం -

ముందు జాగ్రత్త: చర్మం, కళ్ళు మరియు నోటితో ఉప్పుందాన్ని నివారించండి. అప్రెస్, గ్లెస్స్, ఫేస్ షీల్డ్ మరియు బాఫ్లు పంట రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. తినడానికి, త్రాగడానికి లేదా ధూమపానం చేయడానికి ముందు ప్రభావిత ప్రాంతాలను కడగాలి. పర్యావరణం మరియు నీటి కలుషితాన్ని నివారించండి. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి. మింగడం లేదు . అవిరి లేదా పొగమంచు శ్వాసను నివారించండి.

విషలక్షణాలు: కంటికి కొద్దిగా చివాకు కలిగించేవి, వికారం వాంతులు మరియు తలనొప్పికి కారణం కావచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: చర్మం కలుషితమైతే, కలుషితమైన దుస్తులను తీసుకోండి మరియు పుచ్చులంగా నీటితో చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి. కళ్ళు కలుషితమైతే, కళ్ళు తెరిచి ఉండి, 15-20 నిమిషాల పాటు నీటితో నెమ్మదిగా శుభ్రం చేసుకోండి. పీల్చినట్లయితే, ప్యూజిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తరలించండి. వైద్యుడిని పిలవండి. తీసుకున్నట్లయితే, వైద్యుడిని పిలవండి. మింగరిగితే ఒక ప్యూజి ఒక గ్లాసు నీటిని నీచి చేయండి. వైద్యుడు చేతితో తన్ను వాంతులను ప్రేరిపించవద్దు. అపస్మాగ్ క స్థితిలో ఉన్న ప్యూజి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వండి.

విషతత్వం :

విషగుణం: నిష్పత్తి విషగుణం అందుబాటులో లేదు. రోగకర్ణణంగా చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించింద కంట్రిన్‌ర్స్ పారవేయడం : ముదుగు కాలువల్లోకి లేదా ఏలై నా నీటిలోకి కడగవద్దు. భాి కంట్రిన్‌ర్స్ అరిగి ఉపయోగించకూడదు మరియు పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని దూరంచదానికి సురక్షితమైన పద్ధతిలో వ్యర్థంను చేసి పాతవి పెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: సూత్రికరించబడిన గ్లెడ్ హెర్బిసైడ్లను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని అసలు కంట్రిన్‌ర్లో ప్రత్యేక గదిలో లేదా అక్రియాటి పిల్లలు, అచార పదార్థాలు, పశుగ్రాసం మరియు ఇతర పుష్పలతుల దూరంగా ఉంచే మరియు కీ కలిగిన వైద్యుల చేయాలి మరియు పల్లని మరియు పాడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి. నిల్వ కోసం అవరణను ముసం బాగా నిర్మించి, వెలిగించి, తగినంత పరిమాణంలో మరియు బాగా వెలుతురు పచ్చిలా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

పెనాక్సులం స.మ.	2.67% భా/భా
పోలిడి మెథిలల్ క్సైన్	0.03% భా/భా
ప్రోపిల్ గ్లైకల్	0.2% భా/భా
1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-పన్	0.00002% భా/భా
సోడియం అల్ట్రాఫ్టలేయిజెసోనేట్,	
పేహాచి హెడ్ కంపెనీస్	0.2% భా/భా
పెన్యూమెక్స్ N9811HfC (అల్ట్రా అరిల్ నోల్వోనేపొలిమర్ మిశ్రమం)	12% భా/భా
పెన్యూమెక్స్ N9824HF (అల్ట్రా అరిల్ నోల్వోనే పొలిమర్ మిశ్రమం)	4% భా/భా
సిక్రెట్ యాసిడ్	0.01% భా/భా
నిరొహ్ డైమెత్రిల్ రిస్పెక్ట్	3.3% భా/భా
అవిసల్ సిఎల్611 (మైక్రోక్స్టలైన్ మిశ్రమం మరియు స్పైడెండుం కార్బాక్సీమిట్రిల్ సెల్యులోసెస్)	
జంతన్ గమ్	0.03% భా/భా
మిట్రిల్ కోన్ యొక్క ట్లాక్ పొలిమర్	0.05% భా/భా
నీరు	2.2% భా/భా
మిట్రిల్ సోయేట్	క్యూయస్%
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక: “ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు”.

Amish CROPS SCIENCES

AGRIPENO

PENOXSULAM 2.67% w/w OD (Herbicide)

अग्रिपेनो

पेनॉक्ससुलम २.६७% भार/भार OD (खरपतवारनासक)

అగ్రిపెన్

పెనాక్సులం 2.67% భా/భా ఓడి (కలుపునాశని)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet”.

INSTRUCTIONS FOR USE



Manufactured & Marketed by:
AMISH CROPS SCIENCES PVT. LTD.
 Sy.No.171&172, Udumulapadu (Village),(Town),
 Dhone (Mandal), Nandyal Dt. AP., INDIA.
उपदक और विपणनकर्ता:

अमीश क्राॅप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
 सर्वे.नंबर १७१ और १७२, उडुमुलापाडु (गांव),(नगर),
 धोने (मंडल), कुरनूल जिला। एपी, भारत।

In case of any Consumer Complaints Contact : Manage-Customer Care " Cell No. : +91 70750 68855. Email: Customercare@gamishcropsosciences.com. Office: Agrisol House, 8-518/21, Allwyn Cross Roads,Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana. ఉపయోగ వివరాలు-నియోజక కే నిం: కలనర కెయర్ మేనర్ ఇరొలొను పొ యా యొన పర్ ఇలనబా ిె। +91 70750 68855. క్-నెంబ: Customercare@gamishcropsosciences.com
--

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE
Mfg. Lic.No.:KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.:CIR-340298/2024-PENOXSULAM (OD)(455)-211
For Agriculture use only. కేవల కృషి ఉపయోగ కే నిం.



