RANDO 10
Fenpropathrin 10% E.C.
(Insecticide)

It is a new, contact pyrethroid insecticide, based on the active ingredient, Fenpropathrin. It is highly effective against cotton bollworms.

***Caution :** Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. It is toxic to honeybees, spray application should be avoided during foraging period of bees.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (In Hours)
		A.I.	Formulation			
Cotton	Pink Boll Worm, American Boll Worm, Spotted Boll Worm	75-100	750-1000	750-1000	14	

Direction of Use :

PREPARATION OF SPRAY MIXTURE :- Take the required quantity of Fenpropathrin 10% EC , dilute with a small volume of water and stir well using a rod or a stick to form a uniform suspension. then, add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring.

PLANT PROTECTION EQUIPMENTS:- use a high volume compression sprayer such as Rocker, Gator or Knapsack sprayer for normal spraying. Avoid spraying with a mist blower or other LV sprayers. Ensure proper coverage of the foliage upon spraying.

P.P. EQUIPMENT: Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEEHTP power sprayer.

Time of Application : -

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. It should not be used in the areas where pisciculture/aquaculture is practiced.

Symptoms of Poisoning: Nervousness, anxiety, tremour, convulsions, allergic manifestations may occur.

First Aid : 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid orally. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : It is not phytotoxic when used as per the directions

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of Used Container : 1 It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or promises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilation and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour

Chemical Composition:

Fenpropathrin tech. (based on 90% w/w A.I.)	11.20 % w/w
xylene	78.80 % w/w
Emulsifier : blend of dodecyl benzene sulfonic acid Ca-Salt and styrinated phenol ethylene oxide condensate	10.00 % w/w
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

रान्डो १०
फेनप्रोपेथ्रिन १० प्रतिशत ई सी
(कीटनाशक)

फेनप्रोपेथ्रिन १०% ई.सी. एक नया, संपर्क द्वारा असर करने वाला पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो फेनप्रोपाथ्रिन टेक्निकल से बनाया गया है। यह कपास के डोडे की सुंडी की रोकथाम के लिये अत्यधिक असरदार है।

सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मधुमखियों के लिए जहरीला है, इसलिए जब मधुमखियाँ सकीय हो उस समय इसका छिड़काव न करें।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व	संरचना			
कपास	डोडे का गुलाबी सुण्डी, डोडे के अमेरिकन सुण्डी डोडे का चितीदार सुण्डी	७५-१००	७५०-१०००	७५०-१०००	१४	-

उपयोग के लिए निर्देश: पानी की मात्रा फसल की अवस्था और छिड़काव के अनुसार कम या अधिक करें।

छिड़काव घोल की तैयारी: फेनप्रोपेथ्रिन १०प्रतिशत ई.सी. की आवश्यक मात्रा को थोडी सी पानी की मात्रा में मिलाकर अच्छी प्रकार से छडी या छड से मिलाये उसके बाद पानी की रोष बची हुई मात्रा मिलाकर निर्धारित आयतन बनाए और अच्छी प्रकार मिलाए जिससे एक समान घोल बन जाए।

फसल सुरक्ष यंत्र: किसी अधिक आयतन वाले स्प्रेयर जैसे गटांर नैपसेक या राकर का प्रयोग अधिकांश तौर पर छिडकाव के लिए होला है। मिस्ट ब्लोअर या अन्य कम आयतन वाले स्प्रयर का प्रयोग न करें। अच्छी प्रकार से छिड़काव करें जिससे फसल पर कीटनाशक पूर्ण रुप से पहुँचे इसका ध्यान रखें। छिड़काव यंत्र नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस पी ई ई - एच टी पी पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोग का समय:

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडाकाव के बाद दूषित कपडो और शारीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में मछली की पैदावार (पिसीकल्चर/एक्वकल्चर) की जाती है, इसका प्रयोग न करें।

विष के लक्षण: घबराहट, कपकपी, चिन्ता, झटके (मिरगी) तथा एलर्जी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. याद निगल जाये तो उल्टी न करायें या मुँह द्वारा कोई द्रव न दें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन /साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो दो रोगी को शुद्व हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पेधविशाक्त नहीं है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट औषधोपचार नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिये जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. कीटनाशक निर्माताओ या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये जिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न ह।

संग्रहण की शर्तें: १. किटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे दाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। २. जिस कमरे या आलमारी में कीटनाशक का भणडारणर करना हो वग अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रजूषण होने का डर हो।

रासयनिक संरचना:

फेनप्रोपाथ्रिन टेक्निकल (भारानुसार १० प्रतिशत स.त. पर आधारित	११.२०% भार/भार
जाइलीन	७८.८०% भार/भार
इमल्सीफायर: स्टायरीनेटेड फिनोल इथीलीन आक्साइड कन्डेसेट एवं डोडेसाइल बैजीन सल्फोनिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट	१०.००% भार/भार
योग	१००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

రాండో 10
ఫెన్‌ప్రొపథ్రిన్ 10% ఇ సి
(కీటకనాశిని)

ఇది ఫెన్‌ప్రొపథ్రిన్ అనే క్రియాశీల పదార్థం ఆధారంగా ఒక క్రొత్త, స్పర్శచర్యగల పైరెథ్రాయిడ్ కీటకనాశిని. ప్రత్తి పంటను ఆశించు కాయతొలుచు పురుగులను సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది.

హెచ్చరిక: జలచరాలకు విషకారి. కాబట్టి నీటివనరులు, జలచరాల సేద్యం సమీపంలో ఉపయోగించరాదు. ఇది తేనెటీగలకు విషకారి. తేనెటీగలు ఆహారం కోసం తిరిగే వేళలో పిచికారీ చేయరాదు.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. సూత్రీకరణ	నీటి పరిమాణం	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారి తదుపరి (గంటలు)
ప్రతి	గులాబి రంగు కాయతొల్చుపురుగు అమెరికన్ కాయతొల్చు నల్లమచ్చల కాయతొల్చుపురుగు	75-100	750-1000	750-1000	14

ఉపయోగించుటకు సూచనలు :

పిచికారీ ద్రావణం తయారీ :- ద్రావణం తయారీకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఫెన్‌ప్రొపథ్రిన్ 10% ఇ సి, ఒక చిన్న పరిమాణంలో నీటితో కరిగించి, ఒక రాడ్ లేదా కర్రను ఉపయోగించి ఏకరీతి సస్పెన్షన్‌ను రూపొందించడానికి బాగా కదిలించండి. తరువాత, అవసరమైన పిచికారీ వాల్యూమ్ ప్రకారం మిగిలిన నీటిని జోడించండి మరియు కదిలించడం ద్వారా మళ్లీ బాగా కలపండి.

సస్య రక్షణ పరికరాలు:- సాధారణ స్ప్రేయింగ్ కోసం రాకర్, గేటర్ లేదా నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ వంటి అధిక వాల్యూమ్ కంప్రెషన్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించండి. మిస్ట్ బ్లోవర్ లేదా ఇతర స్ప్రేయర్‌లతో పిచికారీ చేయకూడదు. పిచికారీ చేయునపుడు ఆకులు పూర్తిగా తడిచేలా చూసుకోవాలి.

సస్యరక్షణ యంత్రపరికరాలు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు హెచ్‌టిపి- పవర్ స్ప్రేయర్.

పిచికారీ సమయం : -

ముందుజాగ్రత్త : 1. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా భద్రపరచండి. 2.నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. మందు బిందువులను పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయాలి. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5. పిచికారీ చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి. 7. జలచరాల సేద్యం ప్రాంతాల్లో దీనిని ఉపయోగించకూడదు.

విషలక్షణాలు: నాడీ, ఆందోళన, వణుకు, మూర్ఛలు, అలెర్జీ వ్యక్తీకరణ వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినచో, వాంతిని ప్రేరేపించరాదు లేదా నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతనచో, కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైనచో, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను ధారగా కడగాలి. 4. పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి.

విషతుల్యత : సిఫారసు మేరకు ఉపయోగించినచో విషకారి కాదు.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. అలెర్జీలను నియంత్రించడానికి యాంటిహిస్టామైన్లు ఇవ్వవచ్చు.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల నిపర్జన : 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలను, యంత్రాలు కడిగిన ద్రవమును తయారీదారుల ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల వాతావరణం మరియు నీటిని కలుషితం కానీ రీతిలో సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. మెటీరియల్‌ని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని గదులకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా అల్మారాలలో భద్రపరచాలి లేదా ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే పదార్థ పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ప్రత్యేక అల్మిరాలలో ఉంచాలి. 2. కీటకనాశిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు, గాలి మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి తగినంత పరిమాణంలో నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

ఫెన్‌ప్రొపథ్రిన్ టెక్. (90% స్వచ్ఛత స.ప.)	11.20% భా/భా
జైలిన్	78.80 % భా/భా
ఎమల్సిఫయర్ ఆధారంగా డోడెసిల్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ కాల్షియంఉప్పు మరియు స్టైరినేటెడ్ ఫినాల్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్	10.00% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

జాగ్రత్త : ఈ లేబల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపై కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

Amish CROP SCIENCES

RANDO 10
Fenpropathrin 10% E.C.
(Insecticide)
రాండో 10
ఫెన్‌ప్రొపథ్రిన్ 10% ఇ సి
(కీటకనాశిని)
रान्डो १०
फेनप्रोपेथ्रिन १० प्रतिशत ई सी
(कीटनाशक)
ರಾಂಡೋ 10
ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ 10% ಇ ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ವಿಷ
ವಿಷ ನಿಷ
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg.No.: CIR-210578/2022-Fenpropathrin (EC) (440)-129

WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product. Shake well before use.

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

रान्डो १०
फेनप्रोपेथ्रीन १०% ई सी
(किटनाशक)

याचा वापर कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी, ठिपकेदार बोंडअळी आणि अमेरिकन बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

सावधानता : हे जलचर जीवांसाठी विषारी आहेय त्यामुळे पाण्याचे साठे, मत्स्यसंवर्धन किंवा मत्स्यशेती क्षेत्रांच्या परिसरात याचा वापर करू नये. हे मधमाशांसाठीही विषारी आहेय त्यामुळे मधमाशांच्या चारा शोधण्याच्या (वितंहपदह) कालावधीत याची फवारणी करणे टाळावे.

शिफारस:

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	स.त. (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टर द्रावण (ग्रॅम)	विद्रावणाचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
कापूस	गुलाबी बोंडअळी, अमेरिकन बोंड अळी, ठिपकेदार बोंड अळी, पांढरी माशी	७५-१००	७५०-१०००	७५०-१०००	१४

वापरण्यासाठी निर्देश: पीकाच्या अवस्थेनुसार पाण्याचे प्रमाण वाढू किंवा कमी होऊ शकते. खोलवर फवारणी करा जेणेकरुन संपूर्ण पीक समाविष्ट होईल. नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि ऍस्पी-एवटीपी पॉवर स्प्रेयर इ. वापरा.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, अन्न पदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारणीचे धुके हुंगणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना काहीही खाऊ, पिऊ, चघळू नका आणि धूम्रपान करु नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे: अस्वस्थता, चिंता, कंप, आचके आणि ऍलर्जिक स्थिती.

प्रथमोपचार: १. पोटात गेल्यास ५ टक्के सोडीयम बायकार्बोनेटसह रेचक द्यावे. २. प्रदूषित त्वचा आणि कपडे धुवा आणि सामान्य सलाईनने डोळे स्वच्छ करा.

पिकांसाठी विषकारकता: शिफारस केल्यानुसार वापरल्यानंतर पिकांसाठी विषकारक नाही.

प्रतिउपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. आधाराने आणि लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन्स आणि कंटेनर्स धुवणाचं पाणी अशा पद्धतीने नष्ट करणे हे निर्माते, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटरची जबाबदारी आहे जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचं प्रदूषण होणार नाही. २.वापरलेली पाकिटे उघड्यावर ठेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. ३. पाकिटे वस्ती आणि पाण्याच्या स्रोतापासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवण स्थिती: १. हे बुरशीनाशक असलेले पाकिटे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर अन्य खोल्या किंवा इमारतींमध्ये साठवावे किंवा बुरशीनाशकाच्या प्रमाणानुसार कुलूपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. २. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमय आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

फेनोप्रोपेथ्रीन टेक्निकल (१० टक्के शुद्धतेवर आधारित)	११.२०% व/व
झायलीन	७८.८० % व/व
इमल्सीफायर: (डोडेसिल सल्फोनिक ऍसिड सीए-सॉल्ट आणि स्टायरिनेटेड फेनॉल इथिलीन ऑक्साईड कन्डेन्सेट यांचे मिश्रण)	१०.००% व/व
एकूण	१००% व/व

सावधानी: इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ರಾಂಡೋ 10
ಫೆನ್ಪ್ರೋಪಾಥ್ರಿನ್ 10% ಇ ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇದು ಫೆನ್ಪ್ರೋಪಾಥ್ರಿನ್ ಎಂಬ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೊ,, ಸಂಪರ್ಕ ಪೈರೆಥ್ರಿಯೋಡ್ ಕೀಟನಾಶಕ-ಅಕಾರಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಗ್ರಾಂ)	ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ)	ಬೆರೆಸುದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೋಯಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಪಿಂಕ್‌ಬೋಲ್‌ವರ್ಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್‌ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ	75-100	25-340	750-1000	14

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೆಳೆ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮತ್ತು ಎಎಸ್‌ಪಿಇ-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಾಶ್ ಕಾರಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 3. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಆಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. 6. ಪಿಸ್ಕಲ್ಲರ್/ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ವಿಷದಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ, ಆತಂಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳವು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಶಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುವಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಶಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ/ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಆಪರೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು : 1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಕೊಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಲೀಖಿನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲ್ಲಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನೆ, ಗಾಳಿಯಾಡಬಲ್ಲವು, ಚಿನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿ (90% ಶುದ್ಧತ ಆಧರಿಸಿ)	11,20%ತೂಕ/ತೂಕ
ದ್ರಾವಕ (ಕ್ಸಿಲೀನ್)	78.80%ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್: (ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಎಥಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್)	10.00%ತೂಕ/ತೂಕ
ಒಟ್ಟು	100%ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ರಣ್ಡೊ 10
ಪೆನ್ಪ್ರೊಪಾತ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ.
(ಪೂಚ್‌ಕಿಕೊಲ್ಲಿ)

ಇದು ಪೆನ್ಪ್ರೊಪಾತ್ರಿನ್ ಎಂಬ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೊ,, ಸಂಪರ್ಕ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಟನಾಶಕ-ಅಕಾರಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಗ್ರಾಂ)	ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ)	ಬೆರೆಸುದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೋಯಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಪಿಂಕ್‌ಬೋಲ್‌ವರ್ಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್‌ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ	75-100	25-340	750-1000	14

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೆಳೆ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮತ್ತು ಎಎಸ್‌ಪಿಇ-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಾಶ್ ಕಾರಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ಬರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 3. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಆಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. 6. ಪಿಸ್ಕಲ್ಲರ್/ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ವಿಷದಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ, ಆತಂಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳವು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಶಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುವಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಶಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ/ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಆಪರೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು : 1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಕೊಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಲೀಖಿನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲ್ಲಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನೆ, ಗಾಳಿಯಾಡಬಲ್ಲವು, ಚಿನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿ (90% ಶುದ್ಧತ ಆಧರಿಸಿ)	11,20%ತೂಕ/ತೂಕ
ದ್ರಾವಕ (ಕ್ಸಿಲೀನ್)	78.80%ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್: (ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಎಥಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್)	10.00%ತೂಕ/ತೂಕ
ಒಟ್ಟು	100%ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Amish
CROP SCIENCES

RANDO 10
Fenpropathrin 10% E.C.
(Insecticide)

ರಾಂಡೋ 10
ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಥ್ರಿನ್ 10% ಇ ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಿನಿ)

ರಾಂಡೋ ೧೦
ಫೆನ್ಪ್ರೋಪೇಥ್ರಿನ ೧೦ ಪ್ರತಿಶತ ಈ ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಂಡೋ 10
ಫೆನ್ಪ್ರೋಪಾಥ್ರಿನ್ 10% ಇ ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
பிள்ளைகளுக்கு தூரமாக வைக்கவும்.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ವಿಷ
ವಿಷಮು ವಿಷ
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలీను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.: CIR-210578/2022-Fenpropathrin (EC) (440)-129

WARRANTY : Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product. Shake well before use.

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/HA. A.I.	Formulation	Dilution in water	Waiting period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each application (In Hours)
பருத்தி	இளஞ்சிவப்பு காய்ப்புழு, அமெரிக்கன் காய்ப்புழு, புள்ளிகள் கொண்ட காய்ப்புழு பயன்படுத்தப்படும்	75-100 1000	750-1000	750-	14	

முறை: தெளிப்பு:-
மிக்ஸ் எடுக்கவும். தேவையான அளவு ஃபென்ப்ரோபாத்ரின் 10% EC , ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நீர்த்துப்போகவும் மற்றும் ஒரு தடி அல்லது ஒரு குச்சியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சீரான இடைநீக்கத்தை உருவாக்கவும். பின்னர், தேவையான அளவு தெளிக்கும் அளவு தண்ணீர் சேர்த்து, கிளறி மீண்டும் நன்கு கலக்கவும்.

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்:- சாதாரண தெளிப்பதற்கு ராக்கர், கேட்டர் அல்லது நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் போன்ற அதிக அளவு சுருக்கத் தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்தவும். மூடுபனி ஊதுகுழல் அல்லது பிற எல்வி தெளிப்பான்கள் மூலம் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். தெளிக்கும்போது படலத்தின் சரியான பாதுகாப்பு உறுதி. பி.பி.

உகரணங்கள்: நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ஃபூட் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் ASPEEHTP பவர் ஸ்ப்ரேயர். விண்ணப்ப நேரம்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் :

முன்னெச்சரிக்கை : 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4 . தெளித்த பிறகு அகத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. மருந்து தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், சாப்பிடுதல் மற்றும் மெல்லுதல் போன்றவற்றை செய்யாதீர்கள். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். 7. மீன் வளர்ப்பு / மீன் வளர்ப்பு நடைமுறைமில் உள்ள பகுதிகளில் இதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

விஷத்தின் அறிகுறிகள் : நரம்புத் தளர்ச்சி, பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுகள் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், வாந்தியைத் தூண்டவோ அல்லது வாய்வழியாக திரவத்தையோ கொடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அகத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால்,