Imazethapyr 10% S.L. (Herbicide)

Imazethaphyr 10% SL in an herbicide based on the active ingredient Imazethaphyr, It is recommended for use of Soybean, Groundnut, Black gram, green gram and Red gram for control of annual grasses, broad leaf weeds.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last Water spray to harvest (In days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (Litre)			
Black gram	Brachiaria eruciformis Amaranthus viridis Euphorbia hirta Commelina benghalensis	75 ga.i./ha+ MSO adjuvant @2 ml/litre of water	750 ml+MSO adjuvant @2 ml/ha of water	375	56	-
Green gram	Amaranthus viridis Trianthema Portulacastrum Euphoribia hirta	75 ga.i./ha+ MSO adjuvant @2 ml/litre of water	750 ml+MSO adjuvant @2 ml/ha of water	375	46	-
Ground-Nut	Echinochloa colonum, Euphorbia hirta Commelina Benghalensis, Digera arvensis, Amaranthus Viridis, Physalis minima	100-150 g.a.i./ha+ MSO adjuvant @2 ml/litre of water	1.0-1.5 750 ml+MSO adjuvant @ @2 ml/ha of water	375	102	-
Red Gram	Digitaria sanguinalis Dinemra relroflexa	75 ga.i./ha+ MSO adjuvant @2 ml/litre of water	750 ml+MSO adjuvant @2 ml/ha of water	375	125	-
Soya-bean	Digera arvensis, Commelina benghalensis Echinochloa colonum, Brachiaria eruciformis E. crushgalli, Euphorbia hirta Commelina benghalensis Dinebra arabica, Digitaria spp.	75-100g a.i./ha+MSO adjuvant @2 ml/litre of water	0.75-1.0L MSO adjuvant @2 ml/litre of water	375	72	-

Direction of use :

METHOD OF APPLICATION : Imazethapyr 10% SL is a broad spectrum herbicide for control of grasses, broad leaf weeds and sedges in Soybean and Groundnut, It should be applied early post emergence. Early post application is recommended when weeds are in 1-2 leaf stage or 7- 14 days after sowing.

PREPARATION OF SPRAY SOLUTION : Mix thoroughly the recommended quantity of imazethapyr 10% SL along MSO adjuivant @ 2 ml/liter of water with adequate stirring with rod or stick. Add required quantity of Water.

SPRAYING INSTRUCTIONS : 1. Ensure through land preparation. Spray uniformly without overlapping. 2. Do not spray against the wind direction. 3. Clean the sprayer thoroughly before & after use.

EQUIPMENT RECOMMENDED : Spray imazethapyr 10% SL using high volume sprayer like knapsack, foot sprayer etc. fitted with flat fan nozzle.

Time of Application : -

Precaution : 1. Avoid contact of the concentrated product with skin. 2. Wear protective clothing, gloves, face shield while spraying. 3. Do not eat, drink or smoke while working. 4. Avoid spray mist working. 5. Wash hands and exposed skin before meal & after work.

Symptoms of Poisoning : Irritation to skin and eyes may occur.

First Aid : 1. If on skin: Remove contaminated clothing wash this skin with plenty of soap and water. 2. If in eyes: Flush the eyes with plenty of water. 3. If inhaled: Take the victim to open air. 4. If swallowed, induce vomiting.

Phytotoxicity : There is no phytotoxicity observed at the recommended doses.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically. Call the physician if needed.

Disposal of Used Container : 1. Packages or surplus material and washing from machine & container should be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used empty packages should not be left outside to prevent their reuse. Packages shall be broken away from human habitation in a non crop and area where there is no underground water course.

Storage Conditions : 1. Package containing Imazethapyr 10% SL shall be stored in original containers in separate rooms away from children and domestic animal under lock & key. 2. The rooms meant for storing shall be cool, dry, well ventiated, well lit well built and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Imazethapyr Tech. (Min. 90% purity)	11.11% w/w
Ammonia Solution (10%)	2.50 % w/w
Aqueous Solution of Polydimethyl Siloxane and polyoxyethylene Stearate	0.05 % w/w
Propane 1:2 diol	10.00% w/w
Disodium hydrogen Phosphate	0.39 % w/w
Potassium Dihydrogen Phosphate	0.12 % w/w
Water	Q.S.% w/w
Total	100%

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

ఇమాజెథాపైర్ 10% ఎస్.ఎల్. (కలుపునాశిని)

ఇమాజెథాపైర్ 10%ఎస్ఎల్ అనేది కలుపునాశిని, ఇమాజెథాపైర్ అనే సక్రియ పదార్థముపై ఆధారపడి వుంది. దీన్ని సోయాచిక్కుడు, వేరుశనగ, మినుము, పెసర, కందిపంటలలో వచ్చే వార్షిక గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపు మొక్కల్ని ప్రభావవంతంగా అరికడుతుంది.

సిఫారసు

పైరు(లు)	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె.		నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీ నుండి వంటకోత మధ్య విరామం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
		సం. క్రి. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (లీటరు)			
మినుము	పొలా గడ్డి జాతి, తోటకూర, నాన పాలు, కాన	75 గ్రా స క./హె 750 మిలి ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	750 మిలి / ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ హె నీరు	375	56	
పెసర	తోటకూర, చిన్న గుర్రపు తెళ్ళ, గంగాపాయిలు చమ్మకూర, నానపాలు	75 గ్రా స క./హె 750 మిలి ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	750 మిలి / ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ హె నీరు	375	46	
వేరు-శనగ	కాన, నానపాలు, వెంపలాకు తోటకూర	75 గ్రా స క./హె 750 మిలి ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	750 మిలి / ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ హె నీరు	375	102	
కంది	చిన్నెర, పుల్లేర గడ్డి.	75 గ్రా స క./హె 750 మిలి ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	750 మిలి / ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ హె నీరు	375	125	
సోయాబీన్	వెంపలాకు, కాన, ఊడ, పొలా గడ్డి, తొంగ పరి, నాన పాలు, కాన, కనుపు గడ్డి, చిన్నెర జాతి.	75 గ్రా స క./హె 750 మిలి ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	750 మిలి / ఎం ఎస్ ఓ సహాయకం ఏ2 మిలి/ లీటర్	375	72	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఉపయోగించు పద్ధతి : ఇమాజిథాపైర్ 10% ఎస్ఎల్ సోయాబీన్ మరియు వేరుశనగ పైర్లను ఆశించు ఏకవార్షిక గడ్డిజాతి, వెడల్పాకు జాతి కలుపులు మరియు బురదలో పెరుగు కలుపు మొక్కలను విస్తృత చర్యతో అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది. దీనిని పైరు పెత్తిన 7-14 రోజులలో, కలుపుమొక్కలు 1-2 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ ఎమర్జన్సీగా ఉపయోగించవలెను.

మందు ద్రావణం తయారీ : సిఫారసు చేయబడిన ఇమాజిథాపిర్‌ను తగిన కొద్ది నీటితో కలిపి కర్ర లేదా రాడ్‌తో కలియత్రిప్పవలెను. తదుపరి మిగతా నీటిని కలిపి పిచికారీ ద్రావణం తయారు చేసుకొనవలెను.

పిచికారీకి సూచనలు : 1. ఏకరీతిగా పిచికారీకి పొలంను సిద్ధం చేయండి. 2. గాలికి ఎదురుగా పిచికారీ చేయరాదు. 3. పిచికారికి ముందు మరియు తదుపరి స్ప్రేయరును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను.

సిఫారసు చేసిన యంత్రపరికరము : ఇమాజిథాపిర్‌ను అధిక నీటి పరిమాణం గల ప్లాట్‌ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన నాప్‌సాక్, ఫుట్ స్ప్రేయరు వంటివి.

ఉపయోగించు సమయం : -

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. చర్మమునకు మందును అంటనీయరాదు. 2. మందు పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులు, చేతితొడుగులు, ముఖకవచము వంటివి ధరించండి. 3. పిచికారీ చేయునపుడు తినుట, త్రాగుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 4. పిచికారీ చేయునపుడు మందు బిందువులను శరీరంపై పడనీయరాదు. 5. భోజనమునకు ముందు మరియు పని ముగిసిన తదుపరి ప్రభావిత చేతులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనండి.

విషలక్షణాలు: చర్మము మరియు కళ్ళకు చికాకు వంటివి సంభవించును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. చర్మమునకు అంటినచో- కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుచు కొనవలెను. 2. కళ్ళలో పడినచో -పుష్కలమైన నీటితో కళ్ళను ధారగా కడగండి. 3. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలి లోనికి తరలించండి. 4. మింగినచో - రోగికి వాంతులు చేయించండి.

విషతుల్యత : సిఫారసు చేసిన మోతాదులో వంటపై ఉపయోగించిన హానికరం కాదు.

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. అవసరమైతే వైద్యుడిని పిలవండి.

వాడిన కంటైనర్ల వినర్జన : 1. ప్యాకేజిలు లేదా మిగిలిన పదార్థము మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవంను పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా వినర్జించాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. ప్యాకేజిలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా పంటలేని మరియు భూగర్భజలాలు పైనలేని ప్రాంతంలో భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ చిరతలు : పిల్లలకు మరియు పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులలో ఉంచి తాళం వేసి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వ చేయు గదులు చల్లగా, పొడిగా, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

ఇమాజెథాపైర్ టెక్నికల్ (90% కనీస స్వచ్ఛత)	11.11% భా/భా
అమ్మోనియా సొల్యూషన్ (10%)	2.50% భా/భా
అక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పాలిడైమెథిల్ సైలొక్సెన్ మరియు పాలిఆక్సి ఇథిలిన్ స్టిరేట్	0.05% భా/భా
ప్రొపేన్ 1:2 డయోల్	10.00% భా/భా
డైసోడియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్	0.39% భా/భా
పొటాషియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్	0.12% భా/భా
నీరు	క్యు.ఎస్.% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल (खरपतवारनाशक)

इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल एक असरकारक खरपतवारनाशक है। इसमें इमॉझिथापर नामक सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग सोयबीन, मूंगफली, उरद, मुंग अरहर में घासीय एवं पती वाले खरपतवारों को नाश करने के लिए किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेअर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन :प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा)	संरचना (लीटर)			
उरद	ब्राचिरिया ईरुसीफोर्मिस (चैराघास), अमरांथस विरिडिस (चौलाई), यूफोरबिया हिरटा (छोटी दुधि), कमेलिना बेंघालेंसिस (बाखना)	७५ ग्रा.ए. आई./हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	७५मि.ली. / हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	३७५	५६	-
मुंग	अमरथिस विरिडिस (चौलाई), ट्रायनथेमा प्रोच्युलकास्ट्रम (पत्थरचटटा), यूफोरबीया हिरटा (छोटी दुधि)	७५ ग्रा.ए. आई./हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	७५मि.ली. / हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	३७५	४६	-
मूगफली	पत्थरचटटा (सांठी), बोकना /कनकौआ इरेगरोस्टिस पिलोसा भूल मोधा,	१००-१५० ग्राम + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	१.०-१.५ लीटर+ + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	३७५	१०२	-
अरहर	डीजीटारिया संगुनलिस, डायनेब्रा रेट्रोफलेक्सा	७५ग्रा.ए. आई./हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	७५० म.ली. /हेक्टेयर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी			
सोयबीन	सांवा, पैरा घास छोटी दूधी, कोटोन, लहसुवा, खारयू, चिनियारी	७५-१०० ग्राम + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी	७५-१.० लीटर + एम.एस.ओ. अडजूवंट @ २ मि.ली. / लीटर पानी			

उपयोग के लिए निर्देश : प्रयोग की विधि : इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल एक चयनात्मक खरपतवारनाशक है। इसका उपयोग सोयबीन और मुगफली में खरपतवार नाश करने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार उग जाने के समय ही किया जाता है। इसका प्रयोग एक पत्तीवाली मोथे की १-२ पत्ती आने के समय किया जाता है और बोने के ७-१४ दिनों के अन्दर।

घोल बनाने की विधि : दी गई इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल की मात्रा का एक छोटी बाल्टी में पानी के साथ मिश्रण लकडी या चम्मच से हिलाते हुए बनायें और फिर पानी की मात्रा मिलायें ।

छिडकाव की सिफारिश : १. खेत को अच्छी तरह जोंते और छिडकाव समानरूप से करें। २. हवा के रूक व बहाव के साथ छिडकाव करें। ३. स्प्रे पम्प को छिडकाव से पहले व बाग में पानी से थो कर साफ करें।

यंत्र की सिफारिश : इमॉझिथापर ९० प्रतिशत एस एल के अच्छे परिणाम पाने के लिए हाई वोल्युम स्प्रे पम्प तथा फलेट फेन नोजल लगाकर नेपसेक /फुटस्प्रेयर आदि का प्रयोग करें।

प्रयोग के समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. सक्रिय तत्व को त्वचा से दूर रखें। २. छिडकाव के समय हथों में दस्ताने, मुंह पर मारक आदि पहनें। ३. काम करते समय कुछ खाना, पीना और धुम्रपान ना करें। ४. फुहारे के पानी से बचना चाहिए। ५. खाने से पहले और काम हो जाने के बाद हाथ और खुले अंग को अच्छी तरह धोयें।

विष के लक्षण : त्वचा व आंखों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. अगर त्वचा प्रभावित है तो दूषित वस्त्रों को उतारें और चमडी को खूब पानी और साबुन से धोएं । २. अगर त्वचा प्रभावित है तो आँखों को भरपूर पानी से धोऐं । ३. यदि श्वास द्धारा गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाए । ३. यदि निगल जायें पर, उल्टी करायें।

विष नाशक: कोइ खास प्रतिविष नही है। लक्षणानुसार इलाज करें अगर अवश्यकता पडे तो डाक्टर को बुलाये एवं सलाह लें।

खाली डिब्बों का निपटारा : . इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल को मूल व बन्द डिब्बों में अलग संग्रहालय में बच्चों व पालतू जानवारों से दूर बन्द ताले में रखे। २. संग्रहालय ठंडे, सूखे, रोशनीदार, मजबूत, हवादार और लम्बे चौडे होन चाहिए, ताकि इसके वाष्प से प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. खाली डिब्बों, बची हुई सामग्री, मशीन की धुलाई आदि की निकास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण पानी या वातावारण दूषित न हों। २. खाली डिब्बों, को नष्ट कर देना चाहिए और बाहर ना छोडे। खाली डिबों को नष्ट बंजर जगह पर करें या जहा भूमिगत पानी ना हो वहा गाड दें।

रासायनिक संरचना :

इमॉझिथापर टेक्नीकल (९०% स. त. पर आधारित)	११.११% भार/भार
अमोनियम घोल (१० प्रतिशत)	२.५०% भार/भार
पॉलिडाइमिथाइल सिलिकसेन एवं पॉलिआक्सी इथाइलीन	०.०५% भार/भार
स्टीयेरेट का जलीय घोल प्रोपेन १:२ डाईआल	१०.००% भार/भार
डायसोडियम हयड्रोजन फोस्फेट	०.३९% भार/भार
पोटेशियम डायहायड्रोजन फोस्फेट	०.१२% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	१०० % भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

Amish CROP SCIENCES

KILLWAY

Imazethapyr 10% S.L.

(Herbicide)

కిల్‌వే

ఇమాజెథాపైర్ 10% ఎస్.ఎల్.

(కలుపునాశిని)

किलवे

इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल

(खरपतवारनाशक)

ಕಿಲ್‌ವೇ

ಎಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

सावधान జాగ్రత్త ಎಚ್ಚರಿಕೆ CAUTION GREEN

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Reg. No.: CIR-132467/2016-Imazethapyr (SL) (354)-143

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

इमाझिथापर १०% एस.एल (तणनाशक)

इमाझिथापर १०% एस.एल एक सक्रिय तत्वावर आधारित तणनाशक असून ते १० ग्रॅम स.त./किलो आहे. ह्याची शिफारस सोयाबीन व भुईमुगातील वाषईक तण व चपट्या वानाच्या तणांच्या । नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारस :

पिके	तणाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर (ग्रॅ) क्रि.घ. (ग्रॅ%)	फॉर्म्युलेशन	फवारणी तेद्रावक पाणी (लिटर्स)	कापणी प्रतीक्षा कालावधी) (दिवसांमध्ये)
ब्लॅकग्राम	ब्रॅचियारिया इरुसिफॉर्मिस, ॲमॅरेन्थस विरिडिस, युफोर्बिया हिर्टा , कॉमेलिना बेंघालेन्सिस	75 ग्रॅम स.घ / हेक्टर 750 मिली एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	750 मिली./ एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	375	56
हिरवे हरभरे	ट्राय्नथेमा, पोर्टुलाका केरूट्रम, युफोर्बिया हिर्टा.	75 ग्रॅम स.घ / हेक्टर 750 मिली एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर / 2 मिलीहेक्टर पाणी	750 मिली./ एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर / 2 मिलीहेक्टर पाणी,	375	46
ग्राउंड नट	इचिनोक्लोआ कॉलोनम, युफोर्बिया, कॉमेलिना बेंघालेन्सिस, डिगेरा आर्वेन्सिस, अमारान्थस विरिडिस, फिजॅलिस मिनिमा	75 ग्रॅम स.घ / हेक्टर 750 मिली एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	750 मिली./ एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर / 2 मिलीलिटर /	375	102
लाल हरभरा	डिजिटारिया सॅन्गुइनालिस, डिनेमरा रेलरोपलेक्सा	75 ग्रॅम स.घ / हेक्टर 750 मिली एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	750 मिली./ एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	375	125
सोयाबीन	डिगेरा आर्वेन्सिस, कॉमेलिना बेंघालेन्सिस, इचिनोक्लोआ कॉलोनम, ब्रॅचियारी इरुसिफॉर्मिस ई. क्रुसगल्ली, युफोर्बिया हर्टा, कोमेलीना बेंगालेन्सिस डिनेब्रा अरेबिका , डिजिटारीया स्पे य.	75 ग्रॅम स.घ / हेक्टर 750 मिली एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	750 मिली./ एमएसओ सहायक / 2 मिलीलिटर /	375	72

वापरासाठी शिफारसी :

वापरण्याची पद्धत : इमाझिथापर १०% एस.एल एक बहुपयोगी तणनाशक आहे, ह्यांचा उपयोग सोयाबीन व भुईमूगातील गवत व चपट्या पानाच्या तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो, ह्याचा वापर उगणाऱ्या तणांवर केला जातो ह्याची फवरणी करण्याची शिफारस बियाणे पेरल्यावर ७-१४ दिवसांनी उगणाऱ्या तणांची १-२ पाने निघाली असताना सुरूवातीस करावी. द्रावण बनाविण्याची रीत : इमाझिथापर १०% एस.एल चे शिफारस केलेले मिश्रमाचे प्रमाण काठी किंवा रॉडनी हलवून नीट बनवा. गरज असेल तेवढे पाण्याचे प्रमाण घाला. फवारणी संबंधी सूचना : १. शेत चांगल्याप्रकारे नांगरूण घ्या व फवारणी एकसामन करा. २. वाऱ्याच्या उलट्या दिशेनी फवारणी करू नये. ३. स्प्रे मशिन फवारणी पूर्वी व फवारणीनंतर स्वच्छ साफ करा. शिफारस केलेली उपकरणी : इमाझिथापर १०% एस.एलची फवारणी करताना फ्लॅट फॅन व फ्लॅट जेट नोजल लावलेल्या जसे ॲपसॅक स्प्रेयर वा फूट स्प्रेयर सारखा उच्च दाबाचा स्प्रेयर वापरावा.

वापरदारांनी घ्यावयाची खबरदारी : १. सक्रिय तत्व त्वचेपासून दूर ठेवा. २. फवारणी करताना रबरी हातमोजे, मुखवटा असा सरक्षक पोषाख करावा. ३. फवारणी करताना खावू, पिवू अथवा धुम्रपान करू नये. ४. वापर करताना फवारणीच्या तुषरांपासून सांभाळा ५. काम झाल्यावर जेवणाआधी संपर्कात आलेली त्वचा व हात पाण्याने स्वच्छ धुवा.

रोप विषाक्तता : शिफारस केलेले प्रमाण वापरात आणल्याने कोणतेच राप विषक्तता होत नाही.

विषबाधेची लक्षण: १. जर त्वचेवर असेल, तर : संसर्ग झालेले कपडे काढून टाका, भरपूर पाणी आणि साबण वापरून त्वचा धुऊन काढा. २. जर डोळ्यात असेल तर: भरपूर पाण्याने डोळे धुऊन काढा. ३. जर श्वरासावाटे आत गेले तर : रूणाला बाहेर मोकळ्या हवेत घेऊन जा. ४. जर गिळले गेले तर: उल्ट्या काढा.

विषरोधकता – विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. आवश्यकता असल्यास डॉक्टरांना बोलवा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १. पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २. पुन: अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत. पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जेथे पीक घेतले जात नाही व जमिनीखालून पाण्याचे झर नाहीत अशा जागी जमिनीत खोल पूरांवीत.

वापरदारांनी घ्यावयाची खबरदारी : इमाझिथापर १०% एस.एल १. सक्रिय तत्व त्वचेपासून दूर ठेवा. २. फवारणी करताना रबरी हातमोजे, मुखवटा असा संरक्षक पोषाख करावा. ३. फवारणी करताना खावू, पिवू अथवा धुम्रपान करू नये. ४. वापर करताना फवारणीच्या तुषरांपासून सांभाळा. ५. काम झाल्यावर व जेवणाआधी संपर्कात आलेली त्वचा व हात पाण्याने स्वच्छ धुवा.

रासायनिक संरचना :

इमाझिथापर टेक्. (न्यूल. शुद्धता १०%)	: ११.११०% व/व
अमोनियम सोल्यूशन (१०%)	: २.५००% व/व
ॲक्स सोल्यूशन पॉलिडाइमिथाइल सिलोक्सेन आणि पॉलिऑक्सिइथाइलिन	: ०.०५०% व/व
स्टीयेरेट प्रोपेन १.२ डायल	: १०.०००% व/व
डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट	: ०.३१०% व/व
पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट	: ०.१२०% व/व
पाणी	: क्यू.एस.
एकूण	: १००.०००% व/व

साबधान : या लेबल /माहिती पत्रकारवर निर्देश केलेल्या पीकांव्यतिरिक्त अन्य पीकावर उपयोग करू नये.

ఇమేల్యోథఫిర్ 10% ఎస్.ఎల్. కళినాశక

ఇమేల్యోథఫిర్ 10% ఎస్.ఎల్. ఒండు కళినాశకవాగిద్దు. ఇమేల్యోథఫిర్-అన్ను సక్రియ ఘటకద ఆధారదవాగి పడేదిదే. ఇదు ప్రతి కేజిగే 10 గ్రా. స.ఘ. హొందిదే. ఇదన్ను సోయాబీన్ హాగూ నేలగడలే బేళిగళిగే తగలువ వార్షిక హుల్లుగళు హాగూ ఆగల ఎలేయ కళే సన్మగళన్ను నియంత్రిసలు బళసువుదక్కాగి శిఫారసు మాడలువాగిదే.

ప్రయోగిసువుదు :

బళి	కళియకళగళ సామాన్య హెసరు	ప్రతి హెక్టేరగే డోసేజ్ (గ్రామ్) ఎ.ఐ. (గ్రామ్)	ఫార్మూలేషన్	కళవిగే కేనియ నీరిన్నల్లి కరగిదువుదు (లీటరుగళు)	నోయువుద అవధి దినగళల్లి
బ్లాక్‌గ్రామ్	బ్రాచియారియా ఎరుసిఫార్మిస్, అమరంథస్ విరిడిస్, యుఫోర్బియా హిర్టా, కమెలినా బెంఘాలెన్సిస్	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక /	375	56
హిరవే హరభరే	అమరంథస్ విరిడిస్, ట్రయాంథెమా పోర్టులాకా కేర్‌ట్రమ్, యుఫోర్బియా హిర్టా.	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ / 2 మిలీహెక్టేర్ పాణి	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ / 2 మిలీహెక్టేర్ పాణి,	375	46
గ్రౌండ్ నట్	ఇచినోక్లోవా కొలొనమ్, యుఫోర్బియా, కమెలినా బెంఘాలెన్సిస్, డిగేరా ఆర్వెన్సిస్, అమరాంథస్ విరిడిస్, ఫిసాలిస్ మినిమా	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ / 2 మిలీలిటర్ /	375	102
నేలద కాయి	డిజిటేరియా సాంగ్వినాలిస్, డినేమ్రా రేలర్పెక్సా	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	375	125
కెంపు గ్రామ్	డిజిటేరియా సాంగ్వినాలిస్, యుఫోర్బియా హిర్టా, కమెలినా బెంఘాలెన్సిస్, డిగేరా ఆర్వెన్సిస్, అమరాంథస్ విరిడిస్, ఫిసాలిస్ మినిమా	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	375	125
సోయా బీన్	డిగేరా ఆర్వెన్సిస్, కమెలినా బెంఘాలెన్సిస్, ఇచినోక్లోవా కొలొనమ్, బ్రాచియారియా ఎరుసిఫార్మిస్ ఇ. క్రుస్గల్లి, యుఫోర్బియా హిర్టా, కమెలినా బెంఘాలెన్సిస్, డైనేబ్రా అరేబికా, డిజిటేరియా ఎస్పిప్.	75 గ్రా. స ఘ/ హే 750 మిలీ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	750 మిలీ./ ఎంఎసొ సహాయక / 2 మిలీలిటర్ /	375	72

బళసువ క్రమ : ఇమేల్యోథఫిర్ 10% ఎస్.ఎల్. విశాల శ్రేణియ క్రిబియ క్రియయిల్ల కళినాశకవనున సోయాబీన్ మత్తు నేలగడలే బేళిదు హుల్లు మత్తు ఆగల ఎలేయ కళిగళ నియంత్రణక్కాగి ఉపయోగిసలుత్తిదే. కళిగళు తలే ఎత్తిద ఆరంభదల్లి ఇదన్ను బళసబేకు. బిత్తనియాద 7-14 దినగళ బళిక, మేదల ప్రయోగద నంతరద ఆరంభిత ప్రయోగవన్ను కళిగళు ఒందేరుదు ఎలేగళన్ను హొందిరువవరె హంతదల్లి మాడలు శిఫారసు మాడలాగిదే. సింపరణ ద్రావణ తయారిసువ విధాన : శిఫారిత ప్రమాణద ఇమేల్యోథఫిర్ 10% ఎస్.ఎల్. ఆను ఒందు కోలు అథవా నలరాకియంద కదుత్తిద నీన్నాగి మిశ్రగళిసి. బళిక బేకాద ప్రమాణద నీరు కాకి బేరేసి.

సింపరణగే నిర్దేశనగళు : 1. జమీను చెన్నాగి సిద్ధగళిగేసల్పట్టిరువుదన్ను ఖాత్రి మాడికొళ్ళి. మేలే మేలే సింపరణేగే ఎత్తే నీడద, నమప్రకారవాగి సింపరిసి. 2. గిళి బిసువ దిక్కిగే సింపరిసబేకు. 3. అపయోగిసువ మేదలు హాగూ బళిక, స్ప్రేయరన్ను స్వచ్ఛగొళిసి.

శిఫారితగొంతే అపరాధ : ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ అథవా ఫ్లాట్ జెట్ నాజల్ ఆళవిడిసిద న్యూఫ్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్ అథవా పుట్ స్ప్రేయర్ నంతహ అధిక ప్రమాణద స్ప్రేయర్‌గళన్ను అపయోగిసబేకు.

బళసువవరిగే మున్నెచ్చరికెగళు : 1. నారయిత్తు ఉత్పన్నవు చర్మక్కే తగలదంతే ఎచ్చరికే వహిసి. 2. సింపరిసువవాగ రక్షణా ఉడుగేగళు, కైచీలు, మేగగవుగళన్ను ధరిసిరి. 3. కేలసమయదల్లాగ ఏనన్నూ తిన్న బేడి, కుడియబేడి, ధూమ్రపాన మాడబేడి. 4. సింపరణేయ నంతర, హనిగళు నిమ్మత్త బరదిరలే. 5. ఊట మాడువ మేదలు హాగూ కేలస ముగిద బళిక కైగళన్ను ఒడ్డలట్ట చర్మ భాగగళన్ను తొళెదుకొళ్ళి.

సన్న విషకారిత్వ: శిఫారిత ప్రమాణదల్లి బళసిదాగ యావుదే సన్న విషకారిత్వ కండుబందిల్ల.

విషతగలిద లక్షణగళు: కణ్ణుగళు హాగూ చర్మదల్లి అరిత-కేరేత అంతకాగబహుదు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. చర్మదమేలే ఆగిద్దరే : కలుషితగొంతె బట్టెయన్ను తరయిరి మత్తు ఆ చర్మవన్ను నాకష్టు నీరు మత్తు సాబూనినిందిగే కేళెయిరి. 2. కణ్ణుగళల్లి ఆగిద్దరే : నాకష్టు నీరన్ను కణ్ణుగళల్లి సురియిరి. 3. అసిరెదిద్దరే. ఆ వ్యక్తియన్ను మత్తు గాళిగే తేరెదిరి. 4. నుంగలాగిద్దరే వాంతి మాడలు ప్రేరేపిసి.

ప్రతివిష : యావుదే నిర్దిష్ట ప్రతివిషవిల్ల. రోగలక్షణక్కనుసారవాగి చికిత్సే నీడి. ఆగత్య విద్దరే వైద్యరిగేకరెమాడి.

కంటేనరుగళ విల్వెనే : ప్యాకేజుగళు అథవా మిళ్కళిద సామగ్రి మత్తు కంటేనర్ మత్తు కంటేనర్ తొళెద నీరు ఇవన్ను పరిసర అథవా జలప్ర దేశగళిగే అన్నదవిల్లదంతే నుర్తికవాగి వినియోగిసి. 2. ఖాలి ప్యాకేజుగళు మేరు అపయోగిగగళన్నుదంతే మాడలు ఆవన్ను హొరగే కాగితగళే బిడబహుదు. ప్యాకేజుగళన్ను ఒడేదు, జనవనతి ఇల్లద జాగదల్లి, బేనాయి మాడద భూమియల్లి, అంతర్జలద నీళ్ళదల్లి హూళబేకు.

తేలువరే : 1. ఇమేల్యోథఫిర్ 10% ఎస్.ఎల్. ఇరువ వ్యాకేజుగళన్ను మూలవుగరగళల్లి ప్రత్యేక కోణెయల్లి, మళ్కళు కాగూ నాకు ప్రాణిగళిగే సిగదంతే బిగా కాకే భద్రపడిసి ఇడుపేకు. 2. దానాదిరువ కోణే తంపాగిద్దు, అల్లి శుష్క వాతావరణవిరబేకు. కోణెయిల్లి గాళియాళుత్తిద్దు. ఒళ్ళే బేళికేరబేకు. అదు జీన్నాగి కట్టలట్టిద్దు నాకష్టు విశాలవిరబేకు.

రాసాయనిక సంయోజనే :

ఇమేల్యోథఫిర్ టోక్. (కనిష్ఠ శుద్ధత 92%)	:11.110% తూక/తూక
ఆమోనియమ్ సోలూషన్ (10%)	:2.500% తూక/తూక
విక్లిడోథికిన్ ద్రావణ పాలిడ్మెథిమిథైల్ మత్తు పాలిఆక్సి ఇథిలీన్ స్టియరేట్	:0.050% తూక/తూక
స్టేలరేట్స్ ప్రొపేనా 1:2 డయోలో	:10.000% తూక/తూక
సోడియమ్ హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్	:0.390% తూక/తూక
పొటాష్యియమ్ హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్	:0.120% తూక/తూక
నీరు	క్యు.ఎస్.
ఒట్టు	:100.000% తూక/తూక

ఎచ్చరికే : ఈ లేబల్/పత్రప్రతియ మేలే నిర్దిష్టపడిసలాదుదన్ను హొరతుపడిసిద బేళిగళ మేలే ఉపయోగిసబారదు.

இமாஸெத்தாபைர் 10% எஸ் எல் களைக்கொல்லி

இமாஸெத்தாபைர் 10% எஸ் எல் செய்ல் பொருனான இமாஸெத்தாபைர் அடிப்படைக்கொண்ட ஓர் களைக்கொல்லியாகும். ஒரு கிலோ தயாரிப்புக்கு 10 கிராம் செயல்பொருள் அடங்கியதாகும். இது சோயாபீன் மற்றும் நிலக்கடலை பயிரில் வருடாந்தர புற்களைகள் மற்றும் அகன்ற இலை களைகளை கட்டுப்படுத்த சிபாரிச செய்யப்பட்டுள்ளது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	சாதாரணப் பெயர்	ஏ.ஐ. (கிலோக்களில்)	ஃபெரக்டேடுக்குக் தேதுவையான மருந்தளவு (லீட்டர்களில்)	இறுதித் அளவு கலக்கும் நீரினளவு (லீட்டர்களில்)	தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே இருக்க வேண்டிய இடைவெளி (நாட்களில்)
பிளாக்க்ராம்	பிராச்சியாரியா எரூசி மியார்மிஸ், அமாரந்தஸ் விரிடிஸ், யுபோர்பியா ஹிர்டா கமெலினா பெங்காலென்சிஸ்	75மிலி.ஆ/ஹா 750 எல்லம் மிளம் தாணை @2மிலிலிட்டர் @2 மிலி/ஹா தண்ணீர்	750 மிலி./ எல்லம் தாணை @2மிலிலிட்டர் 2 மிலிலிக்டர் தண்ணீர்	375	56
கிரீன் கிராம்	அமாரந்தஸ் விரிடிஸ், ட்ரையந்தெமா	75 மிலி.ஆ/ஹா 750 எல்லம் மிளம் தாணை @2மிலிலிட்டர் @2 மிலி/ஹா தண்ணீர்	750 மிலி./ எல்லம் தாணை @2மிலிலிட்டர் 2 மிலிலிக்டர் தண்ணீர்	375	46
பீசோர்ப்லாக	எக்கினோக்ளோவா கொலோனா, லட்டாம் லமிரோஸ்பெர , கமலினா பெங்காலென்சிஸ், பெங்காலென்சிஸ், டிஜிரா ஆர்வென்சிஸ், அமாரந்தஸ் விரிடிஸ், பிசலிஸ் மினிமா	75 மிலி.ஆ/ஹா 750 எல்லம் மிளம் தாணை @2மிலிலிட்டர் @2 மிலி/ஹா தண்ணீர்	750 மிலி./ எல்லம் தாணை @2மிலிலிட்டர் 2 மிலிலிக்டர் தண்ணீர்	375	102
ரெட் கிராம்	டிஜிட்டேரியா சங்குயினாலிஸ், டிஜெரா ஸ்ரெல ரோம்பைகா	75 மிலி.ஆ/ஹா 750 எல்லம் மிளம் தாணை @2மிலிலிட்டர் @2 மிலி/ஹா தண்ணீர்	750 மிலி./ எல்லம் தாணை @2மிலிலிட்டர் 2 மிலிலிக்டர் தண்ணீர்	375	125
சோயா பீன்	டிஜிரா ஆர்வென்சிஸ், கமலினா பெங்கா கலென்சிஸ், எக்கினோக் ளோவா கலோனா, பிராச்சியாரி எரசிமிப்ரம்மில் ஈ. க்ரஸ்கலி, யுபோர்பியா ஹிர்டா., கமலினா பெங்காலென்சிஸ், டிஜெரா ஆரபிகா, டிஜிட்டேரியா எஸ்பிபி.	75 மிலி.ஆ/ஹா 750 எல்லம் மிளம் தாணை @2மிலிலிட்டர் @2 மிலி/ஹா தண்ணீர்	750 மிலி./ எல்லம் தாணை @2மிலிலிட்டர் 2 மிலிலிக்டர் தண்ணீர்	375	72

உபயோக முறைகள்:

இமாஸெத்தாபைர் 10% எஸ் எல் சோயாபீன் மற்றும் நிலக்கடலையில் வருடாந்தர புற்களைகள் மற்றும் அகன்ற இலை களைகளை கட்டுப்படுத்தும் ஓர் பரந்து செயலாற்றும் களைக்கொல்லி. இதை களைகள் முளைவிடும்போது பயன் படுத்தவும். விதைத்தபின் 7-14 நாட்களுக்குள் களைகள் முளைவிடும்போது அதாவது 1-2 இலைகள் விட்டிருக்கும்போது உபயோகித்த சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தெளிப்பு கலவை தயாரித்தல் : பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை கம்பியினாலோ அல்லது தோலினாலோ நன்கு கலந்து தேவையான அளவு தண்ணீரை அதோடு கூட்டவும்.

தெளிப்பு நிபந்தனைகள் : 1. நிலத்தை நன்றாய் தயார் செய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும். ஒன்றுக்குமேல் ஒன்றிராமல் சீராக தெளிக்கவும். 2. காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்கக் கூடாது. 3. உபயோகத்திற்கு முன்னும். பின்பும் தெளிபாலை கழுவவும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட சாதனம் : ஃப்ளாட்ஃபான் அல்லது ஃப்பனட் ஜெட்நாஸில் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாத். தெளிப்பான் அல்லது மிதி தெளிப்பான் போன்ற அதிக அளவு தெளிப்பு துவாளின் மூலம் தெளிக்கவும்.

உபயோகிப்பவர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. அடர்த்தியான இத்துயாரிப்பு சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். 2. தெளிக்கும்போது, கையுறைகள், முக கவசம் போன்ற பாதுகாப்பான அணிகலள்களை அணியவும். 3. தெளிப்பின்போது உண்ணவோ, பருகவோ அல்லது புகைக்கபோ கூடாது. 4. தெளிப்பு சாறல் படுவதை தவிர்க்கவும். 5. வேலை முடிந்ததிற்கு சாப்பிடுவத்ற்கு முன் கைகளையும் மாசுபட்ட சருமத்தையும் கழுவவும்.

ஃபைடோ விஷத்தன்மை : பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் ஃபைடோ விஷத்தன்மை காணப்படவில்லை.

முதலுதவி : 1. சருமத்தின் மீது பட்டுவிட்டால் ; கறைப்படிந்த ஆடையை அகற்றவும். சருத்தை அதிகளவு சோப்பு மற்றும் நீரைக் கொண்டு கழுவவும். 2. கண்களில் பட்டுவிட்டால் ; அதிகளவு நீரைக் கொண்டு கண்களைக கழுவவும். 3. சுவாசித்துவிட்டால் ; பாதிக்கப்பட்டவரை காற்றோட்டமான இடத்திற்கு கொன்டு செல்லவும். 4. விழுங்கிவிட்டால், வாந்தியெடுக்கச்செய்யவும்.

நச்சு முறிக்ும் மருந்து : குறிப்பிட்ட நச்சு முறிக்கும் மருந்து எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். தேவையெனில் மருந்துவரை அமுக்கவும்.

விஷமேறிய அறிகுறிகள்: சருமத்திலும் கண்களிலும் எரிச்சல் ஏற்படலாம்.

கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதுல் : 1. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் எந்திரத்தை கழுவிய நீர் மற்றும் கொள்கலன்களை கற்றுமப்புறகுழல் அல்லது நீர் நிலைகள் மாக ஏற்படாதபடி. அவைகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும். 2. காலி கொள்கலன்களை மறுமுறை பயன்படுத்த வெளியில் விட்டுளிட்க் கூடாது. பேக்கேஜ்களை உடைத்து, நீர் ஓடைகள் அடியில் இல்லாத தரிக நிலத்தில் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைத் வேண்டும்.

சேமிப்பு : 1. அடங்கியபேக்கேஜை அதன் கலத்திலேயே வைத்து குழந்தைகள் மற்றும் வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2. சேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் குளிர்ந்து, உலர்ந்து, நல்ல காற்றோட்டமுள்ளதாய், நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாய், நன்கு கட்டப்பட்டதாய், போதிய பரப்பளவு கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:

இமாஜெதாபைர் டெக் (குறைந்தபட்சதூய்மை 90%)	11.110% எ/எ
அம்மோனியம் சொல்யுஷன் (10%)	
அக்யுவஸ் சொல்யுஷன் ஆஃப் பாலிடைமெதைல் சிலோக்ஷேன் அண்ட் பாலிஆக்ஸிஎதிலீன் ஸ்டியரேட்	2.500% எ/எ
ப்ரோபேன் 1:2 டியோல்	10.000% எ/எ
டைஸோடியம் டைஹைட்ரோஜன் பாஸ்பேட்	0.390% எ/எ
பொடாஷியம் டைஹைட்ரோஜன் பாஸ்பேட்	0.120% எ/எ
நீர்	க்யு.எஸ்.
மொத்தம்	100.000% எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Amish CROP SCIENCES

KILLWAY
Imazethapyr 10% S.L.
(Herbicide)

ಕಿಲ್‌ವೆ
ಇಮಾಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್.ಎಲ್.
(ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

किलवे
इमॉझिथापर १० प्रतिशत एस एल
(खरपतवारनाशक)

కిల్‌వే
ఇమాజెథాపైర్ 10% ఎస్.ఎల్.
(కలుపునాశిని)

கிலவே
இமாஸெத்தாபைர் 10% எஸ் எல்
(களைக்கொல்லி)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ.
बच्चों से दूर रखिए।
மக்களிகி சிகதம்தே தூரவிடி.

सावधान सिर्फ हरे
CAUTION
GREEN

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚದುವವಲಯುನು.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD
Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg. No.: CIR-132467/2016-Imazethapyr (SL) (354)-143

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE