Metribuzin 70% W.P.
(Herbicide)

It is a selective herbicide for the control weeds in Soybean, Wheat, Sugarcane, Potato and Tomato crops.

Recommendations:

Crop(s)	Common Name of pest	A.I. (kg.)	Dosage/HA. Formulation (kg.)	Dilution in water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-Entry after each application (in hours)
Potato	Chenopodium album, trianthema monogyna, Parthenium hysterophorus, Fumaria parviflora, Melilotus spp., Phaleris minor	0.525	0.75	750-1000	30	
Sugarcane	Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Asphodelusfistulosus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Anagalis arvensis, Cichorium intybus, Echinochloa colonum, Dactyloctenium aegyptium, Parthenium hysterophorus, Commelina spp.	Pre-emergence :1.05-2.0; Post emergence: 1.05-1.4	Pre-emergence 1.5-3.0, Post emergence 1.5-2.0	750-1000	60	
Wheat	Phalaris minor, Chenopodium album , Melilotus Spp.	Medium soil: 0.175, Heavy Soil: 0.210	Medium soil: 0.250,Heavy Heavy Soil: 0.300	500-750	120	
Tomato	Trienthema portulacastrum, Dactylocteniumaegyptium, Gynandropsis pentaphylla, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea, Digera arvensis, Euphorbia prostrata, Echinochloa colonum, Ageratum conyzoides, Eleusine indica, Setaria glauca, Commelina benghalensis	0.525	0.75	750-1000	30	
Soybean	Cyperus campestris, Eragrostis spp., Digitaria spp., Cyperus esculentus, Borreria sp.	0.350-0.525	0.500-0.750	750-1000	30	

Direction of Use:

Preparation of spray solution: First add a little quantity of water to the wettable powder and prepare a thin paste. Add this solution slowly into the required quantity of water and stir well. Operators are always recommended to give the spray a through stirring when resuming work after breaks.

Plant Protection Equipments : Knapsack or foot operated sprayers fitted with flat fan or flood jet type of nozzle. To ensure better effectivenss follow undermentioned guidelines.

(1) For pre-emergence application : (a) Ensure that the field do not have clods and stubbles (b) After spraying metribuzin 70 WP, do not distrub the soil.

(2) For pre and post emergence application: (a) Avoid drift of spray into adjoining crop field. The recommended time of application and dose should be observed. metribuzin 70 WP should be sprayed with flood jet/flat fan nozzles without overlapping spray swaths. To keep uniform swath width, it is advisable to keep the nozzle height constant from ground level i.e. 48-50 cms.

Precautions by users :- 1. After each operation the mixing and spraying equipment is to be rinsed thoroughly with plenty of water, using a detergent or soap solution before being put to use for spraying other pesticides 2. Any surplus spray solution must not be disposed off in crop lands or in stagnant flowing water, where there is a possibility of polluting sources.

Limitations for use:- It should not be used in crops where it has not been recommended. It should never be used in combination with any insecticides, urea or growth regulators.

Precaution for use in wheat: 1. Avoid use in Sandy soil 2. Spray on clear day 3.Second irrigation should be light and avoid stagnation of water 4.Avoid overlapping during application 5.Do not tank mix with other herbicides 6.Do not broadcast. It should be sprayed at optimum concentration with flood Jet/Flat Fan nozzles. 7. Concentrate in areas where resistance of Phalaris minor is confirmed.

Time of Application: Soybean: Pre emergence- 1-2 days after sowing. Wheat: post emergence- 35 days after sowing. Sugarcane: Pre emergence- 3-5 days after planting or Post emergence- 25-30 days after planting. Potato: Pre emergence- 3-4 days after planting or post emergence- between emergence and time when the first potato plant have reached height of 5 cms. Tomato: Pre-planting- a week before transplanting or post planting- 15 days after transplanting.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Headache, nausea, allergic manifestation, nervousness, anxiety, tremor, spasticity in muscles may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials & washing from the machines & container should be disposed of in a safe manner as to prevent environment of water pollution 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re - use 3. Packages shall be broken & burried away from habitation

Storage Conditions: 1. The packages containing weedicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under under lock & key & key depending upon the quantity & nature of weedicides & insecticides. 2. The rooms or premises meant for storing weedicides & insecticides shall be well built, dry well lit & ventilated & of sufficient dimension. To avoid contamination with vapours.

Chemical Composition:

Metribuzin Technical (Based on 88% w/w a.i.)	79.55% w/w
Wetting agent : Alkyl Arly sulphonate	5.00% w/w
Dispersing Agent (alkaryl sulphonate) Mixture of salt of naphthelene sulphonic acid and phenol sulphonic acid condensate product	6.00% w/w
Silica acid	8.00% w/w
China Clay	1.45% w/w

మెట్రిబుజిన్ 70% డబ్ల్యు.పి.
(కలుపునాశిని)

సోయాచిక్కుడు, గోధుమ, చెఱకు, బంగాళదుంప మరియు టమాట పైర్లపై పచ్చు కలుపు మొక్కలను అరికట్టు ఎంపికచేసిన కలుపునాశిని.

సిఫారసు :

పంట (లు)	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హా. స.వ. (కిలో.)	మోతాదు/హా. మిశ్రమము (కిలో*)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారికి కోత వరకు విరామం (రోజులు)	మరల ప్రవేశం (గంటలు)
బంగాళదుంప	కెపసొరియం ఆల్బం ట్రయంతెమ మొనోగినా పార్థినియం హిస్టెరోఫొరస్ ఫ్యుమేరియా పార్వీఫ్లొరా, మెలిలోటస్ స్పె, ఫాలారిస్ మైనర్	0.525	0.75	750-1000	30	
చెఱకు	సైపరస్‌రొటుండస్ సైనెలార్ డాక్టిలన్, ఆస్ఫొడిలస్ ఫిస్టులోసస్, కెపసొరియం ఆల్బం కన్వాల్యులస్ ఆర్వెన్సిస్, పొర్టులాకా ఓలరేసియా,అనాగలిస్ ఆర్వెన్సిస్, చికోరియం ఇంటిబస్, ఎకినోక్లోవా కోలనం,డాక్టిలోక్టినియం ఈజిప్టియం, పార్థినియం హిస్టెరోఫొరస్, కొమెలినా స్పె.	కలుపుమొలకెత్తుటకు ముందు 1.05-2.0, కలుపులు మొలకెత్తిన తర్వాత 1.05-1.4	1.05-3.0 1.5-2.0	750-1000	60	
గోధుమ	ఫలారిస్‌మైనర్, కెపసొరియం ఆల్బం మెలిలోటస్‌స్పె.	మధ్యస్థ నేలలు: 0.175 భారీనేలలు 0.210	మధ్యస్థ నేలలు:0.250 భారీనేలలు 0.300	500-750	120	
టమాట	త్రయంతెమ పొర్టులాక్యాస్ట్రమ్ డాక్టిలోనిక్ష ఈజిప్టియం, సైనొడాన్‌స్పె., సెంబాపిల్లా, అమరంతస్ విరిడిస్, పొర్టులాకా ఒలరేసియా,డిజేరా ఆర్వెన్సిస్, యూఫొర్బియా ప్రొస్టెటా, ఎకినోక్లోవా కోలనం,ఎజెరటం కొనిజాయిడ్స్, ఎలయ్యసిన ఇండికా, సెటారియా లౌకా, కొమెలినా బెంగాలెన్సిస్	0.525	0.75	750-1000	30	
సోయా చిక్కుడు	సైపరస్ కంపెస్ట్రిస్, ఎరాగ్రొస్టిస్ స్పె సైపరస్ ఎస్కులెంటస్ బొరొరియా స్పె డిజిటేరియా స్పె	0.350-0.525	0.500-0.750	750-750	30	

ఉపయోగించుటకు సూచనలు:

పిచికారీ ద్రావణం తయారీ : నీటిలో కలిగే పొడరునకు కొద్దిపాటిని కలిపి పలుచని పేస్ట్ లా తయారుచేసుకోవలెను. దీనిని అవసరమైన నీటి పరిమాణంలో కలిపి బాగా పూర్తిగా కలిగేలా కలియ త్రిప్పి పిచికారీ సిద్ధంచేసుకొనవలెను.

సన్నద్ధత పరికరములు : ఒకేతిది వత్తిడితో నీటిని పిచికారీ చేయుటకు ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్ లేదా ఫ్లడ్‌జెట్ నాజల్ బిగించిన నాప్‌సాక్ లేదా పుట్ స్ప్రేయర్లు పంటిని ఉపయోగాకరం.

ప్రిమర్జెన్స్ పద్ధతి : 1. కలుపుమొక్కలు మొలకలు రాకముందు : ఎ. పొలములో మట్టి గడ్డలు లేకుండా చదునుగా చేయవలెను. బి) మెట్రిబుజిన్ పిచికారి తర్వాత పొలమును దెదరనియరాదు. 2. కలుపుమొలకెత్తక ముందు మరియు తర్వాత : మెట్రిబుజిన్ 70% డబ్ల్యు.పి. పిచికారి యజమాన్యము అవసరము దీనిని ఫడ్‌జెట్ నాజల్ లేక ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్ నాజల్ బిగించబడిన పంపులోపిచికారి చేయవలెను. నాజల్ ఎత్తు 48-50 సెం.మీ. ఉండాలి. ప్రక్కపొలంలో మందు పడకుండా జాగ్రత్తపరాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ప్రతి పిచికారి తర్వాత పంపును బాగుగా సబ్బు లేదా డిటర్జెంట్ నీటితో శుభ్రపరచవలెను. 2. మిగిలిన మందు ద్రావణము. పారేసిటిలో లేక వేరే పొలములలో పారవేయరాదు. నీరులేక వాతావరణము కలుషితమగు అవకాశములుంటుంది.

మందు వాడుటకు పరిమితి : సిఫారసుచేయని పంటలపై ఉపయోగించరాదు. దీనిని కీటకనాశనులు మరియు యూరియా లేదా ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్లుతో కలిపి వాడరాదు.

మందు ఉపయోగించు పరికరము : నాప్‌సాక్ పంపు, రొక్కుడు పంపు, గాలి ఒత్తిడి నాప్‌సాక్ పంపు ఫ్లాట్ ఫ్యాన్/ఫ్లడ్ జెట్ నాజల్ బిగించబడినది. అవసరమును బట్టి చూడవలెను.

గోధుమ పైరుపై జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఇసుకనేలల్లో ఉపయోగించరాదు. 2. అనుకూల వాతావరణములో పిచికారి చేయవలెను. 3. రెండవ సారి నేల తడిసివనుడు నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకొనవలెను. 4. పిచికారి చేయునప్పుడు మందును కింపడనీయరాదు. 5. పిచికారి పంపులో వేరే కలుపుమందులు కలపరాదు. 6. మందును చేతులజల్లరాదు. సరియగు మోతాదులో ఫడ్‌జెట్/ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్ బిగించబడిన స్ప్రేయర్‌తోనే పిచికారి చేయాలి.7. కావలిగడ్డి నిరోధకతను పెంపొందించుకున్న ప్రాంతాలను ఎంచుకుని పిచికారీ చేయండి.

ఉపయోగించు సమయం : సోయా చిక్కుడు : కలుపుమొలకెత్తక విత్తిన 1-2 రోజులలో వాడాలి. గోధుమ: నాటిన 35 రోజులకు పోస్ట్‌ఎమర్జెన్స్‌గా వాడాలి. చెఱకు: నాటిన 3-5 రోజులకు ప్రిమర్జెన్స్‌గా, పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ గా నాటిన 25-30 రోజులలో, బంగాళదుంప : నాటిన 3-4 రోజులకు ప్రిమర్జెన్స్‌గా, పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ గా నాటిన 5 సె.మీ. ఎత్తు బంగాళదుంప మొక్క ఎత్తు దశలో, టమాట : నాటుటకు వారం ముందు లేదా నాటిన : 15 రోజుల తర్వాత.

ముందుజాగ్రత్తలు : 1. ఆహారపదార్థములు, ఆహారపదార్థాల సామగ్రి మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. ముఖము, కళ్ళకు, చర్మమునకు అంటనియరాదు. 3. మందు ద్రావణను పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు, శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకోవలెను. 5. ఉపయోగించునప్పుడు పొగత్రాగుట, తినుట, త్రాగుట లేదా ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునప్పుడు లేదా ఉపయోగించునప్పుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులను ధరించవలెను.

విషలక్షణములు : తలనొప్పి, వికారం, అలర్జీ, బలహీనత, ఆందోళన, సొమరితనం, కండరాలు బిగుసుకుపోవుట వంటివినేత్రవిపంచవచ్చును.

ప్రథమచికిత్స : 1. మింగినచో గొంతువెనుక భాగం స్పరేపించి ద్రవం పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంతవరకు వాంతి చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలోని వ్యక్తికి వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు, చర్మం కలుషితమైన సబ్బుతో చర్మమును బాగా సబ్బుతో మరియు నీటితో శుభ్రపరచుకోవాలి. 4. కళ్ళలో పడినచో కళ్ళలో పడితే 10-15 నిమిషాల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగండి. 5. పీల్చినచో : రోగిని బాగా గాలిచచ్చు చోటికి తరలించండి.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడుతెలియదు. లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయవలెను.

ఖాళీ కంటైనర్ల నిపర్జన : 1. పరిసరాలు, నీరు కాలుష్యం కానియని రీతిలో మిగిలిన పదార్థాలు, యంత్రములను కడిగిన నీరు, సురక్షితంగా విసర్జించవలెను. 2. ఖాళీ కంటైనర్లను తిరిగి ఉపయోగించుటకు వీలుకాని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 3. ఖాళీ కంటైనర్లను పనిలగొట్టి జనవాసమునకు దూరముగా భూమిలో పాతి పెట్టవలెను

నిల్వ : 1. కలుపునాశినులు మరియు కీటకనాశినుల గల ప్యాకేజీలను వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా ప్రత్యేక అల్మారాలలో తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 2. కలుపునాశనులు మరియు కీటకనాశినులను నిల్వ చేయు గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా గాలి, వెలుతురు కలిగి, సరియగు కొలతలతో కలుషిత ఆవిర్లను నిరోధించేలా జాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

మెట్రిబుజిన్ టెక్నికల్ (88% భా/భా స.వ. ఆధారిత)	79.55% భా/భా
వెట్టింగ్ ఏజెంట్ (ఆల్కిల్ ఆరిల్ సల్ఫానెట్)	5.00% భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (ఆల్కిల్ సల్ఫానెట్) నప్థలిన్ ఆమ్ల ఉప్పు మిశ్రమము మరియు ఫినాల్ సల్ఫానిక్ ఆమ్లకండెన్సెట్ పదార్థము)	6.00% భా/భా
సిలికా ఆమ్లము	8.00% భా/భా
చైనాక్లే	1.45% భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపైనే తప్ప, ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

मैट्रीबुजीन ७०% प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(खरपतवारनाशक)

यह एक चुनिंदा खरपतवार नाशक हैं जो सोयाबीन एवं गेहूँ की फसल में उगने वाले खरपतवार को नियंत्रित करता हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	स.तत्व (किग्रा)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (किग्रा)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन:प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
आलू	बथुआ, सांठी, नाजर घास, पितपापडा, सेजजी, मुल्ही डंडा	०.५२५	०.७५	७५०-१०००	३०	
गन्ना	मोथा, दूब, प्याजी, बथुला, हिरनखुरी, कुल्फा कृष्णनील कारानी, सांमक, मकडा, नाजर घास, कैना	प्री-ईमरजेंस: १.०५-२.०, पोस्ट ईमरजेंस: १.०५-१.४	प्री-ईमरजेंस १.५-३.० पोस्ट ईमरजेंस: १.५-२.०	७५०-१०००	६०	
गेहूँ	मुल्ही डंडा, बथुआ, सैंजी	दोमट मिट्टी ०.१७५, भारी मिट्टी ०.२१०	दोमटमिट्टी ०.२५०, भीरी मिट्टी ०.३००	५००-७५०	१२०	
टमाटर	पथचरटा, मकडा गास, हुलहुल, जंगली चौलाई, कुल्फा, लहसुआ, दुधी घास, जंगली धान, महकुआ, कांमनी कनकऊआ, जंगली मारुआ	०.५२५	०.७५	७५०-१०००	३०	
सोयाबीन	मदन घंटी, रामघना, क्रेव घास, पीली मोथी, पान घास	०.३५०-०.५२५	०.५००-०.७५०	७५०-१०००	३०	

उपोयग के लिए निर्देश :

चिडकाव के लिए घोल बननाः पहले मैट्रीबुजीन की आवश्यक मात्रा लेकर थोडे से पानी मे मिलाकर पतली लई (पेस्ट) तैयार कर लें । इस लई को आवश्यक पानी की मात्रा मे धीरें धीरें डाल कर अच्छी तरह मिला ले । प्रयोगकर्ताओ को सुझाव दिया जाता है कि काम के बीच में आराम करने के बाद फिर से छिडकाव शुरु करने के पूर्व घोल को अच्छी तरह मिला लें।

शिफारिस किये हुए छिडकाव के यंत्र– नैपसेक या पैर से चलने वाले स्प्रेयर (फुटपम्प) मे फलट फैद या फलेट जैट नोजल लगाकर प्रयोग करें। १. अनुकरण के पूर्व की प्रयोग की विधि । अ) खेतो में मिट्टी के ढेले और पौधे की खूटीया नही होनी चीहियें। ब) मैट्रीबुजीन के छिडकाव के बाद जुताई –गुढाई न करें। २. अंकुरण के पूर्व और पश्चात की प्रयोग की विधियो। अ) छिडकाव इस प्रकार करे कि प्रधान फसल के अलावा नजदीकी अन्य फसलो पर छिडकाव न पड़े। ब) निर्देशित छिडकाव का समय और मात्रा का ध्यान रखना चाहिए । छिडकाव को न दुहराते हुए मैट्रीबुजीन का छिडकाव फ्लेट जैट/फलैट फैन नोजल द्वारा करना चाहिए । छिडकाव की एक जैसी जौडाई हासिल करने के लिए नोजल को जमीन से ४८–५० सें.मी. ऊची रखनी चाहिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १.घोल तैयार करते समय सांस द्वारा अंदर न आने दे और न ही चमडी से स्पर्श होने दें। २. इसे नंगे हाथो से न मिलायें। ३. हर प्रयोग के बाद दूसरे कीटनाशक के छिड़काव के पहले मिश्रण करने के साधन छिड़काव के यंत्र को साबुन लगाकर खुब पानी से अच्छी तरह धो लें। ४. कोई भी बचा हुआ घोल फसल वाले खेत या हरे हुए पानी में प्रदुषित होने की संभावना न हो वही फैकना चाहिये।

प्रयोग की सीमा– इसे उन फसलो मे प्रयोग न करे जिनके लिए कोई सिफरिस नही की गयी है। प्रयोग का समय सोयाबीन : उगने से पहले, बुआई के १–२ दिन बाद । उगने के बाद, बुआई के २७ दिन बाद । प्रयोगकर्ताओं के लिए

गेहूँ में उपयोग के लिए सावधानियाँ–१.रेलीली मिट्टी में उपयोग न करें २. खरपतवार का प्रयोग साफ दिन में करें ३. दूसरी सिचाई हल्की हो और पानी को खेत में खडा न होने दें। ४. मैट्रीबुजीन का छिडकाव एकसार करें तथा एक जगह पर दोबारा छिड़काव न करें। ५. टैंक मे कोई दूसरा खरपतवार नहीं मिलाना चाहिए। ६. भुरकाय नही करना हैं। इसको फलड है। इसको फलड जैट/फलैट फैन नोजल के साथ छिड़काव उचित मात्रा के साथ करे। ७. इसका उपयोग आइसोप्रोटूरोन प्रतिरोधी गुल्ली जन्डे वाले स्थानों पर करें।

प्रयोग का समय : सोबाबीन: उगने से पहले, बुआई के १–२ दिन बाद । गेहूं: उगने के बाद, बुआई के ३७ दिन बाद। गन्ना: उगने से पहले, बुआई के ३–५ दिन बाद अथवा उगने के बाद, बुआई के २७–३० दिन बाद। आलू: उगने से पहले, बुआई के के ३–४ दिन बाद के तथा आलू का पहला पौधा ९ से.मी. ऊंचाई होने के बीच के समय में । टमाटर: रोप लगाने के एक सप्ताह पहले या रोप लगाने के १४ दिन बाद।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशउओ के चारे से दूर रखें। २. मूंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो के अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, मितली, ऐलर्जिक मेनिफेस्टेशन, घबराहट, चिंता, कंपकंपी, मांसपेशियो की अकडन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे बुढगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दैं जौड दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोए। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाईन /साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धाएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शउढ हवा में ले जायें ।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बें का निपटा : १.खापतवार नाशक निर्माताँ/उपयोग कर्ता का कतृव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बो को दूबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडे। ३. डिब्बो या बची हुई खरपतवारनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे असपास की जीचे पानी विषैला : खुला न हो ।

संग्रहण की शर्तें : १. खारपतवार नाशक के पात्रो को उन कमरो या उगहो से अलग जिससे खाद्य पदार्थ रखा हो ताला चाबी के अन्दर अलग अलमारी मे उसग अलमारी मे उसकी मात्रा व गुण पर निभर करते हुए भण्डारण करना चाहिए । २. जिसमे कमरे या जगह का चयन कीटनाशक भंण्डारण हंतु किया गया हो वह पूर्ण मजबुत, सुखा, प्रकाशयुक्त, हवादार, व प्रकार में लम्बा जौडा होना चाहिये । जिससे कि वातावरण दूषित होने का खतरा न हो ।

रासायनिक संरचना :

मैट्रीबुजीन टैक्निकल (भारानुसार ८८ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	७९.५५% भार/भार
वेटिंग एजेन्ट : एल्काइल एराइल सल्फोनेट	५.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेन्ट– एल्कोरेल सलफोनेट : नैफ्थेलीन सल्फोनिक एसिड तथा फिनोल सल्फोनिक एसिड कन्डेन्सेट साल्ट का मिश्रण उत्पाद	६.०० % भार/भार
सिलिका एसिड	८.०० % भार/भार
चाइना क्लें	१.४५% भार/भार
योग	१००.००० % भार/भार

चेतावनी:इल लेबल हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

Amish CROPSCIENCES

GAMER
Metribuzin 70% W.P.
(Herbicide)
గేమర్
మెట్రిబుజిన్ 70% డబ్ల్యు.పి.
(కలుపునాశిని)
गेमर
मेट्रीबुजीन ७० प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
(खरपतवारनाशक)
ಗೇಮರ್
ಮೆಟ್ರಿಬುಜಿನ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.
(ಕಳಿನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಖತರಾ ಅಪಾಯ DANGER BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by

AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD

Survey No. : 172, Udumulapadu (Vill),
Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222
Andhra Pradesh, INDIA.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" No.: 040-4855 5451,
Email : customercare@amishcropsciences.com

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281

Regn.No.:CIR-130849/2015-Metribuzin (WP) (356)-163

FOR AGRICULTURAL USE

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

मेट्रोब्यूझिन ७०% डब्लू.पी.

(तण-अवांछित वनस्पतीनाशक)

हे एक निवडक वनस्पतीनाशक असून ते सोयाबीन आणि गव्हाच्या पीकातील तण व अवांछित रानटी गवत यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरले जाते.

शिफारशी :

पीके	रोगजंतूचे सामान्य नांव	मात्रा प्रति हेक्टर ए.आय. किलो	सुगीकरण कीलो	सौम्यीकरण-पाण्यात (लिटर)	प्रतिक्षा अवधि शेवटची फवारणी आणि कापणी यात (दिवस)
बटाटा	चेनोपोडियम अल्बम, ट्रायव्हेश्मा मोनोग्यायना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, फुमरिया आर्विफेलिरा, मेलिलोटस एसपीपी., झहद्भश्रीळी मायनर	०.४२५	०.७५	७५०-१०००	३०
ऊस	सायपेरस रोटंडस, पूर्व-पूर्व-पूर्वेवेय वरलूप्रिय, उद्यय उद्यय एस्पोडेलासफिस्टुलोसस, : चेनोपोडियम अल्बम, उद्यय्यानंतर कॉन्व्होल्युलस आर्वेन्सिस, पोर्तुलाका ओलेरेसिया, ॲनानलिस आर्वेन्सिस, सिकोरियम इंटिबस, इचिनोक्लोआ कॉलोनम, डिक्टिलोकेटेनियम इजिप्टियम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कॉमेलिना spp.	७५०-१००० उद्यय: १.४-२.० १.०४-१.४	६० १.४-३.०,पोस्ट		
गहू	फलारिस मायनर, चेनोपोडियम अल्बम, मेलिलोटस एसपीपी.	मध्यम माती: ०.१४४, हेवी माती: ०.२१०	मध्यम माती: ०.२५०, हेवी भारी माती: ०.३००	४००-७५० १२०	
टोमॅटो	ट्रायव्हेश्मा पोर्टुलाकास्ट्रम, डिक्टिलोटोनियम इजिप्टिकम, नायनड्रॉप्सिस पेंटापिला, अमरॅन्थस विरिडिस, पोर्तुलाका ओलेरेसिया, हिमेरा आर्वेन्सिस, युफोर्बिया प्रोस्ट्रा, इचिनोक्लोआ कॉलोनम, एजेरेटम कोझिझोइडस, एल्युसिन इंडिका, सेटारिया ग्लॉका, कॉमेलिना बेंघालेन्सिस	०.४२५	०.७५	७५०-१०००	३०
सोयाबीन	सायपरस कॅम्पेस्ट्रिस, एराझोस्टिस एसपीपी., डिजिटारिया एसपीपी., सायपरस इस्कुलेंटस, बोरेरिया एसपी.	०.३५०-०.४२५	०.४००-०.४७०	७५०-१०००	३०

वापरण्याची दिशा:

स्प्रे सोल्यूशन तयार करणे: प्रथम ओल्या पावडरमध्ये थोडेसे पाणी घाला आणि पातळ पेस्ट तयार करा. हे द्रावण हळुहळु आवश्यक प्रमाणात पाण्यात घालून चांगले ढवळावे. ब्रेकनंतर पुन्हा काम सुरू करताना ऑप्टेटर्सना मेझमी स्प्रे यूं'घे णीश: स्टिरींग देण्याची शिफारस केली जाते.

वनस्पती संरक्षण उपकरणे: सपाट पंखा किंवा फ्लड जेट प्रकारच्या नोझलसह ॲपर्चर किंवा पायावर चालणारे स्प्रेअर, उत्तम परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधोरेखित मार्गदर्शक तत्वांचे अनुसरण करा.

(१) पूर्व-उद्योगासाठी : (अ) शेतात गहू आणि पेढा नसल्याची खात्री करा (ब) मेट्रीब्युझिन ७० डब्ल्यूपी फवारणी केल्यानंतर, माती विस्कळीत करू नका, (२) उद्यापूर्वी आणि नंतरच्या जर्जासाठी: (अ) फवारणी शेजारील पिकाच्या शेतात वाहून जाणे टाळा, जर्ज आणि डोराची शिफारस केलेली वेळ पाहली पाहिजे, ॲप्लिकॉलिंग ७० श्रद्धा ची फवारणी फ्लड जेट/फ्लॅट फॅन नोझल्सचे स्प्रे स्वॅब्सवर न करता फवारणी करावी, एकसमान स्वाथ रुंदी ठेवण्यासाठी, नोजलची उंची जमिनीच्या पातळीपासून स्थिर ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो, म्हणजे ४८-५० सेमी,

वापरकर्त्यांनी लावावयाची खबरदारी:- १. प्रत्येक ऑप्रेशनंतर मिक्सेस आणि फवारण पंपाच्या भरपूर पाण्याने धुवावीत, हरंत कीटकनाशके फवारणीसाठी वापरण्यापूर्वी डिटर्जंट किंवा साबण द्रावण वापरून २, कोणत्याही अतिरिक्त फवारणी द्रावणाची विल्हेवाट लावली जाऊ नये, पिकांच्या जमिनीत किंवा साचलेल्या पाण्यात, जेथे प्रदूषित स्रोतांची शक्यता असते,

वापरासाठी मर्यादा:- ज्या पिकांची शिफारस केलेली नाही अशा पिकांमध्ये याचा वापर करू नये, कोणत्याही कीटकनाशके, युरिया किंवा द्रोथ रेक्युलेटरच्या संयोगाने ते कधीही वापरले जाऊ नये,

गव्हाच्या वापरासाठी खबरदारी: १. वालुकामय जमिनीत वापर टाळा २, स्वच्छ विवडली फवारणी करा ३, दुसरे सिंचन हलके असावे आणि पाणी साचून राहणे टाळा ४, अर्ज करताना ओव्हरलॅपिंग टाळा ५, इतर तणनाशकांसह टाकी मिसळू नका ६, कस नका प्रशासण फ्लड जेट/फ्लॅट फॅन नोझलसह इष्टतम एकाग्रतेवर फवारणी करायी, ७, फलारिस मायनरच्या प्रतिकारांची पुष्टी झालेल्या भागात लक्ष केंद्रित करा.

अर्ज करण्याची वेळ: सोयाबीन: उगवण्यापूर्वी- पेरणीनंतर १-२ दिवसांनी, गहू: उगवल्यानंतर- पेरणीनंतर ३१ दिवसांनी, ऊस: उगवण्यापूर्वी- लागवडीनंतर ३-४ दिवसांनी किंवा उगवल्यानंतर- २१-३० दिवसांनी, बटाटा: उगवण्यापूर्वी- लागवडीनंतर किंवा उद्ययानंतर ३-४ दिवसांनी- बटाट्याच्या पहिल्या रोपाची उंची ९ सें.मी. टोमॅटो: लागवडीपूर्वी- लावणीपूर्वी एक आठवडा किंवा लागवडीनंतर- १४ दिवसांनी,

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा, वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करायी. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, नशापान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६, मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे : डोकेदुखी, मळमळ, ऍलर्जी प्रकट होणे, चिंताग्रस्तपणा, चिंता, थरथर, स्नायूंमध्ये स्पॅस्टिकिटी होऊ शकते,

प्रथमोपचार: १. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा, उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा, रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करू नका, २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १४ मिनिटे भरपूर ओतर/स्वच्छ पाण्याने धुवा. ४. ऐसर घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. मशिन आणि केंटेनरमधून पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरुवितपणे विल्हेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरणातील जलप्रदूषण टाळण्यासाठी २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर गाडल्या जातील

स्टोरेज जरी: १. तणनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा तणनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरात ठेवाव्यात, आणि कीटकनाशके, २, तणनाशके आणि कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले, कोरडे चांगले प्रकाश आणि हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत, बाष्पांशह दूषित होऊ नये म्हणून,

रासायनिक रचना:

मेट्रीबुझिन तांत्रिक (८८% व/व स.त.वर आधारित)	७१.४४% व/व
ओले करणारे घटक : अल्काइल आर्ली सल्फोनेट	५.००% व/व
डिस्पेर्सिंग एजंट (अल्केरिन सल्फोनेट) नॉप्थेलीन सल्फोनिक ऍसिडच्या मीठाचे मिश्रण आणि फिनॉल सल्फोनिक ऍसिड कंडेन्सेट उत्पादन	६.००% व/व
सिलिका ऍसिड	८.००% व/व
वाचला क्ले	१.४४% व/व
एकूण	१००.००% व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

मेट्रिब्युझिन 70% डब्ल्यू.पी.

(कलीनाशक)

इदो फलवरिन् मैनर, चेनोपोडियम् अल्बम्, मेलिलोटस् एस्पि, गोव्ढी मधु स्ट्रिफ्रस् क्यूप्यूरीनि, एरीग्वाटिस् एस्पि, डिजीटेरीयाम एस्पि., स्ट्रेफरस् एन्युलीलेटस्, बोरीरीयाम एस्पि, नियोत्रीलाई शिफारस मादिद सस्यनाशकवनारिदी, सोयाबीनमॅयाळी नियोत्रीसेल शिफेलगिदी.

शिफारसः

बीजे	रोगयोग्यप्रजाती		प्रमाण/हॅक्टरीगे स.घ.ह. कि.ग्रा.		फ्लाय्ड्र लॅक्शन प्रमाण कि.ग्रा.		नियंत्रण प्रमाण (दि)	कीडीयोजनेतील मधुरोक्युन्न नसेमधे कळ्यांवरील वाढ़ीदिवसांमधे
अलाबाडी	चीनोपोडियम् अल्बम्. 0.525 ट्रायाण्थेमा मोनोग्जना, पार्थेनियम् हिस्टेरोफ्रस्, फ्युमारीयाम् सर्वाव्हीलरा. मेलीलोटस् spp., फलारीस् मैनर		0.75		750–1000		30	
कब्बुस	सैनडरर रुबरोव्यास्, सुपर्वा- सैनिकाना डाइलाना, कर्नोलोब्युस्युलेलाना. : चीनोपोडियम् अल्बम्, कॅव्युल्युलस् आर्वेन्सिस्, पॉर्ब्युलाका ओलेरेसियम, अनागलीस् आर्वेन्सिस, सिकोरियम इंटिबस, इचिनोक्लोआ कॉलोनम, डिक्टिलोकेटेनियम इजिप्टियम, पार्थेनियम् हिस्टेरोफ्रस्, कॉमेलिना एस्पि.		1.05–2.0, नंतरदर		750–1000 1.5– 3.0, पॉस्ट मोठ्ठ		60	मोठ्ठ्याप्रमाणे मोठ्ठ्याप्रमाणे मोठ्ठ्याप्रमाणे मोठ्ठ्याप्रमाणे 1.5–2.0 1.05–1.4
गोव्ढी	फलारीस् मैनर, चीनोपोडियम् अल्बम् , मेलीलोटस् एस्पि. मध्यम		मध्यम माणूस 0.175, हॅवी 0.210		मध्यम माणूस 0.250, हॅवी माणूस 0.300		500–750	120
मोठ्ठ्याप्रमाणे	ट्रायोपोडियम् मूर्थाव्हाल्ड्यूस्, 0.525 डाइपोलॉइडियम् ॲसेइकुस्, जॅसाव्हॉव्ह्युस् जॅपोव्हाइ, अमारानथस् विरिडिस्, पॉर्ब्युलाकाका ओलेरेसियम, जिगेव्ह अर्वान्सिस्, ब्युयॉर्बिया प्रोस्ट्रा, इचिनोक्लोआ कॉलोनम, एजेरेटम कोझिझोइडस, एल्युसिन इंडिका, सेटारिया ग्लॉका, कॉमेलिना बेंघालेन्सिस		0.75		750–1000		30	
सोयाबीन	सैनडरर स्ट्रॉनर्स्युस्, एलॅग्रॉस्युस् एस्पि.. डिजीटेरीयाम एस्पि.. सैनडरर एस्पुलेंटस्, बोरेरीयाम एस्पि.		0.350–0.525		0.500–0.750		750–1000	30

ध्वनेवीयाने सल्लेदारीगे: ग्लाइट् फ्लाय्ड अथवा ड्लाइ जीप् मादारीयाय नवेकीयोळदिगे अळवादिसलगिरुवत न्यूमॅरॅक्यूलर अथवा शाळदे ज्ञाळीश स्ट्रेयरगंयरु. उत्तम प्रकारमत्रकारुवुदन्नु ध्विकेजडिकेमुळुवा कैगळे तिळिसलद मार्गगळुसूचिसेगळु अनुसरिसे.

(1) मांजसेत अड्डकेशसंगागि: (अ) ऊळवदल्लि जैव्हुयाब्युविकै मत्तु कीरटोगळ्ळु अंदु ध्विकेजडिकेमुळे (ब) मेट्रीब्युजीन् 70 ड्ब्ल्यू.पी. सिंजडिसद नंतरद, मांजुन्नु जांजडेगळ.

(2) ऊळवदैमय्यविकैयु ध्वनेवार मत्तु नंतरदद अर्जगागि: (अ) अक्कद धैवे क्रैत्तुक्कै सिंजडिसुविकैयन्नु तड्रिसे. ध्विकारसु मादिद अड्डकेशसं मत्तु ड्रोस् अन्नु गमनिसबेडे. मेट्रीब्युजीन् 70 ड्ब्ल्यू.पी. अन्नु ध्वड ज्रीस/ग्लाइट् ध्वान् नळकैगळोळगिगे स्ट्रॉ स्प्रॉगळन्नु अक्रैक्युसदे सिंजडिसबेडे. ध्वकरुवदे, ध्विशेन्नु अगुळवन्नु इरुवुकैळल्लि, नळकैयु ऎत्तरवन्नु, नेळद मध्युदिंद स्थिरवागि इरुवंतु सुलभ नेडद्यगुरुत्तदे, अंदरे 48–50 सें.

ध्वनेवारुवुदद मुन्नेच्चरिकैगळु :- 1. प्रत्रे कायाचारुवुदेयु नंतरद मिश्रण मत्तु सिंजडिसुव ध्वजरुगळवन्नु इतर कीटनाशकगळन्नु सिंजडिसुव ध्वजरुगळ मोदलु ड्रिसेंटर्स अथवा सोडा ध्वान्नवन्नु ध्वनेवारुवुदु निरोनिदद चैन्नाग्नि तोळयबेडे 2. ऊयवुदे ऋतुवेरु सिंजडिसुव ध्वान्नवन्नु ऎरेवन्नाद मादडबारदु बेळे ऊमिरुगळगळ्ळि अथवा निंत ऋयुवन्नु निरुवुदु, अल्लि मालेग्नुकारुव मुळगळगे सम्बन्धिसेयुदे.

ध्वनेगे ऎडेगळु: ध्विकारुव मादडद बेळगंगळ्ळि इदन्नु ध्वनेवारुवुदु. ऊयवुदेगे कीटनाशकगळु, ऊयरियुव अथवा बेळवारेगिंयु सिंयोजकगळुगे संयोजनसेनुंदु इदन्नु ऎरेदुगळ ध्वनेवारुवुदु.

गोव्ढियुदे ध्वनेवारु मत्तु मुन्नेच्चरिकैगळु: 1. मादळु ऎत्तुवुदु ध्वनेवारुवुदु ज्ञारुद. इदन्नु ध्वड ज्रीस/ग्लाइट् ध्वान् नळकैगळोळगिगे गंडन्नु सारान्द्रेयळ्ळि सिंजडिसबेडे. 7. ध्वकरुवदे मुन्नेरुवदे ध्वनेवारुवुदेगे ध्वनुद्दुगळिगे ध्वनेवारुवुदेगे कैन्दिद्दुकेरुवे.

अन्नुयोगसद सम्बयः सोयाबीनमॅयाळी: ध्वक्रेयोळु 1–2 दिनगळ नंतरद. गोव्ढी: ध्वक्रेदा 35 दिनगळ नंतरद. कब्बु: नाटे मादडिद 3–5 दिनगळ नंतरद अथवा मोळगेयोळडेद नंतरद – 25–30 दिनगळ नंतरद. अलाबगेड्डे: मोदलु मोळगोळ्ळुविकै– नेट्टु नंतरद अथवा नंतरदद नंतरद 3–4 दिनगळु– मोदलु अलाबगेड्डे सग्यवु 5 सें.मीः ऎत्तरदन्नु तेलुबदागि मोळगोळ्ळुविकै मत्तु सग्यवुद नडुवे. मोळगोळ्ळु– नाटे मादडुव मोदलु– नाटे मादडुव ऒंदु वारद मोदलु अथवा नाटे मादडिद नंतरद – नाटे मादडि 15 दिनगळ नंतरद.

मुन्नेच्चरिकै: 1. अहारद ब्रदाथ्रगळु, ग्रामी अहारद ब्रदाथ्रगळु मत्तु ज्ञाराग्नेय अहारदिंदद दूरवेयि. 2. बाय्यि, कण्णु मत्तु चर्मदद संपर्कवन्नु तड्रिसे. 3. स्प्रे मांजसुवु ज्वाळरेषवन्न मादाडुवुदन्नु तड्रिसे. गाळयि दिड्डिन्नु सिंजडिसे. 4. सिंजडिसिद नंतरद कलुबडे बट्टे मत्तु दॅनदद भागगळन्नु चॅन्नाग्नि तोळेयिरुवे. 5. स्प्रे मादडुवागं धूमपानवु मादडबेडे. कुडियबेडे, तिन्नुबेडे मत्तु ज्ञगियबेडे. 6. ऎत्तुव मत्तु सिंजडिसुवान सम्बुन्नर रक्कुणत्तुद ध्वडुवुगळन्नु धरिसे.

ध्विदद लक्कुणगळु: तलेनोव्वु, वान्तरुगे, अलर्जियद अभिव्यक्ति, ऐदेगळे, अत्तरुक, नडुक्कु, स्नायुगळल्लि स्प्रॉस्पॅस्टिट सम्भविसबहुदु.

ध्रुदद चिकेत्ते: 1. सुंगनिदरे, गंटळेगे ऒंदुवागदल्लि कडगळेयिडुवदद मूलक वान्तिगे ब्रुरेरेयिसुत्तदे. वान्तिगे सुद्धवागुवदरॆगे अदरन्नु ब्रुनरुवदेयिसे. रोगगियु ध्रुस्त्रुप्रेत्न स्त्रियिळ्ळिद्दुरे वान्तिगे मादडबेडे. 2. बट्टे मत्तु चर्मदळु कलुबडेवदागिद्दुरे, बट्टॆगळन्नु तॅगेदुवुकै मत्तु कलुबडे चर्मदनन्नु सारुत्तु प्रमाणद साबुनरु मत्तु निरिनिंद ऎरडु सारि तॅगेदुवुकै. 3. कण्णुगळु कलुबडेवागिद्दुरे. सुमारु 10 ऒंद 15 निमिषगळ कळ सारुत्तु ळुत्तु/शुद्ध निरिनिंद ध्वड मादडि. 4. ळुबरुगडिदरे, रोगगियुन्नु ज्ञाक्ष गाळगे तॅगेदुवुकै.

ध्रुडियेयु: यावुदेरे निर्दिन्नु ध्रुडियेवे तिळिद्दु. रोगगळुक्कुगळ चिकेत्ते.

ध्वनेवे कण्ट्रॅगदन्न ऎलेवनवे : 1. निरिन मालेग्नुदे ज्ञाराडनु, ज्ञाडगेट्टुळ ज्ञाक्रेंब्युगळु अथवा जैव्हुयाब्ब वस्तुगळु मत्तु यंत्रगळु मत्तु कण्टेनरगळगेदल्लि तॅगेयुवुदेयेनु, सुरक्षित रीतियिद्दु ऎरेवन्नाद मादडबेडे 2. ध्वनद्दु ज्ञाक्रेंब्युगळन्नु अथवा मारु–ध्वनेयिसुवु ऒडेयलु मत्तु ध्वनेयिसुवु ऒडेयलु ध्रुडियेगळ्ळिद्दु मांजद ज्ञाक्रेंब्युगळन्नु मांजद ज्ञाग्यदल्लिद्दु ऒडेयबेडे.

ध्वनेवे कण्ट्रॅगदन्न ऎलेवनवे : 1. निरिन मालेग्नुदे ज्ञाराडनु, ज्ञाडगेट्टुळ ज्ञाक्रेंब्युगळु अथवा जैव्हुयाब्ब वस्तुगळु मत्तु यंत्रगळु मत्तु कण्टेनरगळगेदल्लि तॅगेयुवुदेयेनु, सुरक्षित रीतियिद्दु ऎरेवन्नाद मादडबेडे 2. ध्वनद्दु ज्ञाक्रेंब्युगळन्नु मांजद ज्ञाग्यदल्लिद्दु ऒडेयबेडे.

ध्वनेवे कण्ट्रॅगदन्न अंबुगळु: 1. ध्वनेगळ मत्तु ध्वनेवारुवुदु